



الهُدُوْفُ الْعَلِيَّةُ
وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الادارة العامة للمناهج

الأحياء

للصف الثالث الثانوي



حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم
٢٠١٤ / ١٤٣٥ م



الْجَمْهُورِيَّةُ الْإِتَّصَارِيَّةُ
وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة للمناهج



للصف الثالث الثانوي

تأليف

أ. د. داؤد عبدالملك يحيى الحدابي / رئيساً

أ. عمر فضل بافضل / منسقاً

أ. د / عبدالكريم عبدالمحمود ناشر أ. وهيب هزاع شعلان

د. عبدالله عثمان الحمادي أ. ياسمين محمد عبدالواسع

د. عبدالعزيز عبدالله مقبل أ. عبدالمؤمن عبدالله محسن

أ. مصطفى عبدالله هويدى

الإخراج الفني

التصوير الفوتوغرافي : عبدالسلام أحمد الحبشي

الرسم والمسح الضوئي : محمد الدزارى ، علي السلفي

الصف والتصميم : أحمد محمد العوامى

بسام أحمد العامر

أشرف على التصميم : حامد عبدالعالـم الشيباني

٢٠١٤ هـ / ١٤٣٥ م



المصدر: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠١م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

أعضاء اللجنة العليا للمناهج

أ.د. عبدالرزاق يحيى الأشول.

- د. عبدالله عبده الحامدي.
أ/ علي حسين الحيامي.
د/ صالح ناصر الصوفي.
أ.د/ محمد عبدالله الصوفي.
أ/ عبدالكريم محمد الجنداوي.
د/ عبده الله علي أبو حورية.
د/ عبده الله مللس.
أ/ منصور علي مقبل.
أ.د/ أنيس أحمد عبدالله طائع.
أ.د/ محمد سرحان سعيد المخلافي.
أ.د/ محمد حاتم المخلافي.
د/ عبدالله سلطان الصلاхи.

قررت اللجنة العليا للمناهج طباعة هذا الكتاب .

تقديم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

في إطار تفيد التوجهات الرامية للاهتمام بنوعية التعليم وتحسين مخرجاته تلبية للاحتجاجات ووفقاً للمطلبات الوطنية.

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم في إطار توجهاتها الإستراتيجية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي على إعطاء أولوية استثنائية لتطوير المناهج الدراسية، كونها جوهر العملية التعليمية وعملية ديناميكية تتسم بالتجدد والتغيير المستمر لاستيعاب التطورات المتسارعة التي تسود عالم اليوم في جميع المجالات.

ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذا الكتاب في طبعته المعدلة ضمن سلسلة الكتب الدراسية التي تم تعديليها وتنقيحها في عدد من صفوف المراحلين الأساسية والثانوية لتحسين وتجويد الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، اعتماداً على العديد من المصادر أهمها: الملاحظات الميدانية، والمراجعات المكتبية لتلافي أوجه القصور، وتحديث المعلومات وبما يتناسب مع قدرات المتعلم ومستواه العمري، وتحقيق الترابط بين المواد الدراسية المقررة، فضلاً عن إعادة تصميم الكتاب فنياً وجعله عنصراً مشوقاً وجذاباً للمتعلم وخصوصاً تلاميذ الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

ويعد هذا الإنجاز خطوة أولى ضمن مشروعنا التطويري المستمر للمناهج الدراسية ستتبعها خطوات أكثر شمولية في الأعوام القادمة، وقد تم تفيد ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة التربية والتعليم والجامعات من الذين أنضجتهم التجربة وصقلهم الميدان برعاية كاملة من قيادة الوزارة والجهات المختصة فيها.

ونؤكد أن وزارة التربية والتعليم لن تتوانى عن السير بخطى حثيثة ومدروسة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير الجيل وتسلیحه بالعلم وبناء شخصيته المتزنة والمتكاملة القادرة على الإسهام الفاعل في بناء الوطن اليمني الحديث والتعامل الإيجابي مع كافة التطورات العصرية المتسارعة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

أ. د. عبدالرزاق يحيى الأشول

وزير التربية والتعليم

رئيس اللجنة العليا للمناهج



مقدمة

بعنوان

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد، وبعد،،،
فهذا هو كتاب الأحياء للصف الثالث الثانوي الذي يحتوي على ثمان وحدات
مختلفة، وهي تعتبر امتداداً طبيعياً لما درسه الطالب في المرحلة الأساسية، وفي الصفين
الأول والثاني الثانوي في هذه المرحلة.

في الوحدة الأولى سيدرس الطالب التنظيم العصبي ، وفيه يتعرف على التنظيم
عصبي في بعض الفقاريات والأجزاء الرئيسية في الجهاز العصبي للإنسان ، وتركيب
الخلية العصبية في الإنسان، ووظائف كل أجزائها وآلية انتقال السيالة العصبية . كما
سيدرس عمليات التنظيم الإرادية والإلإرادية للجهاز العصبي والتمييز بين هذه العمليات،
كما سيتتعرف على الأنواع الرئيسية للمستقبلات الحسية وتحديد أماكن وجودها،
والتركيب العام لها ووظائفها، وآلية عملها .

أما الوحدة الثانية والتي تختص بالتنظيم الهرموني، سيدرس الطالب فيها عن
الهرمونات والتنظيم الهرموني ودور بعض الهرمونات في العمليات الحيوية للنبات، وما
هي الهرمونات التي تفرز من الغدد الصماء في جسم الإنسان ودور التنظيم الهرموني في
تنسيق عمل أجهزة الجسم، كما سيتبين بعد دراسة هذه الوحدة العلاقة بين التنظيم
الهرموني والتنظيم العصبي والذي درسه في الوحدة الأولى السابقة لهذه الوحدة،
 وسيتتعرف على بعض الحالات المرضية التي تنتج عن الاضطرابات الهرمونية .

الوحدة الثالثة والخاصة بالتكاثر في الكائنات الحية، سيدرس الطالب فيها أنواع
التكاثر الجنسي واللاجنسي في الكائنات الحية . وفي هذه الوحدة سيتتعرف على مكونات
وظيفة أجهزة التكاثر الذكرية الأنوثوية، ومراحل تكوين الأمشاج في كل من الذكر
والأنثى في الإنسان ، كما سيصف الطالب أهم التغيرات التي تحدث في المبيض والرحم
أثناء دورة الحيض عند المرأة، ومراحل تطور الجنين في أنثى الإنسان .

الوحدة الرابعة تتحدث عن أساسيات علم الوراثة ، حيث سيدرس الطالب فيها
بعض تجارب مندل وقوانينه الخاصة بالوراثة ومعنى مفهوم السيادة التامة والسيادة الناقصة
والسيادة المشتركة والارتباط والعبور، وبعد ذلك سيقارن بين الشكل الجنسي والشكل
المظيري للكائن الحي ، وما الصفات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء . وبعد دراسة بعض
القوانين الوراثية سيقوم الطالب بالتطبيق في حل المسائل الوراثية المختلفة . كما سيتتعرف
على بعض الأمراض التي تنتقل وراثياً من الآباء إلى الأبناء، وكذا توضيح دور
الكروموسومات الجنسية في وراثة بعض الصفات...أ الخ .

أما الوحدة الخامسة والتي تتحدث عن الوراثة الجزيئية، سيعتبر الطالب بعد دراسة هذه الوحدة على مكونات الكروموسوم والجين ، والتركيب البشري للحمض النووي الريبيوزي منقوص الأكسجين (DNA) وتضاعف هذا الحمض النووي وكيفية نسخ الحمض النووي الريبيوزي (RNA) ، وكذا خطوات بناء البروتين في الخلية، وبعد ذلك سيعطي أمثلة لبعض تطبيقات الوراثة الجزيئية .

في الوحدة السادسة (التقانة الحيوية) ، وهو موضوع جديد في علم الأحياء، سيعتبر الطالب عن المقصود بالتقانة الحيوية ودور الهندسة الوراثية (الجينية) فيها، وكيف يتم استخدام هذه التقانة الحيوية في إنتاج بعض المواد الغذائية وطريقة إنتاج الأدوية والمضادات الحيوية في تحسين الإنتاج النباتي والحيواني ، ودور تلك التقانة الحيوية في تنقية المياه العادمة في محطات معالجة الصرف الصحي وأهميتها في التخلص من الخلفات الضارة بالبيئة .

الوحدة السابعة تعالج مشاكل البيئة ؛ وفيها سيعتبر الطالب على مراحل تطور علاقة الإنسان بالبيئة وأهم المشكلات التي تتعرض لها البيئة ومصادر تلوثها وأنواعها. كما سيتوصل الطالب إلى تحديد المشكلات الناتجة عن تلوث مكونات البيئة وأهم المواد البيئية التي تتعرض للاستنزاف ، واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل استنزاف المياه والتربة والغطاء النباتي إلى آخر ذلك من المعالجات للمشكلات البيئية اليمنية.

أما الوحدة الثامنة والأخيرة (الجيولوجيا) وعن تاريخ الأرض تحديداً، سيتم التوضيح فيها عن المقصود بالطبقة وسطح عدم التوافق الأحفوري والاحفور المرشدة... إلى آخر ذلك من المفاهيم الجيولوجية، ودراسة الأحافير وأهميتها وكيفية حفظها والمقارنة بين المضاهاة الأحفورية والمضاهاة الصخرية إلى غير ذلك من المعلومات الخاصة بتاريخ الأرض .

وقد تضمنت كل وحدة في نهايتها التقويم المتنوع المستعمل على عدد من الأسئلة المختلفة كتقويم للطالب وتحديد مدى تحقق الأهداف لديه .

وكل ما نرجوه أن تلبي هذه المعلومات والمهارات رغبات طالب الصف الثالث الثانوي القسم العلمي وحاجاته، وميوله، وتساعده على اكتساب المهارات العلمية التي تجعله قادراً على استخدامها في حياته العملية ومواكبة التطورات العلمية المتتسارعة في علم الأحياء والعلوم الأخرى .

أخيراً أملنا كبير في المدرسين الأفضل والمجتهدين في الميدان أن لا يخلوا علينا بآرائهم وملحوظاتهم حول مادة الكتاب حتى تستفيد منها في تطويره مستقبلاً بعد عملية التجريب هذه ، ، ، والله من وراء القصد .

فريق التأليف

المحتويات

الصفحة

الموضوع


٨	الوحدة الأولى: الجهاز العصبي
٩	الجهاز العصبي في الكائي الحي
١٤	أنواع الألياف العصبية
٢٦	أعضاء الحس
٢٦	المستقبلات الضوئية
٣٠	المستقبلات الكيميائية
٣٢	المستقبلات الآلية
٣٧	تقسيم الوحدة
٤٠	الوحدة الثانية: التنظيم الهرموني
٤١	التنظيم الهرموني في النبات
٤٥	التنظيم الهرموني في الحيوان
٤٦	التنظيم الهرموني في الإنسان
٥٨	أمراض الجهاز الهرموني وصحته
٦٠	تقسيم الوحدة
٦١	الوحدة الثالثة: التكاثر في الكائنات الحية
٦٢	التكاثر
٦٢	التكاثر اللاجنسي
٦٩	التكاثر الجنسي
٧٠	التكاثر الجنسي في البدائيات
٧٢	التكاثر الجنسي في النباتات
٧٩	التكاثر الجنسي في الحيوانات
٩٣	تقسيم الوحدة
٩٦	الوحدة الرابعة: أساسيات علم الوراثة
٩٧	المقصود بالوراثة
٩٨	تطور علم الوراثة الحديث
١٠٤	الشكل الجيني والشكل الظاهري
١١١	دور الكروموسومات في الوراثة
١٢٢	الوراثة والجنس
١٢٩	تقسيم الوحدة

١٣١	الوحدة الخامسة: الوراثة الجزيئية
١٣٢	الكروموسومات والجينات
١٣٥	دورة حمض (DNA) في نقل الصفات الوراثية
١٣٦	الحمض النووي الريبيوزي
١٣٨	خطوات بناء البروتين
١٤٠	تطبيقات في الوراثة الجزيئية
١٤٣	تقويم الوحدة
١٤٤	الوحدة السادسة: التقانة الحيوية
١٤٥	المقصود بالتقانة الحيوية
١٤٦	الهندسة الجينية أو الوراثية
١٤٧	استخدام التقانة الحيوية في إنتاج الغذاء
١٥٢	استخدام التقانة الحيوية في إنتاج الدواء
١٥٥	استخدام التقانة الحيوية في إنتاج الوقود
١٥٦	استخدام التقانة الحيوية في معالجة المخلفات الملوثة
١٥٨	استخدام التقانة الحيوية في إنتاج بعض المواد الصناعية
١٦١	تقويم الوحدة
١٦٢	الوحدة السابعة: البيئة ومشكلاتها
١٦٣	المقصود بالبيئة
١٦٤	مشكلات التلوث لمكونات البيئة
١٦٥	ملوثات الهواء
١٧١	تلوث الماء
١٧٣	التلوث الضوضائي
١٧٦	التلوث الإشعاعي
١٧٨	ملوثات الغذاء
١٨٠	تلوث التربة
١٨١	مشكلات إستنزاف الموارد البيئية
١٨٦	تقويم الوحدة
١٨٧	الوحدة الثامنة: تاريخ الأرض
١٨٨	الصخور الرسوبيّة
١٩١	الأحافير
٢٠٢	التاريخ المطلق للصخور
٢٠٧	التقسيم الحديث للسجل الجيولوجي
٢٠٩	نبذة عن تاريخ الأرض
٢١٤	جيولوجيا الجمهورية اليمنية
٢٢٠	تقويم الوحدة
٢٢٣	المصطلحات العلمية

الجهاز العصبي

Nervous System

الوحدة الأولى



أهداف الوحدة

يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن:

- ١- تتعرف على التنظيم العصبي في بعض اللافقاريات.
- ٢- توضح الأجزاء الرئيسية في الجهاز العصبي للإنسان.
- ٣- تبين تركيب الخلية العصبية في الإنسان، ووظائف أجزائها.
- ٤- توضح آلية انتقال السيال العصبي.
- ٥- تميز بين عمليات التنظيم الإرادية والإلإرادية للجهاز العصبي.
- ٦- تحدد الأنواع الرئيسية للمستقبلات الحسية، وأماكن وجودها.
- ٧- تصف التركيب العام للمستقبلات الحسية، ووظائفها.
- ٨- توضح آلية عمل المستقبلات الحسية، ووظائفها.




الجهاز العصبي في الكائن الحي

– لماذا يتفاعل الكائن الحي مع المؤثرات البيئية؟

يتفاعل الكائن الحي مع المؤثرات البيئية للحفاظ على ثبات وضعه الداخلي، وتعتبر هذه الخاصية من أوضاع مظاهر الحياة التي تميز الكائن الحي سواء كان من الكائنات البسيطة، أو الكائنات الراقية، ففي الحيوانات الراقية والإنسان نجد أن السيطرة والتنظيم للمحافظة على ثبات وضعها الداخلي يتمان بواسطة الجهازين العصبي والهرموني، والتنظيم عن طريق الأعصاب يكون عادة أسرع من التنظيم عن طريق الهرمونات.

أولاً: الإحساس في الكائنات وحيدة الخلية:



الشكل (١) الخيوط
العصبية في البراميسيوم.

إن الإحساس خاصية من خواص بروتوبلازم الكائن الحي، لهذا نجد مثلاً الطلائعيات الأولية مثل الأميبا تحس بالمؤثرات في الوسط الذي تعيش فيه عن طريق بروتوبلازم خليتها؛ وبهذا نجد أنها تتحرك نحو الغذاء، وتنفر من الضوء الشديد وتبعد عن المواد الكيميائية عالية التركيز، وفي الطلائعيات الهدبية كالبراميسيوم الشكل (١)، تتصل أهدابها بحبيلات قاعدية مغمورة في بروتوبلازم البراميسيوم، وتتصل هذه الحبيلات بعضها بخيوط دقيقة، وخلال هذه الخيوط تنتقل المؤثرات الحسية إلى الحبيلات التي تتصل بدورها بالأهاب فتسبب حركتها، ويطلق على هذه الخيوط (الخيوط العصبية) يتضح من ذلك عدم وجود جهاز عصبي متخصص في الكائنات وحيدة الخلية.

ثانياً: الجهاز العصبي في الحيوان:

تحتختلف الحيوانات في مستوى التنظيم العصبي بحسب موقعها في مالك الكائنات الحية، ومن الملاحظ أن صورة بناء التنظيم العصبي في الحيوانات المختلفة يكون أكثر رقياً وقدرة على إتقان العمل كلما اتجهنا نحو الأنواع الراقية من الحيوانات. ويتمثل هذا الاتجاه بتجميع الخلايا العصبية في جهاز عصبي مركزي، وذلك لزيادة القدرة على السيطرة، والتنظيم، والتنسيق، ورقي مستوى الاستجابة للمؤثرات البيئية، مما يساعد الكائن الحي في الحفاظ على اتزان بيئته الداخلية.


أ: الجهاز العصبي في اللافقاريات :

يمكن ملاحظة الجهاز العصبي في الجوفمعويات للتعرف على نوعية التنظيم العصبي في اللافقاريات، ففي الهيدرا مثلاً يلاحظ وجود نوع من التنظيم العصبي الأولي.

- ما سبب انكماش الهيدرا في حالة لمسها المفاجئ؟

تستجيب الهيدرا للمؤثرات الخارجية فتنكمش لومامسها باللمس المفاجئ (الشكل ٢).

وتعود هذه الانفعالية إلى امتلاكها جهاز عصبي بسيط يعرف بالجهاز العصبي الأولي.



الشكل (٢) الشبكة العصبية في الهيدرا.

- ما مكونات الجهاز العصبي في الهيدرا؟
- كيف يستجيب للمؤثرات الخارجية؟
ادرس الشكل : (٢) لاحظ أن الجهاز العصبي للهيدرا عبارة عن خلايا عصبية أولية تتصل زوائدتها الشجيرية ببعضها مكونة شبكة عصبية، وتتصل هذه الخلايا العصبية بالخلايا الحسية من جهة، وخلايا الاستجابة (اللّاسعة) من جهة أخرى مكونة أبسط قوس عصبي، وعن طريقه يتم استقبال التنبية عن طريق الخلايا الحسية، ومنها ينتقل إلى الخلايا العصبية المتصلة بها، ثم إلى العضليّة؛ حيث تحدث الاستجابة بانكمash جسم الهيدرا أو لومامسها.

النشاط (١)

- نفذ النشاط الخاص بفحص شرائح مجهرية توضح الشبكة العصبية، والخلية العصبية.

الجهاز العصبي في الحلقيات (دودة الأرض) :


ما الاستجابة التي تظهرها دودة الأرض في حالة تسليط ضوء شديد عليها؟

ما سبب ذلك؟

النشاط (٢)

- نفذ النشاط الخاص بتسليط ضوء شديد على دودة الأرض.

تبدي دودة الأرض إستجابة واضحة للمؤثرات المحيطة فتنجذب نحو الطعام، وتبتعد عن المواد الضارة، وتنسحب، وتدفن نفسها في التراب في حالة تسلیط ضوء شدید عليها، وترجع هذه الانفعالات إلى الرقى، والتعقید في الحواس، والجهاز العصبي لها.



لاحظ الشكل (٣) وتعرف على مكونات الجهاز العصبي في دودة الأرض. ستجد أن الجهاز العصبي عبارة عن:

١- عقدة دماغية مزدوجة فوق بلعومية تمتد منها حلقة حول بلعومية تلتقي تحت البلعوم بالعقدة العصبية.

٢- عقدة عصبية تحت بلعومية.

الشكل (٣)

الجهاز العصبي في دودة الأرض.

٣- جبل عصبي بطني مزدوج عليه عقد عصبية صغيرة (عقدة في كل حلقة).

٤- أعصاب تخرج من العقدة الدماغية، والعقدة العصبية تحت البلعومية تمتد نحو الحلقات الأربع الأولى، في حين تستمد الحلقات التالية أعصابها من عقد الجبل العصبي البطني الذي يستمر إمتداده نحو الخلف، ويخرج من كل عقدة في الجبل العصبي زوج من الأعصاب، تتفرع إلى فرعين أحدهما يتوزع على الناحية البطنية والآخر على الجانب، وعبر حواجز الحلقات تتشابك الأعصاب مكونة شبكة من الخيوط العصبية حيث تمكن الدودة من التفاعل مع المؤثرات البيئية المختلفة.

- اكتب عن الجهاز العصبي في المفصليات.

قضية للبحث

ب: الجهاز العصبي في الفقاريات :

يصل التنظيم العصبي في الحيوانات الفقارية وخاصة الثدييات (الإنسان) إلى مستوى راقي من التنسيق بين أجهزة الجسم المختلفة، ويرجع ذلك إلى وجود جهاز عصبي معقد التركيب يتكون من الدماغ، والجبل الشوكي، والأعصاب.

• الجهاز العصبي في الإنسان :

يتعرض الإنسان إلى مؤثرات عديدة؛ حيث تقوم في استقبالها أعضاء حس متخصصة مرتبطة بجهاز عصبي معقد التركيب يعمل بكفاءة عالية تضمن للإنسان الاتصال والتكيف الفعال مع البيئة، والقيام بالتنسيق لفعاليات الجسم المختلفة

ولتنظيم العلاقة بين أجهزة الجسم وأعضائه المختلفة.


• النسيج العصبي:

- ما وحدات بناء النسيج العصبي؟ وما وظيفتها؟

يتكون النسيج العصبي من نوعين من الخلايا لاحظ الجدول (١)، وتعرف على ذلك.

جدول (١) وحدات بناء النسيج العصبي.

الوظيفة	الخلايا
تكوين ونقل السائل العصبي.	الخلايا العصبية. Neurons
دعم وحماية الخلايا العصبية.	خلايا الغراء العصبي. Neuroglia



الشكل (٤) تركيب الخلية العصبية.

- مِمَّ تُتَكَوَّنُ الْخَلِيلَةُ الْعَصْبِيَّةُ؟

رغم اختلاف أشكال، وأحجام الخلايا العصبية إلا أنها تتكون من الأجزاء التالية: (الشكل ٤):

١- جسم الخلية Cell Body :

يحتوي على نواة محاطة بـ سيلوبلازم الذي يحوي عضيات، مثل الميتوكوندريا، وأجسام جوججي، والشبكة الإندوبلازمية التي تسمى الشبكة الخشنة، والريبوسومات الحرة وبينها أجسام نسل Nissl Bodies.

٢- الروائد الشجيرية Dendrites :

وهي عبارة عن بروزات سيلوبلازمية قصيرة متفرعة تستقبل السائلات العصبية، وتوصلها إلى جسم الخلية.


٣- المحور Axon :

امتداد طويل لجسم الخلية العصبية، ينقل السائل العصبي بعيداً عن جسم الخلية

حيث يتفرع جانبياً، ويعطي أفرعاً دقيقة عدة تنتهي بنهيات منتفخة تسمى الأزرار التشابكية **Synaptic Knobs**.

تصنف الخلايا العصبية على أساس عدد الروائد الخارجة من جسم الخلية إلى ثلاثة أنواع هي:

- ١- خلايا عصبية أحادية القطب، ومنها يخرج من جسم الخلية زائدة واحدة قد تنقسم إلى فرعين أحدهما محور، والآخر زائدة شجيرية، مثل الخلايا الحسية.
- ٢- خلايا عصبية ثنائية القطب، ويبخر من جسم الخلية زائدتان، مثل خلايا شبكة العين.
- ٣- خلايا عصبية عديدة الأقطاب، وهي أكثر الخلايا انتشاراً في الجهاز العصبي، مثل الخلايا العصبية الحركية.



الشكل (٥) أنواع الخلايا العصبية حسب الوظيفة.

Inter Neuron . الخلية البينية، والحركية تدعى **Neuroglia** : خلايا الغراء العصبي .

ما أنواع خلايا الغراء العصبي؟ وما وظيفتها؟

تشكل هذه الخلايا غالبية خلايا الجهاز العصبي ولها القدرة على الانقسام.

ولكي تتعرف على أنواعها، لاحظ الجدول: (٢) .

جدول (٢) أنواع خلايا الغراء العصبي ووظائفها وأماكن وجودها.


الوظيفة	مكان وجودها	نوع الخلية
تصنيع النواقل العصبية. ابتلاع الأجسام الغريبة.	الجهاز العصبي المركزي.	الخلايا النجمية.
- تكوين الغمد الميليني حول محاور الخلايا العصبية، وتفرعاتها الشجرية.	الجهاز العصبي المركزي.	الخلايا الدبقية قليلة التشرير.
- تكوين السائل الخفي الشوكي.	الجهاز العصبي المركزي.	خلايا بطانة القناة الشوكية، وبطينات المخ.
- التهام الأجسام الغريبة. التحول إلى أنواع من خلايا الغراء العصبي.	الجهاز العصبي المركزي.	الدبقيات الصغيرة.
- تكوين الغمد الميليني حول محاور الخلايا العصبية.	خارج الجهاز العصبي المركزي.	خلايا شفان.
- دعم أجسام الخلايا العصبية.	خارج الجهاز العصبي المركزي.	الخلايا القمرية.

أنواع الألياف العصبية :

– بماذا تختلف المحاور العصبية عن بعضها؟

يطلق على المحور العصبي وما يحيط به من أغلفة (الليفة العصبية Nerve Fiber)، وتختلف المحاور عن بعضها في القطر والطول، وبعض المحاور تكون مغطاة بمادة دهنية بروتينية تسمى غلاف الميلين Myelin Sheath، وتدعى هذه المحاور الألياف الميلينية Myelinated Fibers، ويعمل غلاف الميلين على:

- ١- عزل المحور كهربائياً.
- ٢- زيادة سرعة انتقال السial العصبي ١٢٠ م / ث.
- ٣- مساعدة الخلية العصبية في ترميم محورها التالفة ما عدا خلايا الجهاز العصبي المركزي. بينما بعضها الآخر غير مغطى وتدعى الألياف اللاميلينية Non-myelinated Fibers مثل الخلايا البينية الموجودة في الجهاز العصبي المركزي، وتصل سرعة السial العصبي في هذه الألياف إلى ما يقرب من ٢,٣ م / ث. وكل ليفه عصبية تمثل محور الخلية العصبية التي يوجد جسمها في الجهاز العصبي المركزي، أو إحدى العقد العصبية، وكل مجموعة ألياف عصبية تحاط




الشكل (٦) تركيب العصب.

- السیال العصبي : Nerve Impulse

عرفت سابقاً أن الخلايا العضلية تقوم بالانقباض، والخلايا الغدية بالإفراز، بينما الخلايا العصبية تختصت في توليد السيالات العصبية ونقلها. والسيال العصبي هو لغة التفاهم بين الخلايا العصبية، وهو الشكل الذي تترجم إليه أنواع المؤثرات جميعها التي يتأثر بها الجسم، وقد تم معرفة آلية تكوين السيال العصبي وانتقاله من خلال دراسات تجريبية على محاور عصبية لحيوان الحبار (Sepia).

- كيف يتكون السيال العصبي؟ وكيف ينتقل؟

يتولد السيال العصبي عند حدوث مؤثر ما في الخلية العصبية، ولكي نفهم كيفية تكونه علينا التعرف على وضع غشاء الخلية العصبية قبل حدوث أي مؤثر؛ عندما تكون في وضع يسمى جهد الراحة. بالمعنى الكهربائي لكمية الجهد.



الشكل (٧) قياس جهد الراحة.

- فما المقصود بجهد الراحة؟

- جهد الراحة : Resting Potential

لاحظ الشكل (٧) حيث ستتجد أن الخلية العصبية محاطة بغشاء ذو نفاذية اختيارية يفصل بين البيئة الداخلية والخارجية لهذه الخلية.

- ما نوع الشحنات داخل وخارج الخلية العصبية؟ تختلف الشحنات داخل الخلية عن الشحنات خارجها، ويرجع اختلاف توزيع الشحنات على جانبي غشاء الخلية العصبية إلى الآتي:


١- وجود بروتينات سالبة الشحنة داخل الليف العصبي لا تستطيع أن تندفع إلى خارجها.
 ٢- عمل مضخة صوديوم - بوتاسيوم ؛ حيث تخرج أيونات الصوديوم Na^+ وتدخل أيونات البوتاسيوم K^+ التي تنتقل عبر الغشاء الخلوي بطريقة النقل الأيوني « النشط ». لاحظ أن سطح الليف الخارجي مشحون بشحنة موجبة، والسطح الداخلي مشحون بشحنة سالبة، ويطلق على هذه الحالة بالاستقطاب **Polarization** ويسمى مقدار فرق الجهد بين داخل الليف العصبي وخارجها في هذه الحالة بجهد الراحة ويكون مقداره (-٧٠) ميللي فولت. إلا أن هناك جهداً آخر يسمى جهد الفعل يحدث عند تأثر الخلية العصبية بمثير خارجي.

- جهد الفعل **Action Potential**

- ما المقصود بجهد الفعل؟

- ماذا يحدث لليف العصبي عند تأثرها بمثير؟

تبعد التغيرات التي تحدث لليف العصبي بلحظة الشكل (٨) دراسة المجدول (٣).



جدول (٣) التغيرات التي تحدث للليفة العصبية عند تأثيرها بمُؤثر

اسم المرحلة	التغيرات التي تحدث في الليفة العصبية
زوال الاستقطاب Depolarization	وصول مؤثر لمنطقة التأثير يؤدي إلى توقف مضخة صوديوم - بوتاسيوم، وفتح قنوات الصوديوم في غشاء الليفة العصبية فتنتشر أيونات الصوديوم إلى داخل الليفة فيرتفع الجهد الداخلي لها إلى (٣٠+) ميللي فولت، وعندما تغلق قنوات الصوديوم.
إعادة الاستقطاب Repoliarization	عند إغلاق قنوات الصوديوم تفتح قنوات البوتاسيوم الموجودة على غشاء الليفة العصبية، فتنتشر أيونات البوتاسيوم وينخفض فرق الجهد للليفه العصبية .


لاحظ أن التغيرات الكهربائية التي ترافق زوال الاستقطاب، وإعادته، يطلق عليها جهد الفعل، وهنا يمكن أن يعرف السيال العصبي بأنه موجة من إزالة الاستقطاب تسرى في محور الخلية العصبية بعد تنبية تلك الخلية، ويصاحبها تكون جهد فعل عند نقاط متعددة على طول المحور.

- كيف تعود الليفة العصبية إلى جهد الراحة؟

بعد اختفاء جهد الفعل تعمل مضخة الصوديوم - بوتاسيوم على إعادة الليفة العصبية إلى حالة الاستقطاب بإخراج أيونات الصوديوم وإدخال أيونات البوتاسيوم لتعود الخلية إلى وضعها في جهد الراحة.


■ آلية انتقال السيال العصبي في الألياف العصبية :

انظر الشكل (٩)، ولاحظ كيف ينتقل السيال العصبي في الألياف العصبية غير الميلينية ينتقل بطريقة التأثير الدائري الموضعي .



الشكل (٩) انتقال السيال العصبي في الألياف غير الميلينية بطريقة التأثير الدائري الموضعي .

فحدوث زوال استقطاب في نقطة ما لليفة عصبية يعتبر مثيراً للنقطة المجاورة فيؤدي إلى فتح قنوات الصوديوم في تلك النقطة، فيحدث زوال الاستقطاب، وتعود النقطة السابقة إلى حالة الاستقطاب.



الشكل (١٠) انتقال السيال العصبي في الليفة الميلينية بطريقة القفز.

وهكذا تسرى موجة من زوال الاستقطاب، وإعادته خلال الليفة. ولكن في الليفة العصبية الميلينية ينتقل زوال الاستقطاب من عقدة رانفية إلى أخرى، ويسمى النقل القفزي . الشكل (١٠)، والانتقال بهذه الطريقة أسرع وأقل استهلاكاً للطاقة من النقل بطريقة التأثير الموضعي.

■ آلية انتقال السيال العصبي خلال التشابك العصبي :

– كيف ينتقل السيال العصبي من خلية عصبية إلى أخرى؟

ينتقل السيال العصبي المتكون في خلية عصبية إلى أخرى حتى يصل إلى عضو استجابة بواسطة نواقل كيميائية عبر شق يسمى الشق التشابكي **Synaptic Cleft**.


ولتتعرف على كيفية هذا الانتقال ، ادرس الشكل (١١) الذي يبين تكون التشابك العصبي . من الغشاء قبل التشابكي والغشاء بعد التشابكي وبينهما فراغ يدعى الشق التشابكي . يحتوي الغشاء قبل التشابكي على العديد من الحويصلات التشابكية تحوي مواداً كيميائية تدعى النواقل العصبية ، ويحتوي غشاء قبل التشابكي على قنوات لـأيونات الكالسيوم التي توجد بتركيز عالٍ خارج الغشاء قبل التشابكي مقارنة بداخله . أما الغشاء بعد التشابكي فإنه يحتوي على مستقبلات للنواقل العصبية ترتبط معها قنوات بروتينية للأيونات المختلفة .

– ما التغيرات التي تحدث عند دخول السيال العصبي إلى الغشاء قبل التشابكي ؟

إن هذه التغيرات يمكن إجمالها بالآتي :

١- فتح قنوات الكالسيوم لانتشار أيونات الكالسيوم إلى داخل الغشاء قبل التشابكي .

٢- التحام
الحيصلات
التشابكية
بالغشاء قبل
التشابكي
بمساعدة أيونات
الكلاسيوم،
وانفجارها،
وتحرر محتوياتها
من النواقل
العصبية في
الشق التشابكي.



الشكل (١١) انتقال السائل العصبي خلال التشابك العصبي .

٣- ارتباط جزئيات النواقل العصبية المتحررة مع المستقبلات على الغشاء بعد التشابكي يشكل مؤثراً كيميائياً يؤدي إلى فتح قنوات أيونات الصوديوم الموجودة في الغشاء بعد التشابكي، فتنتقل أيونات الصوديوم Na^+ إلى داخل الخلية بعد التشابكية مما يسبب زوال الاستقطاب في سائل عصبي خلال الغشاء الخلوي للخلية العصبية. إن عمل هذا الناقل يعتبر ناقلاً عصبياً منشطاً أما إذا كان الناقل العصبي مثبطاً فإن ارتباطه مع المستقبلات يمنع إنتقال السائل العصبي إلى الغشاء بعد التشابكي فيتوقف انتقاله وإحداث جهد فعل في الخلية بعد التشابكية.

٤- لا يستمر ارتباط جزئيات النواقل العصبية بمستقبلاتها لفترة طويلة؛ حيث تعمل آليات مختلفة في منطقة التشابك على إبطال تأثيرها بعد فترة وجيزة، فالناقل العصبي (أستيل كولين) يحطمته أنزيم (أستيل كولين استريلز) الموجود في الشق التشابكي، ويتحوله إلى حمض الخلية، والكولين الذي يعاد امتصاصه، واستخدامه لبناء (أستيل كولين) جديد .

- تتدخل العقاقير في مسار السيالات العصبية، ابحث في طرق تأثير العقاقير على الجهاز العصبي .

قمية للبحث

أجزاء الجهاز العصبي في الإنسان :



الشكل (١٢) الجهاز العصبي، وتفصيلاته في الإنسان.

انظر الشكل (١٢)، ولاحظ تركيب الجهاز العصبي في الإنسان.

- ما الأجزاء الرئيسية للجهاز؟
 - ما أهمية الجهاز العصبي لجسم الإنسان؟
- يتركب الجهاز العصبي في جسمك من ثلاثة أجهزة رئيسة مرتبطة بعضها وهي كالتالي:

أولاً: الجهاز العصبي المركزي (CNS) :

ويتكون من الأعضاء الآتية:

- **الدماغ (Brain)**: ويوجد داخل جمجمة الرأس، ويعتبر أهم الأعضاء في الجهاز العصبي ككل، وأكبرها حجماً، وزناً. ويبلغ وزن الدماغ في رأس الإنسان البالغ حوالي ١٥٠٠ غرام، بينما يصل عدد خلاياه حوالي ١٠٠ مليار خلية عصبية.

- ما أهمية وجود الدماغ داخل الجمجمة؟
نتيجة لأهمية عضو الدماغ للإنسان، ومن أجل المحافظة عليه من الصدمات والمؤثرات الخارجية

الأخرى، فقد حمى الحالق عزوجل الدماغ بصدوق الجمجمة التي تتميز عظامها بأنها أشد العظام صلابة في الجسم، إضافة إلى ذلك فقد وجد أن الدماغ محاط بثلاثة أغشية، تسمى الأغشية السحائية (Meninges) زيادة في المحافظة عليه من المؤثرات الخارجية، وهذه الأغشية مرتبة من الخارج إلى الداخل كالتالي:

أ - **غشاء الأم الجاف** (Duramater) ويتميز بأنه نسيج سميك يتكون من ألياف تبطّن عظام الجمجمة من الداخل.

ب - **غشاء الأم العنكبوتية (Arachnoid)** ويتميز بأنه نسيج شبكي يشبه بيت العنكبوت، ويقوم بعملية الربط بين غشاء الأم الجاف، وغشاء الأم الحنون المحيط بأجزاء الدماغ.


جـ - غشاء الأم الحنون (Pia Mater) ويتميز بأنه نسيج رقيق يغلف الدماغ بشكل مباشر، ويوجد سائل بين الأم العنكبوتية والأم الحنون يعمل على الزيادة في امتصاص الصدمات، وقد وجد أن الأغشية السحائية قد تتعرض لبعض الالتهابات الخطيرة، والتي قد تسبب الوفاة للإنسان إذا لم يتم معالجتها بسرعة.

النشاط (٣)

- قم ومجموعة من زملائك بزيارة إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي لجمع المعلومات عن الالتهاب السحائي في منطقتك.

ويتكون الدماغ من الأجزاء الآتية:

أـ - المخ (Cerebrum) ويشكل الجزء الأكبر من الدماغ؛ حيث يتربّك من نسيج



الشكل (١٣) مقطع طولي بين أجزاء الدماغ.

معخي مكون من طبقتين هما:

١ـ الطبقة الخارجية (القشرة)، وهي طبقة رقيقة تحتوي على أجسام الخلايا العصبية وألياف عصبية غير محاطة بأغماد نخاعية بحيث يبدو لونها رمادي، ولهذا تسمى المادة الرمادية (Grey Matter).

٢ـ الطبقة الداخلية (النخاع)، وتكون من مجموعة من الألياف العصبية المحاطة بأغماد نخاعية بحيث يبدو لونها أبيض؛ ولهذا فإنها تسمى المادة البيضاء (White Matter).

الشكل (١٣) .

وينقسم الدماغ إلى نصفين متباينين هما النصف الأيمن، والنصف الأيسر، وتظهر في كل نصف عدد من الأخداد، أو الشقوق يمكن بواسطتها تمييز فصوص الدماغ في كل نصف، وهذه الفصوص هي الفص الجبهي (الأمامي)، والفص الجداري، والفص الصدغي، والفص الخلفي، وقد وجد أن كل فص يتخصص بوظائف محددة سواء حسية أو حركية، كما اتضح أن المراكز الفصية للنصف الأيمن تتحكم بالجانب الأيسر من الجسم، بينما المراكز الفصية للنصف الأيسر تتحكم بالجانب الأيمن من الجسم.

- ما الجانب من الجسم الذي يصاب بالشلل عند حصول مشكلة للنصف الأيمن من الدماغ؟
- ب - المخيخ (Cerebellum)** : ويشكل الجزء الخلفي للدماغ؛ حيث يقع أسفل الفص الخلفي للمخ - الشكل (١٣)، ووظيفته تنظيم الحركات الإرادية للجسم والمحافظة على اتزانها؛ مثل: المشي، وحركات اليدين، وغير ذلك.
- ما الذي يحدث لحركات الإنسان عند حدوث مشكلة للمخيخ؟
- ج - النخاع المستطيل، أو ساق الدماغ (Brain Stem)**، ويربط بين المخيخ والحبل الشوكي في العمود الفقاري الشكل (١٣)، ويقوم بتنظيم الحركات الإرادية لبعض أعضاء النصف العلوي من الجسم؛ حيث يوجد به مراكز التنفس، والقلب، والبلع، والسعال، والعطس.
- الحبل الشوكي (Spinal Cord)**: ويتدنى من النخاع المستطيل داخل العمود الفقاري مشكلاً امتداداً للدماغ؛ حيث تحيط به نفس الأغشية السحائية التي تحيط بالدماغ.
- ما الأغشية السحائية التي تحيط بالنخاع الشوكي؟
- يتربّك نسيج الحبل الشوكي من طبقتين هما الطبقة الخارجية متكونة من المادة البيضاء، والطبقة الداخلية متكونة من المادة الرمادية. الشكل (١٤) .



الشكل (١٤) مقطع في الحبل الشوكي يوضح اتصال الأعصاب الشوكية.


- ما الفرق بين المادة الرمادية، والمادة البيضاء؟
- قارن بين نوع النسيج في الطبقة الخارجية، والطبقة الداخلية في كل من الدماغ، والحبل الشوكي.
- ويخرج من جانبي الحبل الشوكي (٣١) زوجاً من الأعصاب الشوكية يتصل كل عصب بالحبل الشوكي بجذري أحدهما ظهري يحتوي على الألياف والخلايا العصبية الحسية، والجذر الآخر

بطني يحتوي على ألياف الخلايا العصبية الحركية، يندمجاً الجذران ليكونا العصب الشوكي الذي يتكون من نوعين من الألياف العصبية الحسية والحركية لهذا تسمى الأعصاب المختلطة حيث تقوم بنقل السيالات العصبية الحسية والحركية بين أجزاء الجسم والحبال الشوكي في حركة دائمة تسمى رد الفعل العصبي المنعكس .

رد الفعل العصبي المنعكس Reflex Action

يتم الإحساس بالمؤثرات الخارجية وحدوث الإستجابة المناسبة لها في عملية مستمرة تسمى رد الفعل العصبي المنعكس يمثل رد الفعل العصبي إستجابة غير إرادية تلقائية للتغيرات الحادثة داخل الجسم أو خارجه، ويتدخل الدماغ في عمل بعض الأفعال المنعكسة كرمش العين عند اقتراب جسم منها، بينما لا يتدخل في بعضها الآخر كسحب اليد بسرعة عند ملامستها فجأة جسمًا ساخنًا حيث يقوم بذلك الحبل الشوكي وفقاً لما يلي :

- ١ - يؤدي تنبية النهايات العصبية (مستقبلات الألم في الجلد) بواسطة الحرارة إلى إعطاء الخلية العصبية الحسية الموجودة في عقدة الجذر الظاهري سيالات عصبية.



الشكل (١٥) القوس العصبي المنعكس .

- ٢ - تدخل السيالات العصبية إلى الحبل الشوكي وتنبه الخلية العصبية البينية والتي تنبه بدورها الخلية العصبية الحركية لتعطي سيالات تسبب إنقباض العضلة الهيكيلية والعضو المتأثر

مسببة سحب اليد بعيداً عن الجسم الساخن .
من خلال ملاحظاتك للشكل (١٥) ما الأجزاء التي يتتألف منها القوس العصبي المنعكس ؟ .

ثانياً: الجهاز العصبي الطرفي (Peripheral Nervous System):

ويتكون من الأعصاب التي تخرج من الدماغ، والجبل الشوكي وتنشر في أجزاء الجسم المختلفة لتنظيم عملها، وحركتها، وتتميز هذه الأعصاب بنوعين هما:

- ١- أعصاب تخرج من الدماغ: وتكون من (١٢) زوجاً من الأعصاب وتسمى الأعصاب الججممية (Cranial Nerves) لأنها تخرج من الجمجمة لتنظيم عمليات الإبصار، والسمع، والتذوق، ومضغ الطعام، وحركات اللسان، وحركات عضلات الوجه.
- اذكر أمثلة لبعض الأعصاب الججممية.

من أهم الأعصاب التي تخرج من الدماغ العصب البصري، والعصب السمعي، وأعصاب الشم، وأعصاب التذوق. كما يخرج من الدماغ العصب الحائر الذي يقوم بتنظيم النشاط الإرادي للأحشاء الداخلية في الجسم كالقلب، والرئتين، وقناة الهضم.

- ٢- أعصاب تخرج من الجبل الشوكي: وتكون من (٣١) زوجاً من الأعصاب، وتسمى الأعصاب الشوكية، وتقوم بعملية إستقبال الإحساس من مناطق الجسم المختلفة كالجلد، وتنظيم حركات الذراعين، والساقين، والعضلات الإرادية في أطراف الجسم، وعادة ما تنتاب الحركة في العضو عن طريق التنسيق بين المركز المنظم لها في الدماغ والأعصاب الشوكية المتصلة بالعضلات التي تنقبض، وتبسط لإحداث الحركة المطلوبة للعضو.

ثالثاً: الجهاز العصبي الذاتي (Autonomic Nervous System):

ويقوم بعملية التحكم، والتنظيم للحركات الإرادية التي تتم في أجزاء الجسم الداخلية، مثل عملية تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، وينقسم هذا الجهاز إلى جزئين رئيسيين.


لاحظ الشكل (١٦) ولاحظ كيف أن كل جزء من أجزاء الجهاز العصبي الذاتي يعمل عكس الآخر، وهذا الجزءان هما:

- ١- الجهاز العصبي السمباثاوي: ويقوم بعملية تنشيط وزيادة عمل أعضاء الجسم الداخلية كزيادة ضربات القلب عند حاجة الجسم إلى ذلك أو رفع ضغط الدم، أو توسيع حدقة العين، أو تشبيط إفراز اللعاب، أو ارتخاء الحويصلات الهوائية لزيادة الأكسجين فيها.

٢- الجهاز العصبي الجارسمباثاوي: ويعمل عكس الجهاز السمباثاوي، أي إنه يقوم مثلاً بتقليل ضربات القلب، أو ضغط الدم، أو تضييق حدة العين، أو تنبيه إفراز اللعاب، أو تضييق الشعيبات الهوائية في الرئتين وغير ذلك من الأنشطة اللاإرادية في الجسم.

- اذكر بعض الأمثلة الأخرى لوظائف الجهاز العصبي السمباثاوي؟

- اذكر بعض الأمثلة الأخرى لوظائف الجهاز العصبي الجارسمباثاوي؟



الشكل (١٦) الجهاز العصبي الذاتي.

النشاط (٤)

- نفذ النشاط الخاص بتشريح ضفدع، والتعرف على أجزاء الجهاز العصبي.

أعضاء الحس Sense Organs


يتفاعل الإنسان مع البيئة المحيطة به، ويتأثر بمؤثراتها المختلفة كالصوت ، والضوء ، والحرارة ، والرائحة ، ويستقبل هذه المؤثرات عن طريق تراكيب تسمى المستقبلات الحسية **Sense Organs** التي توجد في أعضاء الحس والمستقبلات الحسية متنوعة ، منها: المستقبلات الضوئية ، والكيميائية ، والآلية ، وتنمير بقدرتها على الاستشعار بالمؤثرات الخارجية والداخلية وقياسها ، والتعرف عليها ونقل معلومات عنها إلى الدماغ عن طريق امتصاص طاقة المؤثر ، وتحويلها إلى طاقة كهروكيميائية تنقل على هيئة جهد فعل بواسطة الأعصاب الحسية إلى المركز العصبي المختص في الدماغ ، الذي بدوره يقوم بترجمتها ليعطي الاستجابة المناسبة للمؤثر.

أولاً: المستقبلات الضوئية : Photoreceptors

تحتوي العين على مستقبلات ضوئية تعمل على امتصاص الطاقة الضوئية للجسم المائي وتكون له صورة على شبكة العين ، وتنتقل منها على هيئة سيالات عصبية بواسطة العصب البصري إلى مركز الإبصار حيث يتم ترجمتها وإدراكتها .

● تركيب العين :

العين هي عضو الإبصار في الحيوانات الفقارية ، ومنها الإنسان وتكون العين في الإنسان من المقلة ، والعضلات المحركة لها .
ادرس الشكل (١٧) الذي يمثل تركيب العين .
– ما الطبقات المكونة للعين ؟



الشكل (١٧) تركيب عين الإنسان .

- ما وظيفة كل طبقة ؟ لاحظ أن مقلة العين تتكون من ثلاثة طبقات نسيجية هي :
- ١- **الصلبة Sclera** طبقة بيضاء مكونة من نسيج ضام ليفي وهي غير شفافة عدا الجزء الأمامي منها المكون للقرنية (Cornea) التي تتميز بأنها عديمة اللون ، وشفافة ورطبة باستمرار نتيجة الدم الذي يفرز من الغدة الدمعية ، وتسمح بمرور الأشعة إلى الشبكية .

٢- المشيمية Choroid

طبقة معتمة سوداء لاحتواها على صبغات الميلانين، وهي غنية بالأوعية الدموية التي تغذى الشبكية. وتمتد المشيمية أمام القرنية مكونة القزحية Iris ويوجد بمنتصفها ثقب مركزي يعرف بحدقة العين، وتتكون القزحية من خيوط عضلية، وخلايا ملونة، ويعتمد لونها على كمية المادة الملونة الموجودة بها. أما الخيوط العضلية فتتحكم بحجم حدقه العين، وهي تضيق وتنسخ لتحكم في كمية الضوء التي تصل إلى العدسة وتوجد العدسة خلف القزحية، وهي مرن شفافة مثبتة بمكانها بواسطة أربطة، ومجموعة من العضلات المهدبة التي تحدد درجة تحدب العدسة حسب بعد الجسم الرئيسي؛ إذ يزيد تحديبها لرؤية الأجسام القريبة، ويقل عند رؤية الأجسام بعيدة، ويوجد في مقدمة العين بين القزحية والقرنية الغرفة الأمامية وبين القزحية والعدسة الغرفة الخلفية تمتلأ بسائل مائي يغذي القرنية والعدسة ويعمل على كسر الأشعة الضوئية والجزء خلف العدسة مملوء بمادة هلامية زجاجية وضغطه يحفظ للعين شكلها الكروي.

٣- الشبكية Retina

تتكون من ثلاثة طبقات من الخلايا هي:

- الخارجية: وتحتوي على خلايا الرؤية الحساسة للضوء وهي نوعان: العصي (Cones)، والخاريط (Rods).
- الوسطى: وتضم عصبونات ثنائية القطب، وهي التي تستقبل السيالات العصبية من خلايا الطبقة السابقة، وتنقلها إلى الخلايا العقدية.
- الداخلية: وتضم عصبونات عقدية، ووظيفتها إستقبال السيالات العصبية من الخلايا ثنائية الأقطاب، وتتجمع المحاور العصبية لخلايا هذه الطبقة لتكون العصب البصري Optic Nerve، وتسمى المنطقة التي يخرج منها العصب البصري البقعة العمياء.

الخلايا العصوية والخلايا المخروطية:

وهي مستقبلات الضوء؛ إذ تتأثر بالضوء الساقط عليها عبر فتحة الحدقه وذلك بعد مروره بالعدسة التي تجمعه وتسقطه على الشبكية، وتتكون صورة مقلوبة مصغرة عليها. وتتوزع الخلايا العصوية والمخروطية في الشبكية كالتالي:

- ١- الخلايا العصوية: تتركز على الحواف الخارجية للشبكة، وهي حساسة للضوء الخافت، لذا فهي المسئولة عن الرؤية الليلية **Night Vision**، ولكنها لا تستطيع تمييز الألوان بسهولة، ويبلغ عددها حوالي مائة مليون خلية في كل عين.
- ٢- الخلايا المخروطية: تتركز في المنطقة المركزية من الشبكة وتعمل في الضوء الساطع، مثل ضوء الشمس لذا فهي مسئولة عن الرؤية الحادة، والرؤية النهارية **Day Vision** وهي حساسة للألوان؛ حيث تستطيع التمييز بين الألوان المختلفة. ويبلغ عدد الخلايا المخروطية حوالي خمسة ملايين خلية في كل عين.
- كيف تفسر وضوح الرؤية في الضوء الساطع؟



الشكل (١٨) الخلايا المخروطية والعصوية في العين.

ادرس الشكل
(١٨) لاحظ كيف تتصل الخلية العصبية الواحدة ثنائية القطب بعدد من الخلايا العصوية. أما الخلايا المخروطية فكل خلية منها تتصل بخلية واحدة من ثنائية القطب، وهذا ما يفسر وضوح الرؤية في الضوء الساطع.


آلية الإحساس بالرؤية : Vision Sensation :

إن صورة المرئيات تقع على المستقبلات الضوئية الموجودة في الشبكة، والمتمثلة في الخلايا العصوية، والمخروطية، والتي تتأثر بالمؤثر الضوئي، وتحوله إلى سيالات عصبية ترسله إلى مراكز الإبصار في الدماغ ليتم إدراكتها.

- كيف تتأثر الخلايا العصوية، والمخروطية بالضوء؟

- كيف يتحول ذلك التأثر إلى سيالات عصبية؟

تحتوي الخلايا العصوية على صبغة الرودوبسين **Rhodopsin** الحساسة للضوء مما يمكنها من الاستجابة للضوء بسهولة، وإن كان خافتاً، فعندما تسقط الموجات الضوئية على هذه الصبغة فإنه يتحول إلى صورة أقل تماسكاً مما يسبب تفككه إلى نوائح كيميائية مختلفة، وتسبب هذه التحللات الكيميائية المتعاقبة تغيرات في فرق الجهد الكهربائي لغشاء الخلايا العصوية مما يسبب نشوء جهد فعل يسري على هيئة سيالات عصبية تنقل



الشكل (١٩) آلية الرؤية في العين

عبر العصب البصري إلى الدماغ. وعادة يتم إعادة صبغ الرودوبسين بسرعة من نوائح التحلل السابقة حيث يكون قادرًا على استقبال موجات ضوئية جديدة. شكل (١٩). وتستمر عملية تحلل الصبغ، وإعادته مرة أخرى ما دامت عملية الإبصار مستمرة. ويعتبر الصبغ الشبكي **Retinal** أحد مكونات الرودوبسين الأساسية، ويمكن الحصول عليه في الجسم من فيتامين (A).

– كيف يمكن التمييز بين الألوان المختلفة؟

تحتوي الخلايا المخروطية على صبغات بصرية خاصة (اليودوبسين **Iodopsin**) تعمل بصورة مشابهة لطريقة عمل الرودوبسين في الخلايا العصوية، وتستطيع التمييز بين الأطوال المختلفة للأمواج الضوئية مما يسهل عملية تمييز الألوان، ورؤية تفاصيل الأشياء، وهي تكثر في البقعة الصفراء من الشبكية، كما أن شدة تأثير اليودوبسين بالأطوال الموجية المختلفة يتبعه اختلافات في السيالات العصبية الصادرة من كل منها، ويستطيع الدماغ تحليل السيالات العصبية المختلفة، ومنها يتعرف على ألوان الطيف الضوئي (المرئي) التي من خلالها يتم إدراك ألوان صورة الجسم المرئي وأي خلل وراثي في الخلايا المخروطية قد ينتهي بهم إلى عدم القدرة على تمييز الألوان فيكون الشخص مصاباً بمرض عمى الألوان.

- اكتب تقريراً عن مرض عمى الألوان.

قضية للبحث

ثانياً : المستقبلات الكيميائية Chemoreceptors

توجد هذه المستقبلات في الأنف، ووظيفتها التعرف على الروائح المختلفة، وكذلك توجد على سطح اللسان لمعرفة المذاقات المختلفة للأطعمة التي نأكلها، وتتأثر هذه المستقبلات بالماء الكيميائي. والمستقبلات الكيميائية في جسم الإنسان نوعان هما:

١- مستقبلات الشم Olfactory Receptors


- أين توجد مستقبلات الشم؟

ادرس الشكل (٢٠) ولاحظ كيف تتكون خلايا الشم من عصبونات حسية متحورة، تسمى الخلايا الشمية التي تتشابك مع ألياف عصبية لتكون العصب الشمي، وتحيط بالخلايا الشمية خلايا داعمة وخلايا مفرزة للمخاط، ويوجد في نهاية كل خلية شمية أهداب تقع عليها مستقبلات الماء الكيميائي المختلفة.

آلية الشم Smell Sensation

- هل تسأله كيف يمكنك شم الروائح المختلفة والتمييز بينها.

تم عملية الشم للروائح وفق الخطوات الآتية:



- ١- تصل الروائح بموادها الكيميائية على شكل غاز، أودقائق صغيرة عالقة في الهواء إلى بطانة الأنف أثناء التنفس .
- ٢- تذوب هذه المواد في السائل المخاطي المبطن للتجويف الأنفي .
- ٣- تتأثر الخلايا الشمية بالرائحة وترتبط المادة الكيميائية بالمستقبلات الشمية .
- ٤- تتولد السيالات العصبية الحسية وينقلها العصب الشمي إلى مركز الشم في الدماغ المسئول عن إدراك وتمييز الروائح المختلفة .

٢- مستقبلات التذوق Taste Receptors

- أين يوجد اللسان؟ ما وظيفته؟

- هل تساءلت كيف يمكن للسان تذوق الأطعمة المختلفة؟

ادرس الشكل (٢٠)، ولاحظ مستقبلات التذوق في اللسان، وهي نوع من المستقبلات الكيميائية، وكيف تبدو على شكل براعم تذوقية تنتشر بكثرة على اللسان، كما توجد في مناطق أخرى تلامس الطعام كالبلعوم، وسقف الحلق، ولسان المزمار. ويكون كل برعم من براعم التذوق من مجموعة خلايا تسمى خلايا التذوق، وخلية التذوق مغزلية الشكل يمتد من طرفها الخارجي شعرة تذوقية تبرز على سطح اللسان في الطبقة المخاطية ويتصل طرفها الداخلي بليفة عصبية حسية، وهناك أربع مناطق متخصصة في الإحساس بمذاقات الطعام (الحلو والمر والحامض والمالح) "حدد مواقعها في اللسان من الشكل (٢٠)" .

آلية التذوق :

تتم عملية التذوق وفق الخطوات الآتية:

- ١- يذوب الطعام الواصل إلى الفم في اللعاب، وترتبط جزيئاته مع المستقبلات الكيميائية الموجودة على شعيرات الخلية التذوقية .
- ٢- تتأثر الشعيرة التذوقية بالمادة الذائبة في اللعاب نتيجة ارتباطها بمستقبلات التذوق وينتقل عندها سيالات عصبية حسية عبر الشعيرة إلى الليفعة العصبية الحسية .
- ٣- ترسل السيالات العصبية عبر الخلايا العصبية الحسية إلى مراكز التذوق في الدماغ المسئولة عن تمييز مذاقات ونكهات الأطعمة المختلفة .

العلاقة بين حاسة الشم، وحاسة التذوق :

– لماذا يقل إحساسك بالشم، وتفقد جزءاً كبيراً من القدرة على التذوق عندما تصاب بالزكام؟

– عندما تقرب برتفاقية من أنفك تميز رائحة البرتفاقية وطعمها. كيف يحدث ذلك؟
تنتقل العazas الطيارة من على ثمرة البرتفاقية مع هواء الشهيق إلى داخل الأنف، وتذوب في المخاط مما يساعدك على تمييز الرائحة، وفي نفس الوقت تصل هذه العazas إلى الفم عن طريق البلعوم حيث تذوب في اللعاب وبالتالي تؤثر على براهم التذوق فتشعر بطعم البرتفاق، وعليه فهناك علاقة وطيدة بين الإحساس بالشم والتذوق، وكل منهما يقوى الآخر.

– لماذا تشعر بمذاق الطعام الساخن أكثر من الطعام البارد عند شمه؟

ثالثاً المستقبلات الآلية Mechanoreceptors

أ : مستقبلات الصوت والتوازن Hearing and Balance Receptors

– كيف ينتقل الصوت في الهواء؟

توجد مستقبلات الصوت، والتوازن في الأذنين. ومستقبلات الصوت تتتأثر بال WAVES الصوتية الناتجة من المنبه الصوتي (منبه آلي)؛ إذ يقوم المستقبل الصوتي بتحويل طاقة الصوت الآلية إلى طاقة كهروكيميائية على هيئة جهد فعل يسري بشكل سیال عصبي في ألياف العصب السمعي التوازني إلى مركز السمع في الدماغ؛ حيث يتم ترجمته وإدراكه.

تركيب الأذن في الإنسان :


ادرس الشكل (٢١) ،

وتعرف على أجزاء الأذن
ومحتوياتها .

– ما أسماء الأجزاء الرئيسية
الثلاثة التي تتركب منها
الأذن؟

– ما وظيفة كل جزء منها؟

– ما مكونات كل من الأذن
الوسطى والأذن الداخلية؟




الشكل (٢١) تركيب أذن الإنسان

لاحظ أن الأذن تتكون من:

- ١- الأذن الخارجية التي تتكون من صوان الأذن، والقناة السمعية والطبلة، كما تحتوي الأذن الخارجية على غدد تفرز مادة شمعية لحماية الأذن الوسطى.
- ٢- الأذن الوسطى:
عبارة عن تجويف يقع خلف الطبلة، ويتصل بتجويف البلعوم بواسطة قناة استاكيوس المسئولة عن تعادل الضغط الجوي على جانبي غشاء الطبلة، وتوجد في الأذن الوسطى ثلاث عظيمات سمعية. ما هي؟
- ٣- الأذن الداخلية : عبارة عن تجويف مملوء بسائل شفاف تؤدي حركته إلى تنبيه مستقبلات الصوت، أو التوازن. تتكون من :
 - القوقعة **Cochlea** التي تحتوي على مستقبلات الصوت، وتتكون هذه المستقبلات من خلايا شعرية .
 - القنوات الهلالية (**Semicircular Canals**) التي تحتوي على مستقبلات التوازن.

آلية السمع :

- كيف يسمع الإنسان الأصوات ويميزها؟
- تقوم الأذن الخارجية بتجميع الأمواج الصوتية بواسطة صوان الأذن، ومن ثم نقلها عبر القناة السمعية إلى الطبلة، فتهاiza الطبلة. شكل (٢٢) .



الشكل (٢٢) قطاع في القوقعة.


– لماذا تقل قدرة الإنسان على السمع عندما تتمزق الطبقة؟
يؤدي اهتزاز الطبقة إلى تحريك العظيمات الثلاث الموجودة في الأذن الوسطى
(المطرقة – السندان – الركاب).

تنتقل الاهتزازات من عضمة الركاب إلى السائل الموجود في القوقعة بالأذن الداخلية عبر الكوة البيضية.

توثر اهتزازات السائل في القوقعة على مستقبلات الصوت الموجودة في خلايا السمع، وتقوم بتحويله إلى سignals عصبية.

تنتقل السignals العصبية من خلايا السمع إلى الأعصاب القووية التي تكون العصب السمعي وتجه مع عصب السمع التوازني إلى مركز السمع بالدماغ.
يقوم مركز السمع بتحويل الإشارات العصبية إلى أصوات يسهل على الإنسان إدراكها وتمييزها. شكل (٢٣).

مستقبلات التوازن :



الشكل (٢٣) مستقبلات التوازن في القرية والكيس والقارورة

ادرس الشكل (٢٣) لتعرف مستقبلات التوازن، لاحظ أن جهاز التوازن يتكون من:

١- القنوات الهلالية: وهي عبارة عن ثلات قنوات لها القدرة على تحديد اتجاه حركة الرأس الدائرية، وتحديد سرعة هذه الحركة عن طريق مستقبلات التوازن التي تقع داخل إنتفاخات عند قواعد هذه القنوات، وتتكون مستقبلات التوازن من خلايا شعرية تُغْطِي شعيراتها بمادة جيلاتينية، وعند حركة الرأس يتحرك السائل الذي يملاً القنوات محركاً معه مستقبلات التوازن التي تؤثر على الخلايا الشعرية الموجودة بها محدثة سيالات عصبية تنتقل عبر عصب التوازن الحسي إلى عصب السمع التوازني، ومنه إلى الدماغ الذي يقوم بتحليل الإشارات العصبية الواردة وتحديد إتجاه حركة الرأس تحديداً صحيحاً.

٢- الدهلiz: يحتوي على كيسين صغيرين ملؤين بالسائل، هما القرية، والكبس. ويحتوي كل منهما على مستقبلات التوازن التي تحتوي على خلايا شعرية تُغْطِي شعيراتها بمادة جلاتينية بها حبيبات من كربونات الكالسيوم، تسمى حصى الأذن، وعندما ينحني الرأس عمودياً، أو جانبياً فإن هذه الحركة تسبب حركة عكسية في السائل اللمفـي في بداية الأمر، ثم يتحرك السائل باتجاه حركة الرأس مسبباً حركة المادة الجيلاتينية المنغمس فيها حصى الأذن التي تضغط على الشعيرات فتنتج سيالات عصبية تنقل عبر عصب التوازن الحسي إلى عصب السمع التوازني، ومنها إلى الدماغ حيث تحدد وضع رأس الإنسان بالنسبة للجاذبية (حركة الرأس الأفقية والعمودية) كما تدل على أي تغير في السرعة عند السير في خط مستقيم.

• اكتب تقريراً عن مدى ما يسمعه الإنسان من أصوات،
قارن ذلك بما تسمعه بعض الحيوانات الأليفة.


قضية للبحث

ب- المستقبلات الحسية في الجلد

تنشر المستقبلات الآلية في جميع أنحاء الجلد، وتتركز بصورة كبيرة في الأنامل، وهذه المستقبلات تساعدك على الإحساس باللمس، والضغط، والحرارة، والألم . انظر الشكل (٢٤) الذي يمثل قطاع في الجلد لنعرف أنواع المستقبلات الآلية الموجودة في الجلد.

- ما الطبقات التي يتراكب منها جلد الإنسان؟
- صف طبقة الأدمة من حيث التركيب والوظيفة؟
- لماذا يعتبر الجلد عضواً للأحساس؟

ت تكون طبقة الأدمة في الجلد من نسيج ضام وتحتوي على أوعية دموية، وبصيلات شعرية وعدد عرقية، ودهنية، وأعصاب حسية تحوي مستقبلات الأحاسيس العامة، وهي متعددة الأشكال والأحجام، والوظائف. ومن المستقبلات الآلية الآتي :



الشكل (٢٤) المستقبلات الحسية في الجلد.

١- مستقبلات اللمس : Touch Receptors

وتسمى حوصلات مييسنر **Meissner's Corpuscles**، وهي بيضاوية الشكل، وتحتوي كل حوصلة على ليفه عصبية حسية تنتهي أفرعها بأزرار حسية صغيرة تقوم بوظيفة الإحساس باللمس.

٢- مستقبلات الحرارة : **Heat Receptors** وهي منتشرة في الجلد، وتتأثر بالتغييرات الحرارية لسطح الجلد، ومن مستقبلات الحرارة نهايات روفيني للسخونة **Krause End Bulbs** ونهايات كراوس للبرودة **Ruffini's Endings**.

٣- مستقبلات الضغط : **Pressure Receptors** تسمى حوصلات باسيني، وت تكون من عدة طبقات من نسيج ضام، وتحتوي في مراكزها على نهايات عصبية خلية عصبية حسية تستجيب للضغط عند التنبية.

٤- مستقبلات الألم : **Pain Receptors** وينتج الألم عن تنبيه مستقبلات الألم الموجودة في الجلد، أو العضلات، أو المفاصل، أو الأعضاء بسبب تهيج الأنسجة الناتج عن الجروح، أو الشد العضلي، أو التواء المفاصل التي تحمي العضلات والأوتار والأربطة والنسيج الضام من التمزق، كما ينتج الألم عن تنبيه المستقبلات الموجودة في الأحشاء الداخلية بسبب تهيج الأعضاء الناتج عن المغص، أو حصوات الكلى مثلاً.

- اكتب بحثاً عن أحد أمراض أعضاء الحس في منطقتك وطرق الوقاية من هذا المرض، مستعيناً بالمراجع الموجودة في مكتبة مدرستك.

قافية للبحث

تقويم الوحدة

١- علل لما يلي :

- في حالة تعرض يدك لوحزة دبوس فإنك تبعد يدك أولاً، ثم تدرك سبب الألم.
- الأذن عضو للسمع وعضو الاتزان.
- مفعول الأستيل كولين مؤقت ، ومحدد المكان.
- المواد الصلبة غير المتطايرة ليس لها رائحة.
- يصاب بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (A) بمرض العشي الليلي.
- أهمية أحاديد القشرة الحية.

٢- اكتب عن :

- مضخة الصوديوم.
- المشيمية والسائل الزجاجي في العين.
- الزر التشابكي .
- القنوات الهلالية في الأذن.
- المخيخ.
- مستقبلات الألم.

٣- اشرح الآليات في كل مما يأتي :

- الشم.
- انتقال السائل العصبي بطريقة التأثير الدائري الموضعي.
- الإحساس والاستجابة في القوس العصبي المنعكس.
- التذوق .

٤- ما وظيفة التراكيب الآتية :


- خلايا الغراء العصبي النجمية.
- قناة استاكيوس.
- الطبقة الصلبة.
- الغمد الميليني .
- الأعصاب الججممية.
- النخاع المستطيل.

٥- قارن بين كل مما يأتي :

- المادة الرمادية والمادة البيضاء في الجبل الشوكي من حيث مكوناتهما العصبية.

- خلايا شفان والخلايا الدبقية قليلة التسجير من حيث مكان الوجود والوظيفة.

٦- ادرس الاشكال الآتية التي تمثل أعضاء الحس، ثم أجب عن الأسئلة التي تليها:



(9.8.7.6.5.4.3.2.1) - اكتب أسماء الأجزاء المشار إليها بالأرقام

- ما وظيفة الجزء المشار إليه بالرمز (أ).

- ما العملية التي تحدث في الجزء المشار إليه بالرمز (ب).


٧- صُف كُلَّاً مَا يَأْتِي :

- الجلد (موضحاً كيف يعمل كعضو اللمس).

- الأعصاب الشوكية.

- العصب.

٨- الشكل المجاور يوضح ثلاث خلايا عصبية في الإنسان حسب وظيفتها والمطلوب الآتي :



- اذكر اسم كل من الخلايا

(أ، ب، ج) .

- حدد اتجاه السيال العصبي

مستخدماً رموز

الخلايا العصبية.

- سُمِّي الأجزاء الممرضة من

(١) إلى (٥) .

٩- ارسم مع كتابة البيانات كلاً من :


- الأجزاء المختلفة للعين.

- مقطع طولي يبين أجزاء الدماغ.

- الخلية العصبية في الإنسان.

التنظيم الهرموني Hormonal Regulation

الوحدة الثانية



أهداف الوحدة

يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن:

- ١- تُعرّف مفهوم الهرمون، والتنظيم الهرموني في الكائنات الحية.
- ٢- توضح دور بعض الهرمونات في العمليات الحيوية للنبات.
- ٣- تصف بعض الهرمونات التي تفرز من الغدد الصماء في جسم الإنسان.
- ٤- توضح دور التنظيم الهرموني في تنسيق عمل أجهزة الجسم.
- ٥- تبين العلاقة بين التنظيم الهرموني، والتنظيم العصبي.
- ٦- تصف بعض الحالات المرضية الناجمة عن الاضطرابات الهرمونية.

التنظيم الهرموني Hormonal Regulation

عرفت أن أجهزة الجسم المختلفة تعمل في تناسق، وتأزر تام للقيام بالعمليات الحيوية المختلفة.

- من المسئول عن عملية التنسيق بينها؟

إن هذا التنسيق يحدث بفعل التأزر بين التنظيم العصبي والتنظيم الهرموني في أجسام الكائنات الحية ذات الأجهزة العصبية والهرمونية، ويساعدها هذا التأزر في تنسيق جميع أنشطة الجسم المختلفة كالحركة، والانتقال، والهضم والنقل، والإخراج والحفاظ على توازن سوائل الجسم.

وقد عرفت التنظيم العصبي، وكيفية عمله، وعرفت أن التنسيق العصبي يتميز بسرعة الاستجابة، واستمراريتها لفترة زمنية قصيرة، ولكن كثيراً من العمليات الحيوية كالهضم والنمو تحتاج إلى تنسيق بطيء التأثير، ويستمر لفترة طويلة تسمح بتحقيق الاستجابة المطلوبة لتلك العمليات، ويتولى هذا التنسيق البطيء التنظيم الهرموني في الجسم.

ويحتوي جسم الكائن الحي على جهاز هرموني يعمل بالتأزر مع الجهاز العصبي لتنسيق عمل بعض العمليات الحيوية التي تحتاج إلى تأثير بطيء، ويتميز بمحض طويل المدى، ويطلق عليه جهاز الغدد الصماء **Endocrine System**، ويقوم هذا الجهاز بإفراز الهرمونات اللازمة لعملية التنظيم.

- فما المقصود بالهرمونات؟

الهرمونات : Hormones

هي مواد كيميائية معقدة التركيب تُفرز بكميات ضئيلة من غدد متخصصة في الجسم، وتعمل على تنظيم وتنسيق عمل أجهزة الجسم المختلفة مع بعضها ومع البيئة الحية، مثل هرمون الشيروكسين الذي يُفرز من الغدة الدرقية، وهرمون الأنسولين الذي يُفرز من جزر لانجر هانز في البنكرياس. وتوجد الهرمونات في أجسام الحيوانات وفي النبات أيضاً.

التنظيم الهرموني في النبات :

- اذكر بعض العمليات الحيوية والنشاطات الفسيولوجية في النبات؟

- من المسئول عن تنظيم مثل هذه النشاطات الفسيولوجية في النبات؟

تحدث داخل النباتات عمليات حيوية بشكل مستمر كعملية البناء الضوئي وعملية التنفس، وتكوين الأزهار والثمار، وتتأثر بعض العمليات الحيوية بعوامل البيئة

المختلفة، وهذه العمليات ونشاطاتها الفسيولوجية تتم بواسطة الهرمونات النباتية وهي مواد كيميائية تفرزها خلايا النباتات الحية مثل خلايا القمم النامية والبراعم، والأوراق حديثة السن، والبذور بتركيزات ضئيلة، وتنقل بواسطة الحزم الوعائية إلى أماكن تأثيرها في أجزاء النبات المختلفة.

– ما أنواع الهرمونات النباتية؟ وما وظيفة كل منها؟
لتتعرف على أنواع الهرمونات النباتية، ووظائفها، وأماكن إفرازها ادرس الجدول (١) وأجب عن الأسئلة التي تليه:

جدول (١) الهرمونات النباتية ووظائفها

الوظيفة	مكان الإفراز	اسم الهرمون
<ul style="list-style-type: none"> ١- تنشط استطالة الخلايا. ٢- تسيطر على الانتداب الضوئي والأرضي. ٣- تنشط نمو الجذور الثانوية، وتمايزها. ٤- تسيطر على تفرع الساق. 	<ul style="list-style-type: none"> ١- القمم النامية. ٢- البذور. ٣- الأوراق حديثة السن. 	الأوكسجينات Auxins
<ul style="list-style-type: none"> ١- تنشط انقسام الخلايا. ٢- تنشط عملية نمو البذور. ٣- تؤثر في نمو الجذور، وتمايزها. ٤- تؤخر شيخوخة النبات (مضاد للشيخوخة). 	<ul style="list-style-type: none"> - الجذور. 	السيتوكينينات Cytokinins
<ul style="list-style-type: none"> ١- تشجع استطالة الساق. ٢- تشجع نمو البراعم والأوراق. ٣- تحفّز على نمو الشمار، ويستعمل لرش العنبر فيزيداد حجم ثماره، وتزداد مقاومته للفطريات. ٤- تؤثر في نمو الجذور، وتمايزها بقلة. ٥- تنشط عملية إنبات البذور. 	<ul style="list-style-type: none"> ١- القمم النامية في البراعم والجذور والأوراق حديثة السن. ٢- الجنين (في البذرة). 	الجبريلينات Gibberellins
<ul style="list-style-type: none"> ١- تبطّن النمو. ٢- تشجع كمون البراعم والبذور. ٣- إغلاق الشغور أثناء فترات الجفاف. 	<ul style="list-style-type: none"> ١- الأوراق. ٢- السيقان. 	حامض الأبسيسك Abscisic Acid
<ul style="list-style-type: none"> ١- تسريع نضج الشمار، وإسقاطها. ٢- تبطّن استطاله الساق. ٣- إسقاط الأوراق المسنة. 	<ul style="list-style-type: none"> ١- الشمار الناضجة. ٢- العقد في السيقان. ٣- الأوراق المسنة. 	الإيثيلين Ethylene

- من أين يُفرز كلُّ من الإيثيلين، وحمض الأسيك؟
- ما وظيفة كل من الجبريلينات والأوكسجينات؟
- بِين دور السيتوكينينات في عملية الانقسام.

النشاط (١)

- نَفَد النشاط الخاص بتوضيح أثر هرمون الإيثيلين الموجود في كتاب الأنشطة.


دور الهرمونات النباتية في النمو :

تتأثر النباتات بالمتغيرات التي تحدث داخلها وخارجها، فعوامل البيئة المحيطة مثل أشعة الشمس تؤثر على سير بعض العمليات الحيوية التي تحدث داخل النباتات، وتظهر النباتات استجابةً لهذه العوامل وتعد حركة النبات من أهم مظاهر الاستجابة، وتقتصر الحركة في النباتات الراقية على بعض الأجهزة والأعضاء، ويعد النمو نوعاً من الحركة، ويُعرف المؤثر الخارجي بالمشير **Stimulus** بينما يُعرف التغيير الحادث من قبل النبات بالاستجابة **Response** ، وقد تكون الحركة نحو المشير أو بعيداً عنه في عملية تسمى الانتهاء، مثل اتجاه النبات نحو الضوء، وقد لا تعتمد الحركة على اتجاه المشير وتسمى إنتهاء حر، مثل تفتح بعض الأزهار، وتعد الحركة موجبة حينما ينتحي العضو تجاه المشير، وسالبة إذا ما انتهى في الإتجاه المعاكس، وبعد الانتهاء رد فعل حركي لعضو النبات، وتنظم هذه الحركة بواسطة الأوكسجينات . وأهم أنواع الانتهاءات في النبات ما يأتي :

١- الإِنْتَهَاءُ الْأَرْضِيُّ :

- هل تسألت يوماً عن السبب الذي يجعل الساق في النبات ينمو إلى أعلى والجذور تنمو إلى أسفل؟
- كيف تؤثر الهرمونات على هذه العمليات؟

تؤثر الجاذبية الأرضية على توجيه نمو النبات؛ وتعمل مع العوامل البيئية الأخرى على توزيع الأوكسجينات أثناء الإنبات والنمو. فعند الزراعة توضع البذور في أي وضع داخل التربة، أما عند الإنبات والنمو فإن الساق تنمو إلى أعلى، والجذر إلى الأسفل في إتجاه الجاذبية الأرضية، فلو نبت الجذر ونما بشكل أفقي فإن الأوكسجينات تتركز في الجانب السفلي من الجذر بسبب تأثير الجاذبية الأرضية، وزيادتها في



الشكل (١) الإنتحاء الأرضي.

الجانب السفلي يشطب استطالة الخلايا في هذا الجانب، وينشط استطالتها في الجانب العلوي فینحنی الجذر إلى أسفل داخل التربة؛ فالجذر موجب الإنتحاء الأرضي - شكل (١). وتنمو الساق إلى أعلى نتيجة لتركيز الأوكسجينات في الجانب السفلي، الذي يؤدي إلى استطاله الخلايا في هذا الجانب، مقارنة مع الجانب العلوي، فینحنی الساق أثناء نموه إلى أعلى عكس الجاذبية الأرضية مما يجعل الساق سالب الإنتحاء الأرضي.

- كيف تفسر الإنتحاء الأرضي في النبات؟



الشكل (٢) الإنتحاء الضوئي.

٢- الإنتحاء الضوئي :

- ما دور الأوكسجينات في عملية الإنتحاء الضوئي؟

ادرس الشكل (٢)، ماذا تلاحظ؟

عند وضع أي نبات زينة على نافذة المنزل، تلاحظ أن أجزاء النبات تحنى نحو الضوء نتيجة استجابة النبات للضوء بسبب تأثير الأوكسجينات.

- كيف تتحرك أجزاء النبات نحو الضوء؟ تتميز الأوكسجينات بقدرة حساسيتها للضوء،

فعندما تتعرض ساق النبات للضوء من جانب واحد، تتركز الأوكسجينات في الجانب بعيد عن الضوء، وتعمل على إستطاله الخلايا في ذلك الجانب بمعدل أعلى من الجانب الآخر فینحنى النبات نحو الضوء.

النشاط (٢)

- نفذ النشاط الخاص بالإنتحاء الضوئي الموجود في كتاب الأنشطة والتجارب.

وقد توصل العلماء إلى أن بالإمكان استخدام الهرمونات النباتية في عملية تطوير الإنتاج الزراعي والنباتي لما فيه مصلحة الإنسان والبيئة.

تطبيقات عملية للهرمونات النباتية

- كيف يستفاد من الهرمونات النباتية في تحديث المجالات الزراعية؟
- أدت الهرمونات النباتية دوراً كبيراً في التطبيقات العملية الزراعية فقد أدخلت في :
 - تكوين الجذور العرضية: تستخدم الأوكسجينات في عملية التكاثر الخضري، بواسطة العُقل لتكوين الجذور العرضية، ويعمل بهذه الطريقة حالياً في المشاتل، والحدائق.
 - تكوين ثمار بدون بذور: تستخدم الأوكسجينات في رش الأزهار غير الملقة لإنتاج ثمار عديمة البذور كما في البطيخ، والتفاح، وغيرها.
 - تكوين الأزهار: تستخدم الجبريلينات في تنشيط تكوين الأزهار في بعض النباتات.
 - منع تساقط الشمار والأوراق: استخدمت الأوكسجينات في تأخير عملية تساقط الأوراق، والشمار قبل نضوجها، وقد تم تطبيق هذه العملية والاستفادة منها في تأخير سقوط أوراق وثمار التفاح، والطماطم، والكمثرى، والمانجو، وبعض الحمضيات.
 - إبادة الأعشاب الضارة: تستخدم بعض أنواع الأوكسجينات في رش الحشائش الضارة فتقتضي عليها، وتنزع نموها من جديد.

النشاط (٣)

- نفذ النشاط الخاص بتأثير الأوكسجينات على تكوين الجذور العرضية في النبات .


التنظيم الهرموني في الحيوان

تعمل الهرمونات مع الجهاز العصبي في معظم الحيوانات على تنظيم العمليات الحيوية داخل أجسامها. فالهرمونات مثلاً تنشط النمو والتكاثر اللاجنسي في الهيدرا، وتتمثل مفصليات الأرجل جهازاً هرمونياً يؤدي دوراً هاماً في عملية النمو، والتكاثر والانسلاخ.


أما في الحيوانات الفقارية فإن الهرمونات تفرز من أعضاء تسمى الغدد **Glands** ، والغدة عبارة عن مجموعة من الخلايا الطلائية المتحورة للقيام بوظيفة إفرازية . وتقسم الغدد من حيث وجود القنوات إلى :

١- غدد قوية. **Exocrine Glands**

انظر الشكل (٣) ولاحظ أن الغدة تصب إفرازاتها إلى الخارج عن طريق قنوات ، ومن أمثلة هذا النوع من الغدد: الغدد اللعابية، والغدد اللبنيّة، والغدد العرقية، والمرارة.



الشكل (٣) غدة قنوية.



الشكل (٤) غدة صماء.

٢- غدد لا قوية (صماء) :

وهي عبارة عن غدد صماء تفرز هرمونات، وتصب إفرازاتها في الدم مباشرة مثل: الغدة الدرقية، والغدة النخامية. الشكل (٤) .

وتتميز الغدة الصماء بخلايا طلائية غزيرة الإفراز، وغنية بالأوعية الدموية، وتتميز هرموناتها بالقدرة على الانتشار بسرعة في الأنسجة محدثة فعلاً سريعاً، كما أنها تفرز في ظروف معينة لتأدية وظيفة خاصة، لذا يتخلص منها جسم الحيوان بسرعة، إما بتحليلها إلى مركبات بسيطة، أو بإخراجها إلى خارج الجسم. ولجميع الفقاريات

غدد صماء مثل: النخامية، والدرقية، والكظرية، والمناسل. ولذا فإن الفقاريات تمتاز بجهاز هرموني متكامل يعمل على تنظيم وظائف الجسم وعملياته المختلفة.

التنظيم الهرموني في الإنسان Hormonal Regulation

عرفت دور الرسائل العصبية في تنسيق الوظائف، والعمليات المختلفة في جسمك، ولكن هناك عمليات لا يتم حدوثها بدون وجود الهرمونات المنظمة لذلك.

ـ ما الفرق بين التنظيم العصبي والتنظيم الهرموني؟

تنقل الرسائل العصبية بواسطة السيالات العصبية، داخل الجهاز العصبي لتقوم بعملية التنظيم، بينما تنقل الرسائل الكيميائية الهرمونية بواسطة الدم إلى أماكن تأثيرها. وتحتمل الرسائل الكيميائية الهرمونية بتأثير واسع النطاق، ومفعول طويل المدى في تنظيم العمليات داخل جسم الإنسان.

ـ ما أهمية التنظيم الهرموني للإنسان؟

تسهم الهرمونات في المحافظة على اتزان البيئة الداخلية للجسم، وفي تنظيم عمليات النمو، والتكاثر، وإنتاج الطاقة، وتخزينها، واستخدامها عند الحاجة، كما تؤثر الهرمونات في سلوك الفرد وتفاعلاته مع الآخرين من حوله.

ـ هل يوجد تنسيق بين عمل التنظيم الهرموني والتنظيم العصبي في جسم الإنسان؟

إن التنظيمين الهرموني والعصبي يعملان بصورة متكاملة لوجود علاقة تركيبية

كيميائية ووظيفية، وتوضح العلاقة بين التنظيمين لـ استخدام الجهاز العصبي هرمونات مثل (الأسيتايول كولين) الذي يفرز في التشابك العصبي كنواقل عصبية تعمل على توصيل السيالات العصبية بين الخلايا العصبية.

كما تتأثر الغدد الصماء بطريقة غير مباشرة بالتغيير العصبي الذي يحدث على الألياف العضلية الموجودة في جدران الأوعية الدموية التي تُغذي هذه الغدد بالدم.

عمل الهرمونات :

تقسم الهرمونات من الناحية الكيميائية إلى :

١- الهرمونات الببتيدية **Peptide Hormones** مثل هرمونات الغدة النخامية، وجزر لانجر هانز.

٢- الهرمونات الستيرويدية **Steroids Hormones** تنتهي إلى المواد الدهنية المشتقة من الكوليستيرول مثل هرمونات قشرة الغدة الكظرية والمشيمة.

- كيف تصل هذه الهرمونات إلى خلايا الهدف في الجسم؟

تمتلك خلايا الهدف في جسم الإنسان مستقبلات ترتبط بها مع الهرمونات المتخصصة التي تفرز من الغدد الصماء، وتصل إلى تلك الخلايا مع الدم، فتؤثر فيها، ويعتمد تأثيرها على طبيعة الهرمون نفسه. الشكل (٥).


وتوجد مستقبلات الهرمونات الستيرويدية على سطح أغشية الخلايا، بينما توجد مستقبلات الهرمونات الستيرويدية داخل الخلايا، كونها تستطيع النفاذ عبر الغشاء الخلوي للخلية. ولكل قسم من الهرمونات السابقة آلية عمل تختلف عن الأخرى.

- كيف تحدث الهرمونات تأثيرها في خلايا الهدف؟

أ - آلية عمل الهرمونات الستيرويدية :

عند وصول الهرمون (الرسول الأول) إلى الخلية الهدف يرتبط مع المستقبل البروتيني الموجود على الغشاء، فيحفز هذا الارتباط أنزيمًا مرتبطاً مع المستقبل البروتيني منتجاً مادة تسمى (الرسول الثاني)، الذي يؤدي إلى استجابة الخلية المستهدفة للهرمون. انظر الشكل (٥-أ).

مثال: يؤدي الهرمون الستيرويدي (الرسول الأول) إلى تنبيه المستقبلات الخاصة به، ويؤدي هذا إلى تنشيط أنزيم أدنيل سايكليز الذي يحول الأدينوسين ثلاثي



الشكل ٥ أ - آلية عمل الهرمونات البتيدية

الفوسفات

إلى الأدينوسين أحادي الفوسفات **Cyclic AMP** (الرسول الثاني)، والذي يؤدي إلى إستجابة الخلية المستهدفة للهرمون.



الشكل ٥ ب) آلية عمل الهرمونات стериروидية.

ب - آلية عمل الهرمونات


الستيرويدية :

عند وصول الهرمون стироидي إلى الخلية الهدف ينفذ إلى داخلها، ويرتبط مع جزيئات المستقبل في السيتوبلازم مكوناً مركباً معقداً من الهرمون ومستقبله، فيدخل هذا المركب إلى نواة الخلية، فيحفز جيناً معيناً مؤدياً إلى بناء بروتينات، كما في الشكل (٥-ب).

مثال: يؤدي هرمون التستوستيرون الذي يفرز من الخصية إلى تحفيز الجين الخاص ببناء

بروتين العضلات التي تعتبر من الصفات الجنسية الثانوية في مرحلة سن البلوغ.

تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم: من أكثر الأمثلة وضوحاً على تنظيم الهرمونات لأنشطة الجسم وعملياته هرمونات تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم. وحتى تدرك هذا الدور ادرس الشكل (٦) ثم أجب عن الأسئلة التي تليه.




- متى يفرز هرمون الأنسولين؟
- متى يفرز هرمون الجلوكاجون؟
- كيف يعمل الأنسولين على خفض تركيز جلوكوز الدم؟
- ما الغاية الهدف لهرمون الجلوكاجون؟

يصاب الإنسان بمرض السكر إذا ما تلفت خلايا β التي تفرز هرمون الأنسولين في البنكرياس، ويُعالج بحقن المريض بالأنسولين. وقد يحدث المرض نتيجة نقص مستقبلات الأنسولين على الخلايا رغم توافر هرمون الأنسولين في الدم. كما أن البيئة الداخلية للجسم هي المسئولة عن المحافظة على مكونات الجسم من سوائل ومواد وأيونات في حدود النسب المحددة لها بثبات.

- ابحث في أسباب انتشار مرض السكر في منطقتك.
- اقترح وسائل ومعالجات للمحافظة على صحة الإنسان من الإصابة بمرض السكر.

قضية للبحث

هرمونات الغدد الصماء في الإنسان:



الشكل (٧) الغدد الصماء في جسم الإنسان.

- أين تقع الغدد الصماء في جسم الإنسان؟

ادرس الشكل (٧)، والجدول (٢)

لتتعرف على موقع الغدد الصماء في جسم الإنسان. ستجد أنها منتشرة في الجسم، وهي إما تكون غدداً كاملاً مثل: الغدة الدرقية، والنخامية، أو نسيج متخصص في عضو من الأعضاء، كما في المعدة والأمعاء، أو نسيج متخصص في غدة ذات إفراز خارجي (قنبية) كما هو الحال في البنكرياس. التي تُعد غدة ذات إفراز خارجي، وغدة صماء في نفس الوقت.


جدول (٢) موقع الغدد الصماء في جسم الإنسان

موقعها في الجسم	اسم الغدة الصماء
أسفل الدماغ في قاع الجمجمة.	- الغدة النخامية.
على السطح الأمامي للقصبة الهوائية أسفل الحنجرة.	- الغدة الدرقية.
على السطح الخلفي للغدة الدرقية.	- غدد الحاردرية.
غدة فوق كل كلية.	- الغدتان الكظريتان.
في البنكرياس.	- حزر لانجر هانز.
أنسجة متخصصة في كل من المعدة والأمعاء.	- غدد القناة الهضمية الصماء.
في خصية الذكر، وفي مبيض الأنثى.	- الغدد التناسلية.
داخل الرحم في أثناء الحمل.	- المشيمة.

ولكل نوع من هذه الغدد إفراز هرموني متخصص كما يأتي:

١-الغدة النخامية : Pituitary Gland

ادرس الشكل (٨)، والجدول (٣)، وأجب عما يأتي :



الشكل (٨) الغدة النخامية.

- أين تقع الغدة النخامية ؟
 - ما تكون الغدة النخامية ؟
 - ما الهرمونات التي تفرزها ؟
 - اذكر وظيفة كل هرمون ؟
 - لماذا تسيطر الغدة النخامية على عمل معظم غدد الجسم الصماء ؟
- ومن المهم معرفة أن الغدة النخامية تعتبر من أهم الغدد الصماء في جسم الإنسان؛ لأنها تسيطر على معظم النشاطات الحيوية إضافة إلى نشاطات الغدد الصماء الأخرى عن طريق إفراز مجموعة من الهرمونات التي تنظم هذه النشاطات.
- لماذا تسمى الغدة النخامية ملكة غدد جسم الإنسان ؟

العلاقة بين تحت المهاد والغدة النخامية :

درست سابقاً التنظيم العصبي، وعرفت أن تحت المهاد طبقة الهيبيوثلاثامس (الحُصين) جزء من الدماغ يعمل على تنظيم البيئة الداخلية، مثل تنظيم نبض القلب، بالإضافة إلى السيطرة على إفرازات الغدة النخامية . انظر الشكل (٩) .


كيف تنظم الهيبيوثلاثامس (تحت المهاد) إفراز هرمونات الغدة النخامية ؟
تقع الغدة النخامية بقاع الجمجمة أسفل (تحت المهاد)، وتتكون في الإنسان من فصين أمامي وخلفي . شكل (٩) .

وفي (تحت المهاد) توجد مجموعتان من الخلايا العصبية الفارزة، تصل محاور المجموعة الأولى

منها إلى الفص الخلفي للغدة النخامية، لتفرز هرمونين هما هرمون الفازوبرسين أو **ADH** (Vasopressin) الذي ينظم التوازن المائي للجسم عن طريق إعادة امتصاص الماء بواسطة الأنابيب الكلوية، كما يعمل على زيادة ضغط الدم الشرياني. وهرمون الأوكسيتوسين الذي يعمل على تقلص عضلات الرحم أثناء الولادة، ويستخدم علاجياً لإحداث الطلاق أثناء الولادة المتعرجة، كما يعمل على إطلاق الحليب من الثدي عند الرضاعة،

وهذا يدل على العلاقة الوظيفية بين التنظيم العصبي، والتنظيم الهرموني فعند مص الطفل لثدي أمه تتولد إشارات عصبية ترسل إلى (تحت المهاد)، ليفرز هرمون الأوكسيتوسين الذي يعمل على إطلاق الحليب.

أما محاور المجموعة الثانية فإنها تفرز هرمونات الإطلاق التي تصل إلى الفص الأمامي للغدة النخامية بواسطة الدم، وتحفزه على إطلاق هرموناته.




الشكل (٩) العلاقة بين تحت المهاد والفص الخلفي للغدة النخامية.

لتتعرف على الهرمونات المفرزة من الفص الأمامي وأماكن تأثيرها ادرس

الجدول (٣) الآتي :

جدول (٣) هرمونات الفص الأمامي للغدة النخامية

الهرمون	العضو المتأثر بالهرمون	الوظيفة
١ - هرمون النمو .(STH)	عظام الجسم والعضلات في الأجهزة.	- تنظيم نمو الجسم خلال مراحل العمر المختلفة ببناء العظام، ونموها . - بناء البروتينات، وتنظيم عملية الأيض.
٢ - الهرمون المنشط للحوصلات في الميال (FSH).	- مبيض الأنثى .	- نمو الحوصلات في المبيض، وتحويلها إلى حوصلات جراف .
٣ - الهرمون المنشط للجسم الأصفر (LH) والخصية (ICSH)	- خصية الذكر .	- يساعد على تكوين الأنبيبات المنوية في الخصية، وتكوين الحيوانات المنوية .
٤ - الهرمون المفترز للحليب (البرولاكتين).	- مبيض الأنثى .	- يعمل على نضج البويبة وخروجها من حوصلة جراف . - يحفز الخلايا البينية على تكوين الجسم الأصفر.
٥ - الهرمون الحافز للغدة الدرقية .(TSH)	- خصية الذكر .	- يحفز الخلايا البينية على إنتاج الهرمونات الجنسية . «التستوسيترون» .
٦ - الهرمون الحافز لقشرة الغدة الكظرية .(ACTH)	- الغدد اللبانية في الثديين .	- يعمل على نمو الغدد اللبانية، وإفراز الحليب منها .
٧ - الهرمون المنشط للخلايا الميلانين .(MSH)	- الغدة الدرقية .	- يحفز الغدة على إفراز هرموناتها . - يعمل على تجميع اليود في نسيج الدرقية .
	- قشرة الكظرية .	- يحفز الغدة على إفراز هرموناتها .
	- الجلد .	- يعمل على تحفيز إفراز صباغ الميلانين التي تصبغ الجلد باللون الأسود.



الشكل (١٠) الغدة الدرقية.

٢- الغدة الدرقية : Thyroid Gland

- أين توجد الغدة الدرقية؟

انظر الشكل (١٠) ولاحظ أن الغدة الدرقية تتكون من فصين أحمر وأيسر يتصلان بعضهما في الوسط. وتعد الغدة الدرقية أكبر الغدد الصماء حجماً؛ إذ يصل وزنها حوالي «٢٥ - ٣٠ جم» وهي مخزن اليود في الجسم الذي يدخل في عملية إفراز هرمون التيروكسين **Thyroxin** من الغدة الدرقية.


- من أين يحصل الإنسان على عنصر اليود؟

- ما الذي يحدث للغدة الدرقية في حالة نقص عنصر اليود في الجسم؟

- يدخل اليود في تركيب التيروكسين بنسبة ٦٥٪ من وزن الهرمون.

● وظيفة هرمون التيروكسين :

- ١- تنشيط العمليات الأيضية في خلايا الجسم، وتنظيمها وخاصة عملية الأكسدة.
- ٢- تنظيم عملية النمو، والتمايز ل معظم خلايا الجسم، وأنسجته المختلفة وخاصة عمليات نمو العظام.



الشكل (١١) غدد الجار درقية.


٣- الغدد الجار درقية : Parathyroid Glands

- أين توجد الغدد الجار درقية، وما وظيفتها؟

الغدد الجار درقية عبارة عن أربعة فصوص صغيرة جداً، الشكل (١١). وتوجد متصلة على السطح الخلفي للغدة الدرقية، وتفرز هرمون الباراثورمون (**Parathormone**)؛ الذي يقوم بتنظيم نسبة الكالسيوم في الدم، وبقاءها في المستوى الطبيعي.

٤- الغدة الكظرية (الغدة فوق كلوية) Suprarenal Gland :

ادرس الشكل (١٢)، ولاحظ أن الغدة الكظرية عبارة عن غدة صغيرة تقع فوق الكلية، وتتركب كل غدة من طبقتين، طبقة خارجية (القشرة) **Cortex**، وطبقة داخلية (النخاع) **Medulla**، وتعد كل طبقة غدة مستقلة عن الأخرى وتقوم كل طبقة بإفراز هرموناتها الخاصة.



الشكل (١٢) الغدة الكظرية.

أ- هرمونات قشرة الغدة الكظرية:

تفرز قشرة الغدة الكظرية ثلاثة مجموعات من الهرمونات هي:

١- الهرمونات السكرية :

Glucocorticoids Hormones

مثل هرمون الكورتيزول **Cortisol** الذي يتحكم في عمليات أيض الكربوهيدرات. كما تعمل هذه الهرمونات على تحفيز وتحويل البروتينات، والدهون إلى جلوكوز، فيرتفع مستوى الجلوكوز في الدم، كما أن لها تأثير مضاد للالتهابات وخاصة الناتجة عن تلف الأنسجة.

٢- الهرمونات المعدنية Mineralo Corticoids Hormones

من أهمها هرمون الألدوستيرون **Aldosterone** الذي يعمل على حفظ معدل الصوديوم في الدم، إذ يقوم الهرمون بتحفيز عملية إعادة امتصاص أيونات الصوديوم والكلوريد، في نفرونيات الكلية في عملية تسمى تنظيم التوازن الملحي.

٣- الهرمونات الجنسية : Sex Hormones

مثل هرمون الأستروجين **Oestrogen** الذي له تأثير كبير في إظهار صفات البلوغ الثانوية عند الفتاة، وكذلك هرمونات الأندروجين **Androgen** التي يكون لها نفس الدور بالنسبة للفتى.

- ما شعورك عند دخولك الامتحان؟


- ما التغيرات التي تحدث لجسمك عند تعرضك لأي إحراج أو خوف؟

ما سبب هذه التغيرات؟

بـ- هرمونات نخاع الغدة الكظرية:

يقوم نخاع الغدة الكظرية بإفراز هرمون الأدرينالين **Adrenaline** ووظيفته تهيئة، وإعداد الجسم لاستقبال، وإجتياز المواقف الانفعالية، والحرجة في الحالات الطارئة، مثل الخوف، والغضب، ويجعله يتهيأ لها للقتال، أو الهروب، وتوفير ما يلزم لذلك من طاقة، وينتج عن إفراز هرمون الأدرينالين وارتفاع تركيزه في الدم كثير من التغيرات الفسيولوجية التي تؤدي إلى زيادة إنتاج الطاقة. ومن هذه التغيرات التي يحدوها هرمون الأدرينالين ما يأتي :

- زيادة سرعة وشدة نبضات القلب، حتى تزيد مقدار كمية ما يضنه القلب من دم.
- توسيع الأوعية الدموية المتصلة بالعضلات الإرادية، والجلد، وإنقباضها في العضلات اللاإرادية.
- يقلل من زمن تجلط الدم عند النزف نتيجة إنقباض الأوعية الدموية، ويستخدم موضعياً في وقف النزيف الجلدي والرعاف.
- إتساع الشعب الهوائية لدخول كمية كبيرة من الأوكسجين إليها، وتوليد أكبر كمية من الطاقة اللازمة.



الشكل (١٣) جزر لنجر هانز البنكرياسية.

٥- جزر لنجر هانز البنكرياسية: Islands of Langerhans

- أين يوجد البنكرياس؟
- إلى أين تصب عصاراتها الهاضمة؟
- كيف يعمل البنكرياس كغدة صماء؟
- ما الهرمونات التي يفرزها؟
يحتوي البنكرياس على مجموعة من الخلايا الغنية جداً بالأوعية الدموية، التي

تشكل جزراً صغيراً مبعثرة فيها تسمى جزر لنجر هانز نسبة للعالم الذي اكتشفها، شكل (١٣). وهذه الحزر تفرز هرموناتها إلى الدم مباشرة.

- ادرس الجدول (٤) وأجب عما يأتي :
- ما الهرمونات التي تفرز من جزر لانجرهانز؟
 - ما نوع الخلايا المفرزة؟
 - ما وظيفة كل هرمون؟

جدول (٤) هرمونات جزر لانجرهانز


الهرمون	الخلايا المفرزة	الوظيفة
الجلوكاجون Glucagon	خلايا ألفا α	- رفع نسبة السكر في الدم عن طريق تحويل الجلايكوجين في الكبد إلى سكر.
الأنسولين Insulin	خلايا بيتا β	<ul style="list-style-type: none"> - خفض نسبة السكر في الدم بتحويل الجلوكوز الفائض إلى جلايكوجين يخزن في الكبد، والعضلات . - يزيد من قدرة الخلايا على استخدام، وأكسدة الجلوكوز. - تنشيط عمليات بناء البروتين، والدهون والحد من إستعمالها كمصدر للطاقة .

٦- هرمونات القناة الهضمية :

تحتوي بعض أجزاء القناة الهضمية على خلايا متخصصة في إفراز بعض الهرمونات، حيث تقوم بإفراز هرموناتها مباشرة إلى الدم، ويوضح الجدول (٥) هذه الهرمونات، ووظائفها، والخلايا التي تفرزها.

جدول (٥) هرمونات القناة الهضمية

الهرمون	مكان الإفراز	الوظيفة
الجاسترين Gastrin	بعض خلايا جدار المعدة	- يعمل على تحفيز المعدة لإفراز عصاراتها الهاضمة.
السكريتين Secretin	بعض خلايا الاثنى عشر.	- يحفز البنكرياس على إفراز عصاراتها الهاضمة.
كولستوكينين Cholecystokinin	بعض خلايا الاثنى عشر.	- يحفز الحوصلة الصفراوية على الإنقباض، وإفراغ العصارة الصفراوية في الاثنى عشر.
الإنتيروكرينين Enterocrinin	بعض خلايا اللفائي	- ينبه خلايا جدار اللفائي لإفراز أنزيماتها الهاضمة.



الشكل (١٤) قطاع عرضي في الخصية يبين
الخلايا البينية .

٧- هرمونات المناصل :

- لماذا يعتبر كل من الخصية والمبيض
غددًا صماء؟

المناصل عبارة عن الخصية في الذكر،
والمبيض في الأنثى وتقوم هذه الأعضاء
بوظائف عدّة أهمها:

١- تكوين الأمشاج الذكورية،
والأنوثوية.

٢- إفراز الهرمونات الجنسية.

- ما الهرمون الذي يفرز من الخصية؟
وما وظيفته؟

- ما الهرمون الذي يفرز من المبيض؟ وما وظيفته؟

- يوضح الجدول (٦) بعض هرمونات الغدد التناسلية وأماكن إفرازها وتأثيرها .

جدول (٦) هرمونات الغدد التناسلية

الهرمون	مكان الإفراز	الوظيفة
الستيروتون Testosterone	الخصية (الخلايا البيانية) شكل (١٤)	- تساهم في بناء الجسم وتبرز في الفتى مظاهر الرجولة. - تعمل على استكمال نمو الجهاز التناسلي الذكري.
الاستروجين Estrogen	المبيض، (الخلايا البيانية) الأنوثوي ويظهر الصفات الجنسية الأنوثوية.	- يعمل على استكمال نمو الجهاز التناسلي
البروجسترون Progesterone	الجسم الأصفر في المبيض المشيمة	- تهيئ الرحم للحمل، واستقبال البوية المخصبة. - تضخم الغدة الدرقية.

أمراض الجهاز الهرموني وصحته :

أ- أمراض الغدد الصماء :

١- تضخم الغدة الدرقية.

- الأعراض: تضخم الغدة الدرقية وزيادة حجمها.

- أسبابه: نقص اليود في الغذاء.

- الوقاية منه: إضافة اليود إلى ملح الطعام ومياه الشرب.



الشكل (١٥) التضخم الدرقي .

٢- كراز الجاردرقية .

- **أسبابه:** نقص أملاح الكالسيوم في الدم .

- **الأعراض:** ظهور تشنجات عصبية وعضلية .

- **علاج:** حقن المريض بهرمون الباراثورمون مع تعاطي أملاح الكالسيوم .

٣- السكري . ينتج هذا المرض بسبب نقص إفراز هرمون الأنسولين ، وينتاج عن هذا

النقص عجز الجسم عن الاستفادة من السكر في إنتاج الطاقة ، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وخروجه مع البول .

- **أسبابه:** كثيرة ، فقد يكون إما بسبب العوامل الوراثية ، أو زيادة الوزن الناتج عن السمنة ، أو الحمل ، وأمراض الكبد والبنكرياس ، أو ممارسة عادات غير صحية كتناول الخمور .. إلخ .

- **أعراضه:** كثرة التبول ، والشعور الدائم بالعطش ، ونقصان الوزن ، ودوخه شديدة ، والشعور بالجوع ، والتعب ، والإجهاد السريع لأقل مجهود ، والتأخر في الطعام الجروح ، وفي المراحل المتقدمة يؤثر على القلب والعين ويؤدي إلى الإغماء (صدمة السكر) .

- **علاج:** يتم إما عن طريق حقن الأنسولين في الجسم أو استخدام بعض الحبوب المنشطة للبنكرياس ، إلى جانب الالتزام بالحمية الغذائية ، وتنقیص الوزن ، وممارسة الرياضة .

صحة الجهاز الهرموني :

للمحافظة على سلامة الغدد الصماء يجب اتباع الآتي :

١- تناول وجبات غذائية متزنة تحتوي على مقادير ملائمة من البروتينات والدهون الازمة لتكوين مختلف الهرمونات .

٢- ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية .

٣- الامتناع عن تعاطي الكحول والمخدرات التي تؤدي إلى تلف الغدد الصماء ، والأعضاء الهامة كالكبد والبنكرياس .

٤- عدم استخدام الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب .

ويهمنا أن نعرف أنه نتيجة للتقدم العلمي وخاصة الهندسة الوراثية أصبح من الممكن إنتاج بعض الهرمونات عن طريق التقانة الحيوية ، مثل الأنسولين ، والاستفادة منها في علاج المرض .

تقويم الوحدة

- ١- علل لما يلي: تلقى البذور عشوائياً عند زراعتها في التربة .
 - إحناء ساق النبات نحو الضوء.
 - يستعمل هرمون الفازوبرسين علاجياً لرفع ضغط الدم.
 - يعتبر هرمون الأدريناлиين هرمون النجدة في جسم الإنسان.
 - تعد البنكرياس غدة قنوية وصماء.
 - وجود ثمار الكمثرى خالية من البذور.
 - زيادة سرعة نبضات القلب أثناء الغضب.
 - تستجيب الغدة الدرقية لهرمون (TSH) دون غيره من الهرمونات .
- ٢- الغدد في جسم الحيوان نوعان ماهما؟ اعط أمثلة لكل نوع.
 - ٣- عرف الهرمون.
- ٤- ارسم مخططاً لجسم الإنسان وبين عليه موقع الغدد الصماء.
- ٥- اذكر أسماء أربعة من الهرمونات النباتية .
- ٦- ما الدور الذي يلعبه كل من هرمون البرولاكتين والأوكسيتوسين في العدد الثدييّة؟
 - ٧- اثبت بتجربة عملية الانتفاء الضوئي .
 - ٨- ما الهرمونات التي تفرزها القشرة الكظرية؟
 - ٩- من أين يفرز هرمون الأنسولين؟ وما وظيفته؟
- ١٠- وضح بجدول هرمونات القناة الهضمية وأجزائها الفارزة، ووظيفة كل هرمون.
- ١١- ما وظيفة الهرمونات الآتية :
 - الأستروجين.
 - الأوكسينات.
- ١٢- ماذا تعرف عن :
 - التضخم الدرقي.
 - هرمون البروجسترون.
 - السكري.
- ١٣- ارسم مخططاً بين علاقات السيطرة والتحكم بين (تحت المهداد)، والفص الخلفي للغدة النخامية فيما يتعلق بإفراز الهرمونات .
- ١٤- ما أسماء الغدد التي تفرز :
 - ١- هرمون الشيروكسين.
 - ٢- الباراثورمون.
 - ٣- المانع لإدرار البول.
- ١٥- ارسم مخططاً بين تنظيم مستوى الجلوکوز في الدم .

التكاثر في الكائنات الحية

Reproduction

الوحدة الثالثة

قال تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَرُونَ﴾ [الناريات]



أهداف الوحدة

يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:

- ١- توضح أنواع التكاثر اللاجنسي في الكائنات الحية.
- ٢- توضح التكاثر الجنسي في النبات.
- ٣- تشرح التكاثر الجنسي في الحيوان.
- ٤- تحدد مكونات ووظيفة أجهزة التكاثر الذكرية والأنثوية في الإنسان.
- ٥- تتبع مراحل تكوين الأمشاج الذكرية والأنثوية في الإنسان.
- ٦- تصف أهم التغيرات التي تحدث في المبيض والرحم أثناء دورة الحيض.
- ٧- تصف مراحل تطور الجنين في أنثى الإنسان.

التكاثر Reproduction

ما سبب استمرار بقاء الكائنات الحية على الأرض منذ ملايين السنين؟
خلق الله تعالى الكائنات الحية وأودع فيها آلية إنتاج أفراد جديدة منها.
لتضمن إستمرار حياة نوعها، وهذه الآلية تعرف بالتكاثر. فتخيل ماذا يحدث إذا لم تستطع هذه الكائنات الحية التكاثر؟ إن إستمرارية بقاء الكائنات المختلفة على سطح الأرض تعتمد على التكاثر الذي يحدث بطريقتين رئيستين هما: التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي الذي يحدث في معظم الكائنات الحية، وهناك كائنات حية أخرى تعتمد على الطريقتين في تكاثرها.


التكاثر اللاجنسي : Asexual Reproduction

- ما المقصود بالتكاثر اللاجنسي؟

تكون الأفراد الناتجة عن هذا التكاثر مماثلة في جميع صفاتها للأصل. ويتم التكاثر اللاجنسي عادة بالانقسام المتساوي لخلايا الأصل ويمكن أن يحدث هذا الانقسام على مستوى عضيات الخلايا. ولهذا التكاثر أشكال عديدة منها:

١- الإنشطار الثنائي : Binary Fission


- ماذا يقصد بالإنشطار؟



انظر الشكل (١) ولاحظ كيفية إنسطام البراميسيوم حيث تنقسم الخلية إلى خليتين، كما يحدث ذلك أيضاً في البكتيريا والأوليات مثل اليورجلينا وبعض الفطريات.


٢- التبرعم : Budding

لاحظ الشكل (٢). ماذا يظهر على الجدار الخلوي في فطر الخميرة؟ وماذا يحدث للنواء؟



الشكل (٢) التبرعم في الخميرة

وبقى الأخرى في الخلية الأم.



الشكل (٣) التبرعم في الهيدرا

– ماذا يطلق على البروز الناتج؟
ينفصل البروز الناتج بعد تخصّر
في الجدار الخلوي وينمو ليعطي فطر
جديد.

لاحظ الشكل (٣). كيف
يحدث التبرعم في الهيدرا؟
يتكون البرعم قرب القاعدة
بسبب انقسام الخلايا هناك وينفصل
البرعم بعد أن تنموا اللوامس مكوناً
هييدرا جديدة.

النشاط (١١)


- نفذ النشاط: التكاثر بالتبرعم في فطر الخميرة في كراس الأنشطة
والتجارب العملية.

٣- القطع والتجدد:

– ماذا يحدث في حالة قطع الإسفنج إلى قطع صغيرة وتركها في البيئة نفسها؟
الإسفنج من الكائنات عديدة الخلايا وبسيطة التركيب، فعندما يحدث لها قطع
أو تمزق فإن القطع تنمو إلى أفراد جديدة وذلك لقدرة خلاياها على الانقسام، وتقل
هذه القدرة برقى الكائن الحي، ففي الإنسان يتمثل ذلك بالتعام الجروح وجبر العظام
بعد كسرها، وتجدد الدم وتجدد ما يستأصل من الكبد جراحياً.

٤- التبوغ (التجرثم):

– ما البوغ؟ وكيف يتكون؟
اذكر بعض الكائنات الحية التي يتم فيها التكاثر بتكوين الأبواغ؟
تم طريقة التكاثر بالتبوغ في بعض الكائنات الدنيا مثل الطلائعيات،
والفطريات.



الشكل (٤) التكاثر بالتبوغ في فطر عفن الخبز

لاحظ تكاثر فطر عفن الخبز في الشكل (٤) . يحدث في الخلايا البوغية إنقسامات متساوية، ينتج عنها خلايا أحدادية المجموعة الكروموسومية تسمى أبواغاً، والتي تضغط على جدار الحافظة البوغية فتنفجر وتخرج منها الأبواغ التي يساعد حجمها الصغير على الإنتشار في الهواء. وتميز هذه الأبواغ بالقدرة على النمو في بيئات تتصف بدرجة الحرارة والرطوبة وتتوفر المواد العضوية لتعطي أفراداً جديدة، فمثلاً يستطيع الفرد الواحد من عش الغراب أن ينتج 500.000 بوغ ينمو كل منها إلى فطر جديد ليعيد دورة الحياة مرة أخرى.

النشاط (١٢)

- نفذ النشاط : التكاثر بالتبوغ في كتاب الأنشطة والتجارب العملية.

٥- التكاثر الخضري :

- ما المقصود بالتكاثر الخضري؟


يحدث هذا النوع من التكاثر بشكل طبيعي في النباتات الزهرية، وذلك بنمو الأجزاء الخضرية (الورقة، أو الساق، أو الجذر) لتكون أنسجة تتمايز إلى أفراد جديدة تنفصل عن النبات الأم، ويستخدمه المزارعون لإكثار المنتجات الزراعية وضمان الصفات الجيدة التي توجد في النبات الأصلي، وكسب الوقت في الإنتاج. ويتم التكاثر الخضري إما بطريقة طبيعية أو صناعية، وذلك كما يأتي :

أ - طرق التكاثر الخضري الطبيعي :

ادرس الجدول رقم (١) مستعيناً بالشكل (٥) ثم أجب عن الأسئلة التي تلي ذلك.

جدول (١) طرق التكاثر الخضري الطبيعي

آلية التكاثر	وصف العضو	المثال	العضو
تنمو من البراعم التي توجد عند العقد سيقان وجدور و تتكون نباتات جديدة.	ساق تنموا أفقياً فوق سطح التربة .	الفراولة	الساق الجارية Runner Stem
تنشط البراعم في آباط الأوراق الحرشفية التي تحتويها عقدة الريزوم وتنمو إلى نبات جديد و تتكون له أفرع هوائية.	ساق أرضية تنموا أفقية تحت سطح الأرض .	النجيل والعنان	الريزوم Rhizome
تنمو البراعم الجانبية في كل عين لتكون نبات جديد .	جزء منتفخ من ساق أرضية و تنتج من تخزين المواد النشوية فيها.	البطاطس	الساق الدرنية Tuber Stem
ينمو البرعم الطرفي مكوناً أفرعاً هوائية ، وتنمو البراعم الجانبية لت تكون نباتات بكرومات جديدة.	قاعدة أرضية منتفخة لساق هوائية .	القلقصاس	الكورمه Corm
الأوراق الخضراء التي توجد فوق سطح التربة تصنع الغذاء الذي ينتقل إلى قواعدها للتخزين وتنمو البراعم الجانبية لتكون نباتاً وأبصالة جديدة.	انتفاخ تحت سطح الأرض مكون من أوراق منتفخة بمواد غذائية تتركز على ساق قرصية قصيرة ويحيط بهذه الأوراق برعم طرفي وبراعم جانبية .	البصل والثوم	البصلة Bulb
ينمو الفرع القصير جانباً ليكون نباتاً جديداً ملتصقاً بالأم يمكن أن يفصل بعد سنتين من النمو ويزرع ليكون نباتاً جديداً.	فرع قصير يننمو من براعم عرضية عند قاعدة الساق الأصلية (غالباً تحت سطح التربة).	النخيل والموز	الفسيلة Offset
عندما تصل البراعم حجماً معيناً تسقط على التربة لتعطي نباتاً جديداً.	ورقة لحمية مخزنة للغذاء تحمل حافتها نتوءات تنشأ منها براعم صغيرة .	نبات كالنشو	الورقة Leaf



شكل (٥) التكاثر الخضري الطبيعي


- ما طرق التكاثر الخضري الطبيعي؟
- حدد عضو التكاثر في كل طريقة؟ وماذا يقصد به؟
- اذكر مثلاً لكل طريقة من طرق التكاثر الخضري الطبيعي؟ وبين آلية التكاثر فيه؟

النشاط (٣)

- نفذ النشاط الخاص بالتكاثر الخضري الطبيعي في كتاب الأنشطة والتجارب العملية.

بـ- التكاثر الخضري الصناعي :

العامل المشترك في هذا النوع من التكاثر هو أن يقطع الإنسان جزءاً من النبات كالساق أو الجذر أو الأوراق، وجعله ينمو إلى نبات كامل. ورغم أن الإنسان يستعمل وسائل التكاثر الخضري الطبيعي إلا أنه استحدث طرقاً أخرى لإكثار النباتات اقتصادياً منها:



الشكل (٦) الإكثار بالعقل

الهواء والبرعم الثاني في مستوى سطح التربة، حيث تنمو جذور عرضية من مكان قطع الساق. ويستخدم التعقيل في العديد من نباتات الزينة مثل الورد والياسمين، وبعض النباتات الاقتصادية كالعنب والتين.

- التعقيل : Slipsor


ما العُقلة؟ وكيف يمكن الحصول على أفضلها؟

الرعاية بالعقل كما في نبات الجيرانيوم وتتم بقطع جزء من الساق يحتوي على برعرين أو ثلاثة على الأقل، وأفضلها وسط الفرع بحيث يقص الرابع العلوي والرابع السفلي ويؤخذ النصف المتوسط. وتُزرع العُقل في بيئه مناسبة بأن يترك برم في

النشاط (٤)

- نفذ النشاط الخاص بتكثير النباتات بالتعقيل في كتاب الأنشطة والتجارب العملية.

- كيف يتم تحفيز عملية نمو الجذور في كثیر من عُقل النباتات.



الشكل (٧) الإكثار بالترقيد

- الترقيد : Layering

لاحظ الشكل (٧) الذي يبين كيفية إستخدام طريقة دفن سيقان وأفرع بعض النباتات كالعنب والياسمين في التربة على عمق ٢٥ سم، وهو لا يزال متصلةً بالنبات الأصل ثم ثني طرف الفرع إلى أعلى فوق سطح التربة ويشبت في وضع قائم فتنمو له جذور عرضية وتنمو البراعم كذلك، ويترك الفرع النامي متصلةً بالنبات الأصل فترة قصيرة من الزمن ثم يفصل عنه ليستقل بنفسه.



الشكل (٨) الإكثار بالتطعيم

- التطعيم : Grafting

تستعمل هذه الطريقة لتحسين أشجار الفواكه، وفيها يتم نقل قطعة من ساق نبات معين عليه براعم، وتعرف بالطعم، وتلتصق بساق نبات آخر من نفس النوع أو الجنس، ويعرف بالأصل؛ ليستفيد الطعام من المجموع الجذري للأصل بينما يستفيد الأصل من المجموع الخضري للطعم. وهناك طرق مختلفة للتطعيم ويوضح (الشكل ٨) بعضها، ومنها:

- التطعيم بالبرعم :

ويتم بأخذ برعم كامن تام النمو من نبات ذي صفات مرغوبة يراد إكثاره ويوضع في شق على شكل حرف T في النبات المطعم (الشكل ٨)، بحيث تنطبق أنسجة كامبيوم البرعم على كامبيوم الأصل ثم يربط عليهما برباط محكم، وبعد مدة ينمو البرعم ليكون النبات الجديد.

- التطعيم بالقلم:

يؤخذ الطعم وعليه برعمان أو ثلاثة وبيرى كالقلم، الشكل (٨). لماذا؟
يُقطع ساق النبات المراد تطعيمه أفقياً بالقرب من سطح التربة ويعمل به شق
يوضع فيه الطعم بحيث تنطبق أنسجة الكمبيوتر في الطعم ونبات الأصل على
بعضها، ثم يربط بعد ذلك مكان الطعم ويطلق بالشمع. لماذا؟
ويمكن إستعمال أكثر من طعم واحد إذا كان ساق الأصل كبيراً.

- ما شروط نجاح التطعيم؟

لنجاح عملية التطعيم يجب أن يكون بين الطعم والأصل صفات متشابهة، أي
يُطعم نباتان من الصنف نفسه، أو يُطعم صنف على صنف آخر من النوع نفسه،
أو يُطعم نوع على نوع آخر من الجنس نفسه. فمثلاً يمكن تطعيم البرتقال على
الليمون، والتفاح على الكمثرى.

ويلجأ المزارعون إلى طريقة التطعيم لعدة أسباب منها:

- المحافظة على بعض أنواع من النباتات التي لا تنمو في بيئه معينة مثل إرتفاع نسبة
الأملاح أو حموضة التربة.
- المحافظة على الصفات المرغوبة مثل حجم الثمار وطعمها ومقاومة النبات للأمراض.

٦- التكاثر العذري: Parthenogenesis

ويقصد به إنتاج أفراد من بوياضات غير مخصبة، ويحدث ذلك في بعض
الحشرات والزواحف والبرمائيات والأسماك. فملكة النحل تضع نوعين من البيض،
مخصب ينموا ويتطور إلى إناث (الملكات أو الشغالات) وغير مخصب يتتطور إلى
ذكور. ولهذا تحتوي خلايا إناث النحل على مجموعة ثنائية من الكروموسومات
(2n)، بينما الذكور فيها تحتوي خلاياها على المجموعة الأحادية من الكروموسومات
(n). كما يحدث هذا النوع من التكاثر في النمل، وقد أمكن إحداثه صناعياً في بعض
الضفادع وقنافذ البحر.

التكاثر الجنسي: Sexual Reproduction


تحدث عملية التكاثر الجنسي بصفة عامة عند وجود نوع من الكائنات الحية يمكن
لأفراده إنتاج أمشاج مذكرة وأمشاج مؤنثة؛ حيث تندمج محتويات المشيجين لتكوين
اللاقحة (البوياضة المخصبة) التي تنمو لتعطي في النهاية فرداً جديداً. مانوع الإنقسام
الذي يؤدي إلى تكوين الأمشاج؟ غير أن التكاثر الجنسي في الكائنات الراقية يختلف عنه
في الكائنات البدائية.

التكاثر الجنسي في الطلائعيات:

ويمكن توضيح بعض أنواع التكاثر الجنسي في الكائنات الطلائعية كما يأتي :

١- الاقتران في طحلب الأسبيروجيرا : Conjugation In Spirogyra

- ماذا يُسمى الاقتران بين خليتين متقابلتين في خيطين من خيوط الأسبيروجيرا ؟
لاحظ الشكل (٩) وتتبع ما يحدث في هذا الاقتران في الخطوات المرقمة في الشكل والتي يمكن توضيحها كما يأتي :
- أ - تنمو قناة اقتران بين خليتين متقابلتين في خيطين من خيوط طحلب الأسبيروجيرا.



الشكل (٩) الإقتران في طحلب الأسبيروجيرا

ب- تنتقل محتويات خلية أحد الخيطين، ويسمى الخيط الموجب إلى الخلية المقابلة في الخيط الآخر، ويسمى الخيط السالب.

ج- تندمج نواة الخيط الموجب مع نواة خلية الخيط السالب لتكوين اللاقحة $2n$ (Zygot).

د- يستدير السيتوبلازم حول اللاقحة وتحاط الخلية بجدار سميك مكوناً الجرثومة الملقة Zygospore تستقر في الوحل بعد موت النبات الأصلي .

هـ- بعد فترة كمون وعندما تصبح الظروف مناسبة تنقسم نواة الجرثومة الملقة انقساماً منصفاً لينتج أربع أنوية (n) تبقى منها واحدة تنقسم عدة مرات إنقساماً متساوياً لتكون خيطاً طحليباً جديداً.

يسمى الاقتران بين خليتين متقابلتين في خيطين مختلفين اقتراناً سلمياً، وإذا حدث بين خليتين متجاورتين في الخيط نفسه يسمى اقتراناً جانياً.


النشاط (٥)

- نفذ النشاط الخاص بتكاثر طحلب الأسبيروجيرا بطريقة الإقتران في كتاب الأنشطة والتجارب العملية.

٢- التكاثر في البلازماوديوم : Reproduction In Plasmodium

يشكل طفيلي الملاриاء **Plasmodium** خطراً كبيراً على صحة الإنسان وحياته، إذ يسبب حمى الملاриاء التي تقتل عدة ملايين من البشر سنوياً في دول مختلفة ومنها بلادنا. ويقوم بنقل هذا المرض أنثى بعوض الأنوفليس.

- فـأين يعيش بلازماوديوم الملاриاء؟ وكيف يتکاثر؟



– ما أعراض مرض الملاريا ؟

لاحظ في دورة حياة البلازموديوم تعاقب التكاثر الجنسي في البعوضة واللاجنسي في البعوضة والإنسان، ويعرف ذلك بتبادل الأجيال .

النشاط (٦)

- نفذ النشاط الخاص بفحص مجهرى لتحضيرات من أطوار دورة حياة البلازموديوم المضمن في كتاب الأنشطة والتجارب العملية.

التكاثر الجنسي في النباتات : Sexual Reproduction In Plants

يمكن للنباتات أن تتكاثر لاجنسياً – كما درست سابقاً – كما يمكنها أن تتكاثر جنسياً . وبعض الكائنات النباتية بسيطة التركيب، كالسرخسيات والهزازيات تتكاثر بالطريقتين (ظاهرة تبادل الأجيال)، ويمكن توضيح بعض أنواع التكاثر الجنسي في النبات كما يأتي :

١ - التكاثر في نبات الفيوناريا : Reproduction in Funaria


– صفات نبات الفيوناريا ؟ وأين يوجد ؟

يوجد هذا النبات على شكل نمو كثيف في الأماكن الرطبة والظلية وينمو رأسياً ويصل طوله إلى ٢ سم. ولكن كيف يتكون نبات الفيوناريا ؟ تتكون الأعضاء الجنسية المذكرة والمؤنثة في نهاية الساق كما في الشكل (١١) . وهذه الأعضاء هي : الأنثريدة وتنتج الأمشاج المذكرة (سابحات ذكرية)، والأرشيجونة وتنتج الأمشاج المؤنثة (البوياضة) وعندما تنضج خلية البوياضة تتحرك السابحات الذكرية في الماء أو الرطوبة لتصل إلى البوياضة فتحصيها .

ما نوع الانقسام الذي يحدث في البوياضة المخصبة (اللاقحة) بعد ذلك ؟

يؤدي انقسامات اللاقحة إلى تكوين نبات بوغي مختلف عن النبات المشيجي، فهذا الأخير يتكون من شبه ساق وأشباه أوراق وجذور، بينما النبات بوغي يتكون من القدم المتصل بخلايا شبه الساق والعنق والعلبة وبها خلايا مولدة للأبواغ . وعندما تنقسم هذه الخلايا تعطي أبواغاً تتحرر عند النضج، ويبدأ كل أبوغ بالإنبات ليكون خيطاً أولياً أخضر متفرعاً يسمى بروتونيا Protoneema تنمو منه براعم مكونة الطور المشيجي الجديد .

– ماذا يسمى تتابع الطورين المشيجي والبوجي في دورة حياة الفيوناريا ؟
 تتَّبع دورة حياة نبات الفيوناريا في الشكل (١١)، ولاحظ أن النبات يمر بطورين
 أثناء دورة الحياة، وهما الطور المشيجي، والطور البوجي .



النشاط (٧)

- نفذ النشاط الخاص بفحص عينة محفوظة وشرائح مجهرية لنبات الفيوناريا والمتضمن في كتاب الأنشطة والتجارب العلمية.

٢- التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية :

- أين يتم التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية؟ وكيف يتم ذلك؟

يتم التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية بتكوين الأمشاج المذكرة (حبوب اللقاح) في المتك والأمساج المؤنثة (البوopies) في المبيض، ثم إندماج محتويات حبة اللقاح مع البويبة لتكوين اللاقحة «*Zygote*».

- ما الأجزاء الزهرية التي تنتجه الأمشاج؟

تتكون حبوب اللقاح في المتك والبوopies في المبيض. وهناك نوعان من الأزهار هما:

أ- أزهار ثنائية الجنس: *Bisexual* تحتوي الزهرة على أعضاء التذكير والتأنث معاً، كما في نباتات الفول والمسمش والصنوبر.

ب- أزهار أحادية الجنس: *Monosexual*


تحتوي الزهرة على أعضاء التذكير أو أعضاء التأنث كما في نبات النخيل.

تكوين حبوب اللقاح والبوopies في الزهرة يمكن توضيح خطوات تكوين

حبوب اللقاح والبوopies في النبات كما يأتي:

أولاً: خطوات تكوين حبوب اللقاح

انظر الشكل (١٢) ولاحظ أن المُتك يتكون عادة من أربعة أكياس تنمو فيها الخلايا البوغية الذكرية الأم التي تحتوي على (2n).



الشكل (١٢) خطوات تكوين حبوب اللقاح

- تنقسم كل خلية بوغية ذكرية أم انقساماً منصفاً لينتاج عنه أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية (n) وعند ما تنفصل عن بعضها تسمى كل منها بالبوغ الصغير Micro-Spore (n)
- تنقسم نواة البوغ الصغير انقساماً متساوياً لينتاج عنه نوatanان إحداهما أنبوبية والأخرى تنااسلية (مولدة) Tube Nucleus .
- تمر خلية البوغ الصغير بعملية نمو وتمايز وتحاط بجدار داخلي رقيق وخارجي سميك يتخد أشكالاً مختلفة يميز نوع النبات ويطلق عليها حبة اللقاح الناضجة.
- تنفتح أكياس المتك، وتتناثر حبوب اللقاح لتنتقل إلى البوبيضة فكيف يتم ذلك؟

● ما آلية افتتاح أكياس حبوب اللقاح.

موضوع المناقشة

النشاط (٨)

- نفذ النشاط الخاص بفحص: مقطع عرضي من متك زهرة نبات، وتحضيرات جاهزة لحبوب لقاح من أزهار متنوعة متوفرة في بيئتك في كتاب الأنشطة والتجارب العملية.



الشكل (١٣) نشوء البوبيضة من جدار المبيض


ثانياً: تكوين البوبيضة:

انظر الشكل (١٣) ولاحظ أن البوبيضة تنشأ في البداية بظهور نتوء في الجدار الداخلي للمبيض يسمى النيوسيلة Nucellus والتي تحاط بغلاف أو غلافين تخرج منهما قناة في القمة تسمى النقير، وتتميز إحدى خلايا

النيوسيلة لتكون الخلية البوغية الأنثوية الأم Megaspore Mother Cell(2n). لاحظ الشكل (١٤) وتتابع خطوات تكوين البوبيضة الناضجة من الخلية البوغية الأنثوية الأم .

– ما عدد الخلايا الأنثوية في الكيس الجنيني الناضج؟ سُمّ هذه الخلايا.

تقع خلية البيضة Egg Cell والتي تمثل المشيخ المؤنث (n) مقابل فتحة التغیر، ويحيط بها خليتان مساعدتان Synergids، والنواتان القطبيتان في مركز الكيس الجنيني تكونان خلية ثنائية النوى (2n) تسمى خلية الأندوسبيرم الأم.



الشكل (١٤) خطوات تكوين البيضة

النشاط (٩)

- نفذ النشاط الخاص بتركيب عضو التأثير في نبات الفول وتركيب البيضة من خلال شريحة جاهزة لإحدى البيوضات في كتاب الأنشطة والتجارب العملية.

التلقيح والإخصاب في النباتات الزهرية :

تنقل حبوب اللقاح الناضجة من الملك إلى الميسם بواسطة الرياح أو الحشرات أو الطيور أو الماء أو الإنسان وعندما تسقط حبة اللقاح على الميسم يحدث لها ما يأتي:

- ١- تنتفع بامتصاص الماء.
- ٢- تظهر أنبوبة اللقاح من أحد المسامات وتنمو مخترقة أنسجة الميسم والقلم والمبيض بفعل إنزيمات محللة يفرزها طرف أنبوبة اللقاح.

- ٣- تصل أنبوبة اللقاح إلى الكيس الجنيني عبر فتحة النمير.
- ٤- في أثناء نمو أنبوبة اللقاح تتحرك النواة الأنبوية في أسفلها أولاً ثم تنقسم النواة المولدة لتعطي نواتين ذكريتين كلاهما أحادية المجموعة الكروموسومية، انظر الشكل (١٥).

النشاط (١٠)



الشكل (١٥) عملية الإخصاب في النبات الزهري

كيف تتم عملية الإخصاب؟

عندما تنتقل النواتان الذكريتان إلى داخل الكيس الجنيني تتحد إحداهما مع نواة خلية البيضة فت تكون اللاقحة ثنائية المجموعة الكروموسومية وتتحد النواة الأخرى مع النواتين القطبيتين لتكون نواة الأندوسيرم الأولية ثلاثة المجموعة الكروموسومية (3n) ويطلق على عملية الإخصاب هذه الإخصاب المضاعف

Double Fertilization


أو المزدوج وهي إحدى خواص النباتات مغطاة البذور.

١- البذرة والثمرة:

بعد عملية الإخصاب تنقسم اللاقحة عدة مرات ليتشكل الجنين وتستمر عملية النمو حتى تكون البذرة.
- م تتركب البذرة؟

تنقسم نواة الأندوسيبرم (3n) انقساماً متساوياً لتعطي نسيج الأندوسيبرم ثلاثي المجموعة الكروموسومية المغذي للجنين. وقد يحدث أن يتغذى الجنين على الأندوسيبرم أثناء نموه وما تبقى يُخزن في الفلقتين لذلك يختفي الأندوسيبرم (يُخزن في الفلقات) وتسمى البذور عندئذ لأندوسيبرمية كبيرة نباتات ذات الفلقتين مثل الفول والفاصولياء، أو يمتص الجنين بعض الأندوسيبرم والبعض الآخر يبقى محاطاً بالجنين لذا تكون هذه البذور لأندوسيبرمية كبيرة ذات الفلقة الواحدة مثل حبة الذرة والقمح.

- إلى ماذا تحول البوية الناضجة بعد الإخصاب؟



الشكل (١٦) تركيب البذرة

انظر الشكل (١٦) وتعرف على تركيب البذرة،

لاحظ أن الجنين يتربّب من:

- ١- محور قصيري ينتهي طرفه من ناحية التمير بالجدير ومن الطرف المقابل بالريشة.
- ٢- يتصل المحور بورقة جنينية واحدة في ذوات الفلقة الواحدة أو ورقتين جنininيتين في ذوات الفلقتين وهذه الأوراق هي الفلقات.

ماذا ينتج عن نمو الجدير والريشة؟

النشاط (١١)

- نفذ النشاط (١١) دراسة عملية لتركيب بعض البذور في كتاب الأنشطة والتجارب العملية.

٤- تكوين الثمرة:

تعد عملية الإخصاب حافزاً لتكوين هرمونات خاصة تعمل على تضخم ونمو جدار المبيض وتحويل المبيض إلى ثمرة. اذكر الهرمون الذي يقوم بذلك. وبعد نضج المبيض تذبل بقية أجزاء الزهرة وتتساقط وقد تشتراك في تكوين الثمرة كالتخت (كما في التفاح).

- مم تتركب الثمرة؟

عند اكتمال نضج الثمرة يتكون لها ثلاثة طبقات أو أغلفة هي:

- ١- خارجية جلدية.
- ٢- وسطى متسلحة وهي التي تؤكل في أغلب الشمار (كالبلح والسدر).
- ٣- داخلية صلبة تحمي البذرة بداخلها ويختلف سمك وطبيعة وتركيب الطبقات الثلاث في الشمار المختلفة. (هل تعتبر حبة القمح بذرة أم ثمرة؟).

في حبة القمح والذرة وبعض الحبوب يندمج غلاف الشمرة مع غلاف البذرة لتكوين الحبة لهذا السبب تعتبر حبة القمح ثمرة وليس بذرة. وقد وجد أن بعض النباتات تنتج ثماراً خالية من البذور تسمى بالشمار العذرية مثل بعض أصناف العنب. فما أسباب ذلك؟

يرجع تكوين الشمار العذرية إلى عدة أسباب منها:

- تكوين الشمرة دون تلقيح كما في البرتقال والموز.
- تكوين الشمرة بعد حدوث التلقيح والإخصاب دون تكون الجنين كما في العنب.
- يمكن إنتاج ثمار عذرية صناعياً برش أزهار النباتات بهرمونات نباتية قبل حدوث الإخصاب فيها مثل نبات الشمام.


التكاثر الجنسي في الحيوان: Sexual Reproduction in Animal

تعتمد الحيوانات اللافقارية والفقارية على التكاثر الجنسي في الحفاظ على نوعها. وسوف نناقش التكاثر الجنسي في الحشرات كمثال للحيوانات اللافقارية والتكاثر الجنسي في الإنسان كمثال للحيوانات الفقارية وذلك كما يأتي:

التكاثر الجنسي في الحشرات:

الحشرات وحيدة الجنس أي إن هناك ذكراً ينتج أمشاجاً ذكرية، وأنثى تنتج أمشاجاً أنثوية، ويتم التكاثر عن طريق اندماج الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية. ممًّا يتكون الجهاز التناسليان الذكري والأثني في الحشرات؟

الجهاز التناسلي في الحشرات:



الشكل (١٧) الجهاز التناسلي في الحشرات

لاحظ الشكل (١٧) وتعرف على كل جزء من أجزاء الجهاز التناسلي في الحشرات.
- ما الوظائف المتناظرة التي تقوم بها الأعضاء في الجهازين التناسليين للذكر والأنثى؟

– ادرس الجدول (٢) الذي يبين ذلك.

جدول (٢) الوظائف المتناظرة لأعضاء الجهازين التناسليين لذكر وأنثى الجناد

الجنس	إنتاج الخلايا التناسلية	مكان تخزين الإنتاج	منطقة توصيل الإنتاج إلى الفتحة التناسلية	منطقة نقل الخلايا التناسلية إلى الخارج
الذكر	الخصيتان	الحوصلتان المنويتان	الوعاءان الناقلان والقناة	طرف القضيب
الأنثى	المبيضان	المبيضان لتخزين البيض والكيس المنوي لتخزين الحيوانات المنوية الواردة من الذكر.	قناة المبيض الجانبية وقناة البيض المشتركة والمهبل وقناة الكيس المنوي.	المهبل

بعد الإخصاب تضع الأنثى البيض على شكل كتلة في حفرة طويلة في الرمل وهي ملتصقة بمادة غروية، ثم تغطى الحفرة بمادة غروية، وبعد فترة تخرج من البيض أجنة تسمى الحوريات.

التكاثر في الإنسان : Reproduction In Human

يشترك الجهاز التناسليان الذكري والأنثوي في الإنسان لإنتاج النسل، وتقوم أعضاء هذين الجهازين بتكوين الأمشاج ونقلها إلى مكان الإخصاب، وتفرز هذه الأعضاء الهرمونات الجنسية التي تنظم عملية التكاثر.
– اذكر بعض الهرمونات الجنسية ووظيفتها كل منها ؟


الجهاز التناسلي الذكري Male Reproductive System

لاحظ الشكل (١٨-أ) وتعرف على مكونات هذا الجهاز، حيث يتكون مما يأتي :

١- الأعضاء التناسلية الأساسية وتشمل :

الخصيتين: توجد كل خصية داخل كيس يدعى كيس الصفن، وتتكون الخصية من عدد من الفصوص، وفي كل فص عدد من الأنابيب المنوية الدقيقة، المبطنة بنسيج طلائي يحتوي على نوعين من الخلايا (الشكل ١٨-ج) هما:


– خلايا سرتولي : Sertoli Cells



وتعمل على تدعيم الحيوانات المنوية وتغذيتها.

- الخلايا المنوية الأم :

تنشأ منها الحيوانات المنوية، وترتبط الأنابيب المنوية بنسيج يحتوي على أوعية دموية، وخلايا بينية تسمى خلايا ليديج Leydig Cells والتي تفرز هرمون Testosterone التستوستيرون



الشكل (١٨) الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان

الذي يعمل على إظهار الصفات الجنسية الثانوية في الذكر.

- ما هي هذه الصفات ؟

٢- الأعضاء التناسلية الثانوية (المساعدة) :

لاحظ الشكل (١٨) وادرس الجدول (٣)، لتعرف على الأعضاء التناسلية الثانوية في ذكر الإنسان، ثم أجب على الأسئلة التي تليه:

جدول (٣) الأعضاء التناسلية الشانوية في الذكر

الدور	الوصف	الاسم	الوظيفة
مستودع رئيس للحيوانات المنوية يفرز نسيجه مواداً غذائية، ومواداً أخرى تحافظ على حيوية الحيوانات المنوية وتعمل على نضجها وتكسبها القدرة على الإخصاب والحركة.	وعاء مُلتوٍ (مبطن بنسیج) تتجمع فيه قنوات صادرة من الأنابيب المنوية.	البربخ <i>Epididymis</i>	(القناة التناسلية الناقلة)
نقل الحيوانات المنوية إلى الإحليل.	قناة رفيعة سميكة الجدار ممتدة من البربخ وتلتقي حول المثانة حتى تلتقي مع قناة الحويصلة المنوية.	الوعاء الناقل <i>Vas deferens</i>	
نقل البول والحيوانات المنوية	قناة تكونت من اشتراك قنوات الأوعية الناقلة والغدد المساعدة مع قناة المثانة لتصبح مشتركة تمر خلال القصيب وتفتح بالفتحة البولية الخارجية.	الإحليل <i>Urethra</i>	
إفراز مادة مخاطية غنية بالفركتوز لتزويد الحيوانات المنوية بالطاقة كما تحتوي على حموض دهنية معدلة تعمل على تنبية انقباض عضلات الرحم، فتساعد في حركة السائل المنوي نحو البوسطة.	زوج من أكياس تقع إلى الجهة الخلفية من المثانة البولية.	الحوصلتان المنويتان <i>Seminal Vesicles</i>	(أجزاء التناسلية المساعدة)
إفراز سائل قاعدي يعادل حموضة المهبل والسائل المنوي الناتج عن نشاطات الحيوانات المنوية المخزونة.	غدة تحيط جذر الإحليل.	غدة البروستات <i>Prostate gland</i>	
تفرزان كمية قليلة من سائل يساعد في معادلة حموضة بقايا البول في الإحليل.	غدتان تفتحان في الإحليل.	غدتاً كوبر <i>Cowper's gland</i>	

– ما الغدد التناسلية الثانوية؟

– عدد القنوات والغدد التي يشملها كل نوع؟ صفتها وحدد دورها؟


تكوين الحيوانات المنوية : Spermatogenesis

– تعد عملية إنتاج الحيوانات المنوية عملية مستمرة في الإنسان البالغ. أين تتم هذه العملية؟ وما مراحلها؟
لتتعرف على ذلك ادرس الجدول التالي وأجب عن الأسئلة التي تليه:

وصف أحداثها	المرحلة
تمايز الخلايا التناسلية الأصلية لتنتج الخلايا المنوية الأم Spermatogonia	<p>خلايا تناسلية أصلية $2n$ ↓ خلية منوية أم $2n$ انقسام متتساو ↑ خليات منوية ابتدائية $2n$</p>
تنمو بعض الخلايا المنوية الأم، وتنقسم كل منها انقساماً متتساوياً لتعطي خلايا منوية ابتدائية Primary Spermatocytes	<p>منصف أول ثانية منوية n منصف ثاني ثانية منوية n طلائع منوية n طلائع منوية n طلائع منوية n طلائع منوية n</p>
تنقسم كل خلية منوية ابتدائية انقساماً منصفاً أولياً لتنتج خلايا تحتوي نصف العدد الأصلي من الكروموسومات وتسمى الخلايا المنوية الثانوية Secondary Spermatocytes وتنقسم كل خلية منوية ثانية بالانقسام المنصف الثاني (متتساوي) إلى طلائع منوية (Spermatids) وتمر بعمليات نمو وتمايز لتحول إلى حيوانات منوية .Spermatozoa	<p>حيوانات منوية اختصرت عدد الكروموسومات في الإنسان (٤٦) إلى (٤) للتيسير.</p>

– صفات أحداث كل مرحلة.
تركيب الحيوانات المنوية :
 الحيوان المنوي خلية يبلغ طولها نحو (60) ميكرون (0.06) ملم ولتعرف على تركيبه ادرس الجدول (٥) :

جدول (٥) أجزاء الحيوان المنوي ووصفها


وصف الأجزاء	أجزاء الحيوان المنوي
تتضمن نواة أحادية المجموعة الكروموسومية (n) ويوجد في مقدمته الجسم القمي يحتوي على إنزيمات هاضمة.	
تحتوي على عدد من الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة على شكل ATP واللازمة لحركة الحيوان المنوي.	
زائدة تمثل امتداداً للغشاء الخلوي وله النمط التركيبى للأهداب والزوائد (2+9) وهو المحرك الذى يدفع الحيوان المنوي دفعاً نشيطاً إلى الأمام.	

– ما الأجزاء الرئيسية للحيوان المنوي؟
 – ما أهمية الآتي : الجسم القمي ، الميتوكوندريا ، الذيل .

الجهاز التناسلي الأنثوي Female Reproductive System

ما دور الجهاز التناسلي الأنثوي في الإنسان؟
 يقوم الجهاز التناسلي في الأنثى بالإنسان بإنتاج البوالصات ، وفي حالة إخصاب البوالصة يتتطور فيه الجنين وينمو حتى الميلاد .
 – مم يتكون هذا الجهاز؟

تعرف على أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي في الشكل (١٩) وكيف يتكون من أعضاء تناسلية أساسية وأعضاء تناسلية ثانوية (مساعدة) وذلك كما يأتي :
 ١- الأعضاء التناسلية الأساسية وهي : المبيضان ، لاحظ موقعهما على جانبي الرحم . ويرتبط المبيض بكل من الرحم وقناة فاللوب بواسطة نسيج ضام ، ويوجد في المنطقة الخارجية من المبيض حويصلات مختلفة



الأحجام بعضها تحتوي على بويضة محاطة بنسيج طلائي وتعرف بحوصلة جراف ويعود تكوين **Graafian Follicle** الحويصلات أهم وظائف المبيض إضافة إلى إفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية كالإستروجينات.

الشكل (١٩) الجهاز التناسلي الأنثوي

٢- الأعضاء التناسلية الثانوية وتشمل:

- قناتي فالوب Fallopian Tubes

وتبلغ طول كل قناة حوالي ١٠ سم، وجدارها مكون من ثلاث طبقات وتحتوي خلايا الطبقة الداخلية على أهداب تساعد حركتها، إضافة إلى انقباض العضلات الملساء في جدار قناة فالوب، على دفع البويضة نحو الرحم.

- الرحم Uterus

عضو عضلي تتكون بطانته من نسيج طلائي وأوعية دموية، ويعتبر الرحم مر الحيوانات المنوية عند الإخصاب، ويحدث فيه الظمت، ومكانا لزرع الجنين ونموه حتى ميلاده.


- المهبل Vagina

قناة عضلية تنقل إفرازات الرحم إلى خارج الجسم، وتسمى كذلك قناة الولادة لخروج الوليد عبرها، وتسبح فيها الحيوانات المنوية إلى داخل الرحم.

تكوين البويضات : Oogenesis

يتم تكوين البويضات في مبيض الأنثى البالغة عبر مراحل مختلفة. لاحظ الشكل (٢٠)، لتعرف على مراحل تكوين البويضة في الإنسان، وادرس الجدول (٦). وأجب عن الأسئلة التالية:

- ما المراحل المختلفة لتكوين البويضات في أنثى الإنسان البالغة؟ صُف كل مرحلة؟
- بماذا تختلف الخلية الناتجة عن الانقسام المنصف الأول؟
- كم عدد الكروموسومات في البويضة الناضجة.



الشكل (٢٠) قطاع في المبيض يبين مراحل تكوين البوopies.

جدول (٦) مراحل تكوين البوopies

الوصف	المرحلة
تنقسم الخلايا التناسلية الأولية انقسامات متتساوية Oogonia لتنتج خلايا بيضية أم	خليّة تناسليّة أصلية ↓ خليّة بيضية أم
تنمو وتتطوّر الخلية البيضية الأم إلى خلايا بيضية أولية. Primary Oocytes	خليّة بيضية ابتدائية ↓ خليّة بيضية ثانوية
تمر الخلية البيضية بالمرحلة الأولى من الانقسام المنصف لتنتج خلية كبيرة الحجم تُسمى الخلية البيضية الثانية والخلية صغيرة الحجم Second polar body تُسمى الجسمقطبي الأول - تدخل الخلية البيضية الثانية المرحلة الثانية في الانقسام المنصف عند حدوث الإخصاب باختراق الحيوان المنوي لغشاء الخلية البيضية، وتستمر المرحلة الشأنوية من الانقسام لتنتج البويبة الناضجة والجسمقطبي الثاني، وقد ينقسم الجسمقطبي الأول إلى جسمينقطبيين (إضافية).	جسمقطبي أول ↓ جسمقطبي ثان ↓ بويبة ناضجة ↓ اختصار عدد الكروموسومات في الإنسان (٤٦) إلى (٤) للتبسيط.


النشاط (١٢)

- نفذ النشاط الخاص بفحص شرائح مجهرية جاهزة لقطاعات عرضية في كل من خصية ومبين حيوان ثديي في كتاب الأنشطة والتجارب العملية.

قضية للبحث

- ابحث في موضوع بنوك الأمشاج.

دورة الحيض Menstrual Cycle



الشكل (٢١) دورة الحيض

ماذا يقصد بدورة الحيض؟

تحدث تغيرات دورية كل (٢٨ يوماً) تقريباً في مبيض وبطانة الرحم لأنثى الإنسان البالغة، «مالم تتم عملية الإخصاب»، وتسمى هذه التغيرات دورة الحيض.

لاحظ الشكل (٢١) وتعرف على أقسام دورة الحيض الآتية:

١- دورة المبيض وتقسم إلى :

أ - طور الحصولة: وفيه تنضج إحدى الحصولات مكونة بدأیة الدورة في أحد المبايض.

ب - طور الإباضة. ماذا يحدث لحصلة جراف؟ ومتى؟

ج - طور الجسم الأصفر: في هذا الطور تلتئم الحصولة الخالية من البويضة مكونة الجسم الأصفر ويستمر الجسم الأصفر حتى نهاية الدورة، في حالة حدوث الحمل وتفرز هرمونات أهمها الاستروجين والبروجستيرون.

– ما الهرمونات الحافظة لأطوار دورة المبيض؟ ومن أين تفرز؟
لاحظ أن هرمون الجسم الأصفر يعملان على تثبيط الهرمونات الحافظة لأطوار المبيض لمنع نضج حوصلة جديدة.


٢- دورة الرحم:

ما أطوار هذه الدورة؟ ماذا يحدث فيها؟

لاحظ أنه في طور النمو والإفراز يزداد سمك بطانة الرحم وتصبح غنية بالأوعية الدموية والإفرازية لتوفير بيئة ملائمة لنمو الجنين، ويحدث ذلك بتأثير هرموني البروجسترون والإستروجين.

ماذا يحدث إذا لم تخصب البويضة؟

يضم الجسم الأصفر في اليوم (٢٤ للدورة تقريباً) وينخفض تركيز هرموناته مما يسبب انسلاخ بطانة الرحم وخروجها مع نزيف من الشعيرات الدموية يستمر من (٥-٣) أيام ويسمى بذلك طور الحيض.



الشكل (٢٢) عملية الإخصاب

الإخصاب Fertilization

– ما المقصود بعملية الإخصاب

وكيف تتم؟

لاحظ الشكل (٢٢). وكيف تتم عملية الإخصاب في الثالث الأول من قناة فالوب وفقاً للخطوات الآتية:

١- يخترق الحيوان المنوي المنطقة الشعاعية للخلية البيضية الثانية ليصل للمنطقة الشفافة. ما الذي يساعد في تحليل هذه الطبقة؟

٢- يلتاحم الغشاء البلازمي في الحيوان المنوي مع غشاء الخلية البيضية مما يساعد على إفراز أنزيمات من خلايا قشرية تقع تحت غشاء الخلية لتكون طبقة قاسية تقلل من احتمال دخول أكثر من حيوان منوي واحد.

- ٣- يدخل رأس الحيوان المنوي سيتوبلازم البويضة بعد أن يفقد ذيله وبذلك تكتمل الخلية البيضية لتكون بويضة **Ovum** وجسم قطبي ثانٍ يختفي فيما بعد.
- ٤- تنتقل نواة البويضة ونواة الحيوان المنوي إلى وسط البويضة وتندمج النواتان لتكون اللاقحة **Zygot**.

● ابحث في موضوع الإخصاب خارج الرحم.


قضية للبحث

تكوين الجنين:


تعد البويضة الخصبة (اللاقحة) أول خلية جسمية من الطفل الذي تحمله أمه تسعه أشهر. فما التغيرات التي تحدث خلال هذه الفترة. لتعرف على ذلك. ادرس الجدول (٧) مستعيناً بالشكل (٢٣-٢٤).

جدول (٧) يبين مراحل تغيرات البويضة الخصبة

المرحلة	الغيرات
الشهر الثالثة الأولى	<ul style="list-style-type: none"> - مجموعة من انقسامات متساوية تسمى عملية التفلج (اليوم الأول). - تكون كتلة من (١٦) خلية تسمى التوتة Morula (اليوم الثالث). - تكون شكل بداخله تجويف ملئ بسائل يسمى البلاستيولا Plastocyst ينغرس في بطانة الرحم (في اليوم السادس). - تكون الكتلة الداخلية في البلاستيولا القرص الجنيني الذي يتميز إلى ثلاثة طبقات تسمى الطبقات الجنينية الأولية. - الحركة المختلفة لخلايا البلاستيولا تحولها إلى طور يسمى الجاسترولا gastrula. - ظهور الثنائيات القلبية. - يتتشكل الوجه ويكتون القلب من أربع حجرات ويتميز الجنس. - تتكون أصابع اليدين والقدمين وتتكون الأذنين ويظهر الجنين محاطاً بأربعة أغشية.
الشهر الثالثة الثانية	<ul style="list-style-type: none"> - تنمو أعضاء الجنين بسرعة وشعور الأم بحركتها. - تسمع دقات القلب (وتزداد حركة الجنين) وتنمو نصفاً الكره الخبية وتماماً على الحواس. - تظهر أهداب وحواجب الجنين ويبدو جلدُه أحمر متوجعاً.
الشهر الثلاثة الأخيرة	<ul style="list-style-type: none"> - تتكون الأظافر وتزداد عظام الجمجمة صلابة، وينقلب وضع الجنين ليصبح الرأس نحو عنق الرحم قبل الولادة بعدة أسابيع.



الشكل (٢٣) المراحل الأولى في تشكيل الجنين



الشكل (٢٤) انغرس الجنين في بطانة الرحم وتكون الطبقات الجرثومية الثلاث

ما الأعضاء والأجهزة التي تنشأ من الطبقات الجرثومية الثلاث؟

تعرف على ذلك من دراسة الجدول الآتي:

جدول (٨) الطبقات الجنينية والأعضاء والأجهزة التي تنشأ منها

الطبقة الجنينية	الأعضاء والأجهزة التي تنشأ منها
الطبقة الخارجية	الجهاز العصبي والجلد ومشتقاته كالشعر.
الوسطى	الجهاز العضلي ، والنقل والإخراج والتناسلي والطبقات الخارجية لجهازي التنفس والهضم.
الداخلية	الأنسجة الطلائية المبطنة للقناة الهضمية والقناة التنفسية والغدد الملحقة بها والأنسجة الطلائية المبطنة للمثانة البولية .

- انظر الشكل (٢٥) ، ولاحظ الأغشية التي تحيط بالجنين؟ سُمّ كلاً منها؟ حدد دورها؟
- استعن بالجدول (٩) .

جدول (٩) الأغشية الجنينية ودورها.


الغشاء الجنيني	دوره
كيس المح	تكون خلايا الدم في المرحلة الجنينية الأولى ويشارك جزء منه في تكوين أنبوب القناة الهضمية الجنينية .
المبار	يكون خلايا الدم .
الكوربيون	له علاقة بالتغذية والتنفس والإخراج بين الأم والجنين .
الرهل / أمنيون	ملؤ سائل أمنيوني يحمي الجنين من الصدمات ويسهل حركته والمحافظة على ثبات درجة حرارته .

تغذية الجنين:

كيف يحصل الجنين على المواد الغذائية الالازمة لنموه؟
 تمعن الشكل (٢٥) ولاحظ أن المشيمة نسيج متخصص يتكون من بطانة الرحم في الأم، وغشاء الكوربيون في الجنين، ويتصل الجنين بالمشيمة بواسطة الحبل السُّري الذي يحتوي على شريانين سُريين يحملان الدم من الجنين إلى المشيمة، ووريد سُري يحمل الدم من المشيمة إلى الجنين.
 لتعرف على أجزاء المشيمة ومميزات كل جزء ادرس الجدول (١٠) .

جدول (١٠) أجزاء المشيمة ووصفها

الوصف	أجزاء المشيمة
ينتشر به جيوب كثيرة تمتلي دمًا من أفرع شريانية من الأم ويعود الدم فيها إلى الأم بأفرع وريدية.	الرحمي (الأمي)
يتكون من خملات من الكوريون تمتد في كل خملة شعيرات دموية دقيقة ناتجة عن تفرعات الأوعية الدموية للحبل السري.	الجنيني



الشكل (٢٥) الأغشية الجنينية

عرفت سابقاً أن دم الأم لا يختلط بدم الجنين، فكيف يتم مرور المواد بينهما؟ يحدث تبادل بين دم الأم ودم الجنين عن طريق الانتشار عبر المشيمة. يأخذ الجنين المواد الغذائية والأكسجين من دم الأم، ويتخلص من ثاني أكسيد الكربون والمواد الإخراجية النيتروجينية.

- ابحث في موضوع مراحل المخاض (الولادة).

قضايا للبحث

تقويم الوحدة

١- ماذا يقصد بالآتي :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| – ظاهرة تبادل الأجيال . | – التبوغ | – التكاثر البكري . |
| – الأغشية الجنينية . | – التكاثر الخضري . | – دورة الحيض . |


٢- علل ما يأتي :

- ظهور أعراض الملاريا بشكل دوري .
- عدم تكوين بويضات جديدة خلال فترة الحمل في المرأة .
- تلاؤم تركيب الحيوان المنوي مع وظيفته .
- إفرازات الغدد المساعدة في الجهاز التناسلي الذكري قلوية التأثير .

٣- الشكل المجاور يبين مقطعاً خالياً للمبيض وأنسوبة اللقاء لنبات قبل عملية الإخصاب .

أ – أي الخلايا المبينة بالحروف تندمج مع الأنوية الذكرية لتكوين الآتي :

- الأندوسيبرم .
- الزيجوت .



ب – بعد عملية الإخصاب ما هو التركيب الذي سوف يظهر من تطور كلٍّ من الآتي :

– جدار المبيض . التركيب س .

ج – حدد العدد الكروموموسمي الذي يوجد في :

– نواة خلايا التركيب س .

– نواة الخلية ج .

– أنوية الأندوسيبرم .

٤- وضح يٰيجاز الطرق التي يمكن استخدامها للحصول على :

- أفضل عقلة من نبات الورد وتكثيرها . - ثمار عذرية .

٥- ما وظيفة الآتي :

- مبيض أنثى الإنسان . - البربخ . - الحصيتان في الإنسان .

٦- قارن بين اثنين في كل فقرة مما يأتي :

أ- الدورة الجنسية واللاجنسية في طفيلي بلازموديوم الملاриا من حيث عددها ، ومكان حدوثها .

ب- الطور المشيحي ، والبوغي في الفيوناريا من حيث المجموعة الكروموسومية .

ج- التطعيم بالبرعم ، والتطعيم بالقلم من حيث آلية التحضير للطعم والأصل ، وآلية وضع الطعم في الأصل .

٧- ادرس الشكل اللاحق الذي يوضح العلاقة في تركيز الهرمونات لدورة الحيض والمطلوب تحديد أثر الآتي :


أ- الزيادة المفاجئة في تركيز LH.


ب- إفراز الجسم الأصفر هرمون البروجيسترون بعد اليوم الرابع عشر من الدورة .

ج- هرمونات :

- FSH على حوصلة جراف .

- البروجيسترون والإستيروجين على الرحم في دورة الحيض .





أساسيات علم الوراثة Principles Of Genetics

الوحدة الرابعة



جيل الأبناء يحمل صفات الآباء


أهداف الوحدة

يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن :

- ١- توضح تجربة مندل وقوانينه في الوراثة .
- ٢- تشرح كلاً من مفهوم السيادة التامة والسيادة الناقصة ، والسيادة المشتركة والارتباط والعبور .
- ٣- تقارن بين الشكل الجيني والشكل المظاهري للكائن الحي .
- ٤- تبين آلية انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء .
- ٥- تستخدم قوانين الوراثة في حل المسائل الوراثية المختلفة .
- ٦- تتعرف على بعض الأمراض الوراثية المنتقلة من الآباء إلى الأبناء .
- ٧- توضح دور الكروموسومات الجنسية في وراثة بعض الصفات .

أساسيات علم الوراثة Principles of Genetics

لاحظ الإنسان منذ القدم أن الأبناء تأتي شبيهة بآبائهما، فالقطط تشبه آباءها،



الشكل (١) الأبناء تشبه الآباء

والآباء في البشر يختلفون بشراً مثلهم، انظر (الشكل - ١)، والنبات الناتج عن نوع من البذور يأتي مشابهاً للنباتات التي أنتجت تلك البذور، وهكذا في بقية الكائنات الحية. ولقد توصل الإنسان إلى أن تشابه الأجيال المتعاقبة في الكائن الحي يحدث نتيجة لتوارث الأبناء صفات وخصائص الآباء جيلاً بعد جيل. ويطلق على هذه الظاهرة توارث الصفات أو الوراثة.

- فما المقصود بالوراثة؟

يقصد بالوراثة انتقال صفات وخصائص الآباء إلى الأبناء في الأجيال المتعاقبة.

لكن قد يأتي الأبناء مختلفين عن الآباء في بعض الصفات الظاهرة كاللون مثلاً، ولم يدرك أسباب التشابه والتباين بين أفراد النوع الواحد من الكائنات الحية إلا في العصر الحديث عندما عرفت آليات انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء بواسطة علم جديد أطلق عليه علم الوراثة (Genetics) .

وهو: العلم الذي يبحث في كيفية انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء في الكائنات الحية المختلفة وأسباب تشابه الصفات وتباينها بين أفراد النوع الواحد.

- كيف تطور علم الوراثة؟

- كيف يتوارث الأبناء صفات وخصائص الآباء؟


- كيف يظهر التشابه والتباين في الصفات بين أفراد النوع الواحد؟

– ما وسيلة نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء؟
يتم نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء بواسطة عملية التكاثر؛ وذلك عبر الأمشاج التناسلية التي تنتقل عبرها صفات الآباء وخصائصها إلى أبنائهم مما يجعل سلالات النوع الواحد متشابهة منذ ظهورها على سطح الأرض.

تطور علم الوراثة الحديث:

تأسس علم الوراثة الحديث على يد العالم جريجور مندل Gregor Mendel الذي عاش في القرن التاسع عشر (١٨٢٢ - ١٨٨٤م). وقد قام بإجراء تجارب حول توارث الصفات على نبات البازلاء (Pisum Sativum) في حديقة الدير الذي كان يعمل فيه مستخدماً الأسلوب العلمي في البحث والتجربة مما ساعده في وضع الأسس الحالية لعلم الوراثة والتوصيل إلى بعض قوانينها.

- ولد جريجور مندل في عام ١٨٢٢ م في النمسا.
- أصبح راهباً ومدرساً للعلوم والرياضيات في جامعة فيينا عام ١٨٤٣ م.
- انقطع للرهبنة وتدرس العلوم في الدير الذي يعمل فيه حتى عام ١٨٦٨ م.
- بدأ تجارب على نبات البازلاء في حديقة الدير الذي يعمل فيه عام ١٨٥٦ م.
- أعلن تجاربه ونشرها عام ١٨٦٦ م.
- لم يهتم العلماء بنتائج أبحاثه حول الوراثة وظللت تجاربها ونتائجها مجهرة حتى عام ١٩٠٠ م.
- توفي العالم مندل عام ١٨٨٤ م.
- أطلق عليه أبو علم الوراثة الحديثة، بعد كشف النقاب بواسطة بعض العلماء عن أهمية ما توصل إليه في بداية القرن العشرين.



– لماذا اختار مندل نبات البازلاء لتجاربه؟

اختار مندل نبات البازلاء لتجاربه لأن هذا النبات :

- ١- موسمي ويمكن زراعته ٣-٤ مرات في العام الواحد.
- ٢- له عدة أصناف تحمل صفات متضادة متعددة وواضحة.
- ٣- يمكن زراعته ومتابعة نموه بسهولة.
- ٤- يمكن الحصول على سلالات نقية منه.
- ٥- يحمل أزهاراً خنثى مما يجعل من الممكن إخصابه ذاتياً أو خلطياً.

- ما المقصود بالأزهار الخنثى؟ لاحظ

الشكل (١) .

- كيف يتم التلقيح فيها؟

- ٦- ومن حسن حظ مندل أن كل صفة من صفات نبات البازلاء لا تحمل على كروموسوم مستقل بل تحمل على كروموسومين متقابلين ينفصل كل منهما عن الآخر أثناء تكوين الأمشاج، كما اتضح لاحقاً بعد



الشكل (٢) لون الأزهار في نبات البازلاء

اكتشاف الكروموسومات. ففي الفترة الزمنية التي نشر فيها مندل نتائج تجاربه لم يكن هناك أية معلومات علمية متوفرة عن الكروموسومات والجينات.

وقد لاحظ مندل أن هناك سبعة أزواج من الصفات المتضادة أو المقابلة كما في الشكل (٣) مثل طول الساق (بعضها طويل الساق والبعض الآخر قصير)، ولون الزهرة (بعضها تحمل أزهاراً وردية اللون والبعض الآخر يحمل أزهاراً بيضاء). لاحظ الصفات المتضادة في نبات البازلاء في شكل (٣) .

النشاط (١)

- التعرف على الصفات المتضادة لنبات أو حيوان .

الشكل (٣) الصفات المترادفة في نبات الباذلاء

سائدة	منتربية		سائدة	منتربية	
أخضر	أصفر	٤- لون القرون	طويل	قصير	١- طول الساق
متنفتح (املس)	محزر (مجدد)	٥- شكل القرون	إبطية	قمية (طرفية)	٢- موضع الزهرة
صفراء	خضراء	٦- لون البذرة	وردية	بيضاء	٣- لون الزهرة
مستديرة	مجعدة	٧- شكل البذرة			

وقد اتبع مندل خطوات علمية محددة في دراسة توارث كل زوج من أزواج الصفات في الباذلاء بشكل مستقل عن بقية الصفات، وقد استغرق في البداية عامين كاملين في زراعة نبات الباذلاء متبوعاً نظام التهجين حتى حصل على السلالات النقيّة التي تحمل أزواج الصفات المترادفة بشكل نقى، بمعنى أنه تأكّد أن النبات الطويل يحمل الصفة النقيّة للطول ولا يعطي إلا نباتاً طويلاً، والنبات القصير لا يعطي إلا نباتاً قصيراً والنبات ذا الزهرة البيضاء لا يعطي إلا نباتات تحمل الزهور البيضاء وهكذا.

خطوات دراسة توارث صفات البازلاء:

اتبع مندل خطوات محددة لدراسة كل صفة، فمثلاً عند دراسته لتوارث صفة لون الزهرة اتبع الخطوات الآتية:



الشكل (٤) التلقيح الذاتي للأزهار

- 1- استمر في زراعة البازلاء ذات الأزهار الوردية، والبازلاء ذات الأزهار البيضاء، كل على حدة للحصول على الصفتين بشكل نقى متبعاً أسلوب التلقيح الذاتي (Self-Pollination) للنباتات خلال عدة أجيال (الشكل - ٤)، حتى تأكّد في


الأخير أن النباتات ذات الأزهار الوردية لا تنتج إلا نباتات تحمل أزهاراً بنفس اللون جيلاً بعد جيل، وأن النباتات ذات الأزهار البيضاء لا تنتج إلا أزهاراً بيضاء خلال الأجيال المتعاقبة.

- 2- بعد أن تأكّد من نقاوة صفتى اللون الوردي واللون الأبيض لأزهار النباتات قام بزرع بذورها في مكان آخر لتنتج نباتات جديدة تحمل أزهاراً وردية وببيضاء.

- 3- اتبع أسلوب التلقيح الخلطي (Cross-Pollination) بين النبات ذات الأزهار الوردية، والنبات ذات الأزهار البيضاء، متبعاً الخطوات الآتية:

أ- قام بإزالة الأسدية من الأزهار البيضاء قبل نضجها.

ب- نقل حبوب اللقاح من متوك الأزهار الوردية إلى مياسم الأزهار البيضاء بعد نضجها.



الشكل (٥) عملية التلقيح الخلطي بين الأزهار

- ج- قام بعكس العملية في نباتات أخرى، أي التخلص من الأسدية في الأزهار الوردية ونقل حبوب اللقاح من متوك الأزهار البيضاء إلى مياسم الأزهار الوردية.

- د - كان يحرص على تغطية الأزهار الملقة ببغاء مناسب لضمان عدم وصول حبوب لقاح أخرى إليها بواسطة الهواء أو الحشرات (تلقيح ذاتي) .
- ٤- جمع مندل البذور الناضجة من النباتات ذات الأزهار الوردية وذات الأزهار البيضاء والناتجة عن التلقيح الخلطي ، ثم زرعها في موسم جديد . ولاحظ ألوان الأزهار في النباتات الجديدة بعد اكتمال نموها فوجد أن لون الأزهار في جميع النباتات الناجحة وردي ، وأعتبرت هذه النباتات أفراد الجيل البنوي الأول (F1)، واستنتج أن أزهار أفراد الجيل الأول وردية اللون سواء كانت الأمهات تحمل أزهاراً وردية أو بيضاء .
- ٥- ترك نباتات الجيل الأول تتلقيح ذاتياً حتى نضجت بذورها ثم جُمعت وزُرعت للحصول على أفراد الجيل الثاني (F2) (Second Filial Generation) ،
- ٦ - عند حساب عدد النباتات ذات الأزهار الوردية والنباتات ذات الأزهار البيضاء من نباتات الجيل الثاني وجد أن النسبة العددية بين النوعين $1:3$ بمعنى أن $\frac{1}{4}$ النباتات تحمل أزهاراً وردية و $\frac{3}{4}$ النباتات تحمل أزهاراً بيضاء .
- ٧- كرر نفس خطوات التجربة لدراسة بقية الصفات المتضادة كطول الساق وقصره مثلاً: فتوصل إلى أن إحدى الصفتين تختفي في الجيل الأول (F1) ثم تظهر الصفتان معاً في الجيل الثاني (F2) بنسبة $1:3$ ، وقد توصل مندل من خلال هذه النتائج إلى مبدأ السيادة التامة في الوراثة .

- ما المقصود بالسيادة التامة؟

(Complete Dominance)

أطلق مندل اسم الصفة السائدة (Dominant trait) على الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول (F1)، وسمى الصفة التي تختفي في الجيل الأول الصفة المتنحية (Recessive trait) . فمثلاً اعتبر أن اللون الوردي لأزهار نبات البازلاء صفة سائدة بينما اللون الأبيض صفة متنحية ، وكذلك طول ساق البازلاء صفة سائدة بينما قصر الساق صفة متنحية . وعلى هذا الأساس فقد أطلق مندل مبدأ السيادة التامة على ظهور صفة وراثية سائدة في جميع أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردان يحملان الصفات المترادفة بصورة نقية .

- كيف فسر مندل النتائج التي توصل إليها؟

فروض مندل لتفسير النتائج :

وضع مندل مجموعة من الفروض لتفسير ظهور الصفة السائدة واحتفاء الصفة المتنحية في أفراد الجيل الأول، ثم ظهور الصفتين في أفراد الجيل الثاني بنسبة ٣:١، وأهم هذه الفروض:

- ١- تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عن طريق عوامل وراثية (والتي عرفت حالياً بالجينات)، وقد سمي مندل العامل الوراثي للصفة (أليل Allele).
- ٢- لكل صفة وراثية عاملان وراثيان (أليلان) أحدهما من الأب والآخر من الأم.
- ٣- تكون الصفة الوراثية نقية إذا كان العاملان الوراثيان متشابهين (Homozygous). وتكون غير نقية عندما يكون العاملان متضادين (Heterozygous).
- ٤- ينفصل العاملان الوراثيان لكل صفة عند تكوين الأمشاج الذكرية والأنثوية، فيحمل كل مشيخ عاماً واحداً لكل صفة.
- ٥- عند حدوث عملية التلقيح أو الإخصاب بين الأمشاج الذكرية والأنثوية يجتمع العاملان الوراثيان من جديد في الأبناء لتكوين الصفة الوراثية.

وقد استخلص مندل من فروض ونتائج أبحاثه قوانين مندل الوراثية.

قانون مندل الأول : انعزال العوامل الوراثية :

ساعدت الفروض المذكورة سابقاً مندل في التوصل إلى قانونه الأول في الوراثة والذي أطلق عليه قانون الانعزال (Law of Segregation)، وينص قانون انعزال العوامل الوراثية على ما يأتي:

تشمل الصفة الوراثية في الكائن الحي بعاملين وراثيين (أليلين) ينعزلان عن بعضها عند تكوين الأمشاج؛ بحيث يحمل المشيخ عاماً وراثياً واحداً لكل صفة.

ويعني هذا القانون أن العوامل الوراثية (أو الجينات كما عُرفت لاحقاً) تنتقل بين الأجيال المتعاقبة مستقلة عن بعضها البعض، وتظهر أو لا تظهر تأثيراتها تبعاً لكونها سائدة أو متنحية. فإذا حدث تزاوج بين فردان يختلفان عن بعضهما في زوج واحد من الصفات المقابلة، مثل الطول والقصر، ظهرت إحدى هاتين الصفتين فقط في أفراد الجيل الأول (الصفة السائدة)، بينما تعرف الصفة الأخرى المقابلة لها بالصفة المتنحية، ولكنها تظهر مرة أخرى في عدد من أفراد الجيل الثاني يصل إلى ربع أعداد أفراد الجيل تقريباً (أي بنسبة ٣:١).

الشكل الجيني والشكل الظاهري: (Genotype & Phenotype)

استخدم مندل الحروف اللاتينية الكبيرة للدلالة على العوامل الوراثية للصفات السائدة، مثل (RR) لتدل على اللون الوردي للأزهار الوردية النقية في البازلاء، واستخدم الحروف الصغيرة لتدل على عوامل الصفات المتنحية، مثل (rr) لتدل على اللون الأبيض في البازلاء.

– ما الحروف الدالة على اللون الوردي غير النقية في البازلاء؟

يمكنك الاستنتاج بأن الحرف (R) يدل على عامل اللون الوردي السائد في الأزهار، والحرف (r) يدل على عامل اللون الأبيض المتنحي، وتكون الأزهار الوردية غير نقية عندما تحمل العاملين الوراثيين (Rr). وينتج العاملان الوراثيان عن تلقيح حبة اللقاح للبوياضة في الزهرة؛ حيث تحمل البوياضة أحد العاملين الذي قد يكون (R) أو (r)، وتحمل حبة اللقاح أيضاً أحد العاملين الذي قد يكون (R) أو (r) وينتج عن عملية التلقيح إلقاء العاملين (RR) أو العاملين (rr)، أو العاملين (Rr).

وعلى هذا الأساس سنلاحظ أن هناك نوعين من البازلاء ذات الزهور الوردية يختلفان عن بعضهما من حيث الشكل الجيني (Genotype) وهذا (Rr + RR) وهمما (Phenotype) وقد يكون الشكل الظاهري نقياً أو هجينياً كما في الشكل (٦) .

ادرس الشكل (٦)، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

١- كم شكلًا ظاهرياً للأزهار نبات البازلاء؟

٢- كم شكلًا جينياً للأزهار نبات البازلاء؟


٣- حدد الأشكال الظاهرة النقية والأشكال الهجينة.

٤- ما نسبة الأشكال الجينية النقية إلى الأشكال الجينية الهجينة في الجيل الثاني من الأبناء؟

٥- ما نسبة الأزهار الوردية إلى الأزهار البيضاء في الجيل الثاني من الأبناء؟

يمكن الاستنتاج بأنه لكل فرد سواء في البازلاء أو في غيرها من الكائنات الحية الأخرى صفات ظاهرية يمكن ملاحظتها، والتي قد تكون صفة نقية أو صفة غير نقية (هجينة)، ولكل صفة عاملان وراثيان يعملان على إظهار تلك الصفة ويثنان الشكل الجيني .

- كيف تعرف كل من الشكل الظاهري والشكل الجيني للصفة؟
- لماذا تكون الصفة المتنحية دائماً نقية؟



النشاط (٢)

ارسم مخططاً لتوريث صفة طول الساق لنبات البازلاء علماً بأن العاملين الوراثيين لصفة الطول النقيمة هما (TT) والعاملين الوراثيين لصفة القصر هما (tt) ، موضحاً في المخطط الأشكال الظاهرية والأشكال الجينية للنبات.

استخدام الجداول في حل المسائل الوراثية:

يمكنك استخدام الجدول الذي يسمى مربع بونيت (Punnet Square)، نسبة إلى العالم الوراثي (Reginald Crundell Punnett) الذي ابتكره واستخدمه في حل المسائل الوراثية وإظهار الاحتمالات الممكنة لظهور الصفات الناتجة عن إخصاب الأمشاج الذكورية للأمشاج المنثرة في الكائن الحي.

وقد استخدم هذا الجدول في التعبير عن النتائج التي توصل إليها مندل في تجاريته، حيث يمكن استخدامه عند معرفه الأشكال الجينية للأباء للتنبؤ باحتمالات ظهورها في الأجيال المتعاقبة للأبناء. فمثلاً يمكن التعبير عن احتمالات ظهور اللون الوردي واللون الأبيض للأزهار في نبات البازلاء حسب الخطوات الآتية:

جيل الآباء: وردية نقية (ذكر) \times بيضاء (مؤنث).

rr الترکیب الجینی: RR الأمشاج:

		الجيـل الأول	
		للأبنـاء (F_1)	
		أزهـار وردـية	هجـينة (Rr)
r	r	R	R
r	Rr	Rr	
R	Rr	Rr	

الشكل (٧) مربع بونيت

١- حدد الشكل المظاهري لجيـل الآباء.

٢- حدد الأمشاج وميـز بين الذـكرة منها
والأـنثـوية من خـلال العـلامـتين للـذـكر و للـمؤـنـث.

٣- ضع الأـمشـاج الذـكـرـيـة في الصـفـ الأـفـقـيـ الـأـعـلـىـ لـلـمـرـبـعـ.

٤- ضـعـ الأـمشـاجـ الأنـثـويـةـ فيـ الصـفـ الرـأـسـيـ عـلـىـ يـسـارـ المـرـبـعـ.

٥- ضـعـ رـمـوزـ الزـيـجوـتـ النـاتـجـةـ عنـ انـدـمـاجـ كـلـ مشـيـجـ ذـكـرـيـ معـ مشـيـجـ

أنـشـويـ فيـ الخـانـةـ المـقـابـلـةـ لـلـمـشـيـجـينـ فيـ المـرـبـعـ (ـ الشـكـلـ ٧ـ).

٦- تـعـرـفـ عـلـىـ نـوـعـ كـلـ زـيـجوـتـ نـاـتـجـ وـحدـدـ نـسـبـةـ ظـهـورـ الصـفـاتـ الـخـلـفـةـ فيـ جـيـلـ الـجـدـيدـ.

- ما لـونـ الأـزـهـارـ النـاتـجـةـ عنـ حدـوثـ التـلـقـيـحـ الذـاتـيـ لـنبـاتـ الـجـيـلـ الـأـوـلـ (F_1)؟

استـخدـمـ مـرـبـعـ بـوـنـيـتـ مـتـبـعـاـ نـفـسـ الـخـطـوـاتـ السـابـقـةـ لـلـتـعـرـفـ عـلـىـ لـوـنـ الـأـزـهـارـ النـاتـجـةـ فيـ جـيـلـ الـأـبـنـاءـ الثـانـيـ،ـ وـذـلـكـ كـمـاـ فـيـ الشـكـلـ (٧ـ).

جيـلـ الآـبـاءـ:ـ وـرـدـيـةـ هـجـيـنـةـ (ـذـكـرـ) \times وـرـدـيـةـ هـجـيـنـةـ (ـمؤـنـثـ).

Rr التـرـكـيـبـ الجـيـنـيـ: Rr الأـمشـاجـ:

		الجيـل الأول	
		للأبنـاء (F_1)	
		أزهـار وردـية	هجـينة (Rr)
R	r	R	r
R	Rr	Rr	
r	Rr	rr	

الشكل (٨) مربع بونيت

- ما الشـكـلـ الـظـاهـريـ لـجيـلـ الآـبـاءـ؟

- ما التـرـكـيـبـ الجـيـنـيـ لـجيـلـ الآـبـاءـ؟

- ما الأـشـكـالـ الـظـاهـرـيـةـ (ـلـونـ الـأـزـهـارـ)ـ فيـ جـيـلـ الـأـبـنـاءـ؟

- حـدـدـ التـرـكـيـبـ الجـيـنـيـ لـكـلـ لـونـ مـنـ لـوـنـ الـأـزـهـارـ جـيـلـ الـأـبـنـاءـ.

- مـاـ نـسـبـةـ الـأـزـهـارـ وـرـدـيـةـ اللـوـنـ إـلـىـ الـأـزـهـارـ الـبـيـضـاءـ فـيـ جـيـلـ الـأـبـنـاءـ؟

التركيب الجيني :			
rr	Rr	Rr	RR
وردية نقية	وردية هجينية	وردية هجينية	بيضاء
١	١	١	١
الشكل الظاهري : ٣ وردية اللون :			١ بيتاء

الشكل (٩)

لابد أنك توصلت إلى أن ألوان أزهار أفراد جيل الأبناء في تركيبها الجيني وأشكالها الظاهرة موضحة كما في الشكل (٩) : - ما الذي ينتج عند حدوث تلقيح ذاتي للنباتات ذات الأزهار البيضاء؟

النشاط (٣)

استخدم مربع بونيت للتوصيل إلى احتمالات ظهور صفة طول ساق نبات البازلاء وقصره في الجيل الأول والثاني للأبناء إذا علمت أن التركيب الجيني لصفة طول الساق النقية (TT) والتركيب الجيني لصفة قصر الساق (tt).

تطبيقات لقانون مندل الأول :

توصل علماء الوراثة إلى أن كثير من الصفات الوراثية في الكائنات الحية المختلفة تنتقل من جيل إلى جيل طبقاً لقانون مندل الأول الخاص بانعزال الصفات الوراثية والسيادة والتنحية لها؛ حيث إن إحدى الصفتين تسود سيادة كاملة وتظهر في جميع أفراد الجيل البنيوي الأول. فمثلاً تسود صفة اللون الرمادي على اللون الأبيض في الفئران، ويسود لون الجلد الأسود على الأحمر في الماشية، وتسود صفة عدم وجود القرون على وجود القرون فيها، وفي الخيل يسود اللون الأسود على البني، وفي القطط يسود الشعر القصير على الشعر الطويل، وفي الإنسان يسود لون العين العسلي على اللون الرمادي أو الأزرق، ويسود لون الجلد الأصفر على الجلد الأبيض، وتسود صفة الأنف المدببة على الأنف المفلطحة.

- ابحث عن صفات أخرى في الكائنات الحية يتم توارثها طبقاً لقانون مندل الأول.


النشاط (٤)

استخدم مربع بونيت للتوصيل إلى احتمالات ظهور صفة اللون الرمادي واللون الأبيض للفأر في الجيل البنيوي الأول والجيل الثاني إذا علمت أن التركيب الجيني لصفة اللون الرمادي النقية هو (GG) بينما التركيب الجيني لصفة اللون الأبيض هو (gg).

– كيف تحدد فيما إذا كان التركيب الجيني للصفة السائدة نقياً أم هجينياً؟
يمكنك تحديد ذلك عن طريق التلقيح الاختباري.

التلقيح الاختباري : Test Cross

يعتبر التلقيح الاختباري أفضل الطرق للتفرقة بين الصفات السائدة النقية والصفات السائدة الهجينة (Heterozygous) (Homozygous) في النباتات أو الحيوانات، حيث يتم التلقيح الخلطي بين الفرد المراد معرفة ما إذا كان سائداً نقياً أم سائداً هجينياً مع فرد آخر يحمل الصفة المتنحية المضادة لها كما في الشكل (١٠). فإذا كان كل الناتج يحمل الصفة السائدة (الشكل الظاهري السائد) كان ذلك دليلاً على نقاء الصفة السائدة للفرد، أما إذا كان الناتج خليطاً بين الشكل الظاهري السائد والشكل الظاهري المتنحي (بنسبة ١:١ أو ٥٠٪ ورديّة و ٥٠٪ بيضاء) كان ذلك دليلاً على عدم نقاوة التركيب الجيني للصفة السائدة للفرد الذي يتم اختباره.
وتلاحظ أنه من خلال معرفة صفات الأبناء الناتجة يمكن تحديد التركيب الجيني للصفة السائدة، وتحديد ما إذا كانت نقية أم هجينة.



قانون مندل الثاني (التوزيع الحر للصفات) Law of Independent Assortment

استطاع مندل التوصل إلى قانونه الثاني من خلال تجاربه على نبات البازلاء لدراسة السلوك الوراثي لزوجين من الصفات المترادفة في النبات مثل زهرة ورديّة وإبطية وزهرة بيضاء قمية.
– اذكر أمثلة أخرى لزوجين من الصفات المترادفة في نبات البازلاء.

وقد قام مندل بالخطوات الآتية لدراسة توارث صفتى بذور البازلاء (اللون والشكل):


- أجرى تلقيح خاطي بين نباتي بازلاء يحمل أحدهما بذوراً ملساء (مستديرة) اللون وصفراء اللون (الصفتان سائدتان) والتركيب الجيني لهاتين الصفتين هو **RRYY** بينما يحمل النبات الآخر بذوراً مجعدة الشكل وخضراء اللون (الصفتان متنهيتان)، والتركيب الجيني لهاتين الصفتين هو **rryy** كما في (الشكل ١١).

٢- وقد كرر مندل هذه الخطوات عدة مرات.

- لاحظ الصفات الظاهرية للبذور في بذور أفراد الجيل البنوي الأول.
- ما الصفات التي ظهرت في أفراد الجيل الأول؟

لقد وجد مندل أن البذور في نباتات الجيل البنوي الأول كانت مستديرة اللون أي إن الصفات السائدة للبذور تظهر في كل أفراد الجيل البنوي الأول، وتركيبها الجيني هو **RrYY**.

- قام مندل بتلقيح نباتات الجيل الأول مع بعضها البعض تلقيحاً ذاتياً.
- لاحظ الصفات الظاهرة للبذور في أفراد الجيل الثاني حيث كان ناتج أفراد الجيل البنوي الثاني كما في (الشكل ١١) وتحمل بذوراً لها صفات مختلفة موضحة في الجدول (١).



الشكل (١١)

جدول (١) الصفات المترادفة في نبات البازلاء

الشكل الظاهري	$\frac{ن}{ج}$	هل الصفة نقية أم هجين؟	الشكل الجيني	الشكل الظاهري
٩	١	مستدير (نقي) أصفر (نقي).	RRYY	مستدير أصفر
	٢	مستدير (نقي) أصفر (هجين).	RRYy	
	٢	مستدير (هجين) أصفر (نقي).	RrYY	
	٤	مستدير (هجين) أصفر (هجين).	RrYy	
٣	١	مستدير (نقي) أخضر (نقي).	RRyy	مستدير أخضر
	٢	مستدير (هجين) أخضر (نقي).	Rryy	
٣	١	مجنع (نقي) أصفر (نقي).	rrYY	مجنع أصفر
	٢	مجنع (نقي) أصفر (هجين).	rrYy	
١	١	مجنع (نقي) أخضر (نقي).	rryy	مجنع أخضر

من خلال دراستك لأفراد الجيل البنوي الثاني في الشكل (١١) والمجدول (١) :

- ما نسبة البذور الصفراء إلى الخضراء في الجيل البنوي الثاني؟
- ما نسبة البذور المستديرة إلى المجنعة؟

لاحظ أنه عندما تحسب عدد البذور التي تحمل اللون الأصفر ستتجد أنها (١٢)، وأن عدد البذور التي تحمل اللون الأخضر (٤) مما يعني أن نسبة اللون الأصفر إلى اللون الأخضر (١:٣)، وعندما تحسب أعداد البذور المستديرة والمجنعة ستتجد أن نسبة بينهما أيضاً (١:٣)، وهذا ما توصل إليه مندل، فقد لاحظ أن النسبة في توارث الصفات المترادفة هي نفسها التي حصل عليها في تجاربها السابقة على زوج واحد من الصفات (١:٣)، وهذا يعني أن توارث لون البذرة لا يرتبط بتوارث شكلها، أي إن توارث صفاتي اللون الأصفر والأخضر المترادفين يتم بشكل مستقل عن توارث صفاتي الشكل المستدير والمجنع للبذور. وقد ساعدت هذه النتائج مندل للتوصل إلى قانون التوزيع الحر للصفات الذي ينص على أن:

العاملين الوراثيين للصفة ينفصلان عن بعضهما ويتوزعان في الأمشاج بصورة مستقلة عن العاملين الوراثيين للصفة الأخرى.

وقد وجد أن قانون التوزيع الحر للصفات الوراثية ينطبق على أكثر من زوج منها في توارث الصفات في الكائنات الحية .

النشاط (٥)

توصيل إلى احتمالات ظهور قرون البازلاء الخضراء المنتفخة والقرون الصفراء المحزرفة في أفراد الجيل البيني الأول وأفراد الجيل البيني الثاني عند حصول تلقيح خاطئ بين نباتي بازلاء يحمل أحدهما قرناً خضراً منت佛خة (صفتان سائدتان) وتركيبها الجيني هو (GG II) ويحمل الآخر قرناً صفراء محزرفة (صفتان متختيتان) وتركيبها الجيني هو (gg ii)، تم حصول تلقيح ذاتي لأفراد الجيل البيني الأول لها، موضحاً نسبة ظهور كل زوج من الصفات المترادفة للقرون في أفراد الجيل البيني الثاني .

دور الكروموسومات في الوراثة :

إن ما توصل إليه مندل من أن توارث الصفات يتم عبر العوامل الوراثية **Allels** قد أثبتت الاكتشافات العلمية الحديثة صحته من خلال معرفة كروموسومات الخلية الحية ودورها في نقل الصفات الوراثية من جيل الآباء إلى جيل الأبناء عن طريق الجينات التي تحملها الكروموسومات .

وكما درست سابقاً فإن خلايا الفرد في كل نوع من الكائنات الحية تحتوي على عدد ثابت من الكروموسومات ، فالخلية الجسدية للكائن الحي تحتوي على عدد **(2n)** من الكروموسومات وتكون في شكل أزواج ، أي إن كل زوج منها يتكون من كروموسرين متماثلين يأتي أحدهما من الأب والآخر من الأم . أما الخلايا التناسلية (الأمشاج) للكائن الحي فتتكون الكروموسومات فيها بحالة فردية ، أي إنها تحتوي على مجموعة أحادية من الكروموسومات **(n)** ، وقد أطلق العلماء لاحقاً على العوامل الوراثية التي توجد في كل كروموسوم اسم الجينات **(Genes)** .

وقد وضع كل من العالم الألماني بوفري **Bovri** والعالم الأمريكي ساتون **Sutton** في عام ١٩٠٤م ، كل على حده ، أسس النظرية الكروموسومية في الوراثة على النحو الآتي :
١- تحتوي الخلايا الجسدية للكائن الحي على الكروموسومات والعوامل الوراثية (الجينات) على شكل أزواج **(2n)** .

- ٢- تنفصل أزواج الكروموسومات المتماثلة والعوامل الوراثية فيها عن بعضها البعض في عملية الانقسام الاختزالي بأن تنعزل العوامل الوراثية للصفة في الأمشاج ليحتوي المشيج على نصف العدد الأصلي منها (n).
- ٣- تتوزع العوامل الوراثية عند تكوين الأمشاج توزيعاً مستقلاً طبقاً لقانون مندل الخاص بالتوزيع الحر ، كما يسلك كل زوج من الكروموسومات مسلكاً مستقلاً عند تكوين الأمشاج التناسلية.
- ٤- ينتج عن عملية الإخصاب بين الأمشاج التناسلية عودة الحالة الزوجية (غير الفردية) للكروموسومات والعوامل الوراثية فيها؛ حيث يحتوي الجنين الناتج عن عملية الإخصاب على العدد الزوجي من الكروموسومات (2n) وعواملها الوراثية المنتقلة إليه من أبويه.


ومع استمرار التطور العلمي الحديث في مجال الوراثة فقد وجد أن عدد العوامل الوراثية (الجينات) يفوق بكثير عدد الكروموسومات في الكائن الحي، وقد ساعدت النتائج التي توصل إليها العالم الأمريكي مورجان Morgan من خلال أبحاثه على ذبابة الفاكهة في النصف الأول من القرن العشرين في معرفة أن كل كروموسوم يحتوي على عدد كبير من العوامل الوراثية (الجينات) وأن قوانين الوراثة يمكن تفسيرها بسلوك الكروموسومات والجينات التي تترتب على كل كروموسوم في صف طولي. ويرجع الفضل إلى العالم الدانمركي جوهانسون Johanson في إطلاق اسم الجينات (Genes) على العوامل الوراثية، وتميز بأن لها القدرة على مضاعفة نفسها لأنها عبارة عن وحدات كيميائية تترتب من حمض (DNA).

الكروموسومات وقوانين مندل:

يمكن الآن تفسير قوانين مندل في انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء على أساس الكروموسومات والجينات التي تحمل هذه الصفات.

فمثلاً عند تزاوج فأر يحمل صفة اللون البني النقية مع فأر آخر يحمل صفة اللون الأبيض النقية فإنه يمكن استخدام الكروموسومات والجينات لتوضيح التركيب الجيني وكيفية انتقال الصفات من الآباء إلى جيل الأبناء الأول والثاني، كما في الشكل (١٢).

- ما الصفة السائدة وما الصفة المتنحية لللون الفأر؟
- كم زوجاً من الكروموسومات الحاملة للصفة في الخلايا الجسدية لل فأر؟



الشكل (١٢) انتقال صفات اللون في الفئران عبر الكروموسومات.

- كم كروموسوماً يحمل الجين الخاص بالصفة في الأمشاج؟
- ما لون الفئران الناتجة في الجيل الثاني؟
- ما نسبة اللون السائد إلى اللون المتنحى لدى أفراد الجيل الثاني من الفئران؟

النشاط (٦)

استخدام الكروموسومات وجيناتها للتعبير عن انتقال صفاتي لون الزهرة وموضعها في نبات البازلاء من جيل الآباء إلى جيل الأبناء الأول والثاني، علماً بأن الكروموسومات التي تحمل صفتني اللون الوردي والوضع الإبطبي للزهرة هي A R، بينما الكروموسومات التي تحمل صفتني اللون الأبيض والوضع الطرفي للزهرة هي a r. محدداً نسبة ظهور كل زوج من الصفات المترادفة في الجيل البنوي الثاني.

التوارث غير المندي للصفات :

أظهر التطور العلمي أن بعض الصفات تخضع في توارثها لقوانين مندل، إلا أن هناك صفات أخرى يتم توارثها عبر الأجيال وفق قوانين وآليات أخرى. فمثلاً توصل مندل إلى مفهوم السيادة التامة فقط في توارث بعض الصفات فيما توصل العلماء لاحقاً إلى مفهوم السيادة المشتركة ونقص السيادة في نقل الصفات من جيل إلى آخر. وعلى كل فإن من أهم آليات التوارث غير المندي للصفات هي كما يأتي.

أولاً: نقص السيادة أو السيادة غير التامة : Incomplete Dominance :

وجد علماء الوراثة أن هناك حالات لتوارث بعض الصفات ويختلف فيها الشكل الظاهري للفرد الهجين عن الفرد النقي للصفة الموراثة، ويكون سبب هذا الاختلاف أن سيادة أحد العوامل الوراثية ليست سيادة تامة على العامل الآخر وإنما تكون سيادة ناقصة إلى حد ما. ومن أمثلة حالة السيادة الناقصة أو غير التامة في الإنسان توارث بعض أمراض فقر الدم مثل مرض فقر الدم المنجل **Sickle Cell Anaemia** وفقر دم البحر الأبيض المتوسط **Thalassemia** (الثلاثسيميما)، وينتشر مرض الثلاثسيميما في بلادنا بشكل ملحوظ .

النشاط (٧)

قم بزيارة إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي وقابل الطبيب المختص واحصل منه على عدد حالات المرضى المصابين بمرض الثلاثسيميما، وعدد مرضى فقر الدم المنجل (إن وجد) الذين يتم علاجهم في المستشفى أو المركز . ثم احصل منه على معلومات حول أسباب ظهور حالات المرض وأعراضه، وما هي الطرق للوقاية منه، ثم اكتب ذلك في تقرير وقدمه إلى مدرسك .

ينتج مرض الثلاثسيميما ومرض فقر الدم المنجل في الأطفال نتيجة لوجود الجينات المسئولة عن المرض في الأب والأم، فالجين الطبيعي والخالي من المرض يكون له نوع خاص من هيموجلوبين الدم يسمى الهيموجلوبين الجنيني **(HbF) Fetus Haemoglobin** وبعد ولادة الطفل يتكون نوع آخر من الهيموجلوبين يسمى هيموجلوبين البالغين **(HbA) Adult Haemoglobin** وذلك خلال الستة الأشهر الأولى من عمر الطفل، ولكن في الأطفال المصابين بمرض

الثلاثيميا لا يتم إنتاج هيموجلوبين البالغين، وقد وجد أن السبب في ذلك هو انتقال الجينات المسببة للمرض من الأب والأم إلى الأبناء؛ حيث إن الجين المسؤول عن إنتاج الهيموجلوبين الجنيني هو (H^F) أما الجين المسؤول عن إنتاج هيموجلوبين البالغين فهو (H^A) . ولهذا فالإنسان غير المصاب يكون تركيبه الجنيني ($H^A H^A$) والإنسان المصاب بالمرض إصابة كاملة فيكون تركيب الجنيني ($H^F H^F$) وأما الإنسان المصاب الذي يكون تركيبه الجنيني ($H^A H^F$) فت تكون إصابته بدرجة قليلة، ويظهر المرض في جيل الأبناء عند ما يتزوج رجل تركيبه الجنيني ($H^A H^F$) من امرأة تحمل نفس التركيب الجنيني ويكثر ظهور حالات الإصابة بهذا المرض في زواج الأقارب وخاصة عندما يكون المرض موجوداً بين أفراد الأسرة أو القبيلة أو العشيرة التي ينحصر التزاوج بين أفرادها.

النشاط (٨)

توصي إلى احتمالات ظهور مرض الثلاثيميا بين أفراد الجيل الأول من الأبناء عند حصول التزاوج بين رجل تركيبه الجنيني ($H^A H^F$) وامرأة تركيبها الجنيني ($H^A H^F$)، محدداً نسبة الأطفال المصابين بالمرض ونسبة الأطفال ذوي الإصابة المتوسطة بالمرض والأطفال غير المصابين .

وعادة ما تكون خلايا الدم الحمراء في الطفل المصاب بالمرض ($H^F H^F$) هشة وسريعة التكسر في أثناء مرورها في الكبد أو الطحال، وتكون كفافة الهيموجلوبين في نقل الأكسجين منخفضة، وعادة ما تظهر أعراض المرض في العشر السنوات الأولى من عمر الطفل ويبدو عليه أعراض فقر الدم الحاد كالشحوب وبطء في النمو، كما يتضخم الطحال ويترافق الحديد فيه وفي أجزاء أخرى من الجسم مما يؤدي إلى ظهور مشاكل في القلب والكبد والكلية قد تسبب الوفاة للطفل، ويتم علاج الطفل عن طريق تغيير دمه باستمرار.

وأما الشخص الذي يحمل التركيب الجنيني ($H^A H^F$) فتكون إصابته بدرجة قليلة وتظهر الأعراض السابقة في مراحل عمرية متاخرة ولكن بدرجة أقل مما يعني أن الجين (H^F) المسبب للمرض يكون له بعض الآثار في ظهور أعراض المرض في الفرد الهجين أي إن سيادة الجينات تكون ناقصة، ولا يظهر المرض إلا في وجود التركيب الجنيني في صورته الندية ($H^F H^F$). ويحصل الشيء نفسه بالنسبة لتوارث مرض فقر الدم المنجلبي الذي ينتشر بين السود في أمريكا وأفريقيا .


ثانياً : السيادة المشتركة : Co - Dominance

لاحظ العلماء في حالات توارث بعض الصفات ان الفرد الهجين يختلف شكله الظاهري عن الفرد النقي ويكون شكله وسطاً بين شكلي الآبوبين النقيين .

■ مثال (١)

توارث لون شعر الجلد في أبقار الشورت هورن .

عندما يتزوج فرداً نقيان أحدهما يحمل لون الشعر الأحمر وتركيبه الجيني (WW) والآخر يحمل لون الشعر الأبيض وتركيبه الجيني (RR) ، فتظهر افراد الجيل الأول كلها طوبية بينما افراد الجيل الثاني تتوزع في ثلاثة اشكال مظهرية هي : الأبيض والطوبى والاحمر بنسبة ١:٢:١



نلاحظ كلا من جيني اللون الأحمر والأبيض يظهر اثره أي ظهور شعرة حمراء وشعرة بيضاء .

■ مثال (٢)

وتظهر السيادة المشتركة ايضاً في توارث إحدى فصائل الدم في الإنسان حيث تشتراك I^B I^A في إظهار الفصيلة الدموية AB – ما فصائل الدم المختلفة في الإنسان؟ – كيف يتم توارث فصائل الدم في الإنسان؟

الشكل (١٣) توارث اللون في ابقار الشورت هورن

صنفت فصائل الدم في الإنسان إلى أربع فصائل هي فصيلة (A) وفصيلة (B) وفصيلة (O) ، وكل شخص يحمل دمه إحدى هذه الفصائل .

وقد صنفت هذه الفصائل وفقاً لوجود نوعين من مولدات الإلصاق (Antigens) وقد تسمى مولدات الضد، والتي تكون موجودة في الغشاء الخلوي لخلية الدم الحمراء؛ حيث وجد أن هناك نوعين من مولدات الإلصاق هما (A,B) فإذا وجد مولد الإلصاق (A) فتكون فصيلة الدم (A) وإذا وجد مولد الإلصاق (B) تكون فصيلة الدم (B)، وإذا وجد النوعان من مولدات الإلصاق في خلايا الدم الحمراء للشخص فتكون فصيلة دمه (AB). وإذا لم توجد مولدات الإلصاق فت تكون فصيلة دم الشخص (O).

كما وجد أن بلازما الدم تحتوي على نوعين من الأجسام المضادة (Antibodies) هما (a,b) ففصيلة الدم (A) تحتوي البلازما فيه على الأجسام المضادة (b)، وفصيلة الدم (B) تحتوي البلازما على الأجسام المضادة (a) وفصيلة الدم (O) تحتوي البلازما على الأجسام المضادة (a , b). وأما فصيلة الدم (AB) فلا تحتوي البلازما على الأجسام المضادة (a , b) ومن المهم جداً معرفة الفصائل الدموية عند عملية نقل الدم من شخص إلى آخر، ولو حدث أن نُقل دم يحمل مولدات الإلصاق (A) إلى شخص يحمل الأجسام المضادة (a) فإنه يحدث تفاعلٌ بين مولدات الإلصاق (A) وتلك الأجسام المضادة مسبباً التخثر لكريات الدم الحمراء، ومن ثم انسداد الأوعية الدموية فالوفاة للشخص المنقول إليه الدم.

وبتحكم في عملية توارث فصائل الدم إلى الأبناء جينات متعددة ومتقابلة يرمز إليها كما يأتي :

- ١- الجين I^A يكون مولد الإلصاق A .
- ٢- الجين I^B يكون مولد الإلصاق B .
- ٣- الجين i لا يكون أبداً من نوعي مولدات الإلصاق .

ويعني هذا أن الإنسان يرث جينين من الجينات الثلاثة وللذين يحددان نوع فصيلة الدم لديه . والجدول (٢) يوضح فصائل الدم وتركيبها الجيني في الإنسان .


- ما الفصائل التي تبدو فيه ظاهرة السيادة التامة؟
- ما الفصيلة التي تظهر فيه السيادة المشتركة للجينات؟

جدول (٢)		
الأجسام المضادة الموجودة في الدم	التركيب الجيني لفصيلة	التركيب الظاهري لفصيلة الدم
a , b	ii	O فصيلة
b	$I^A i$ أو $I^A I^A$ نقي هجين	A فصيلة
a	$I^B i$ أو $I^B I^B$ نقي هجين	B فصيلة
لا يوجد	I^A I^B	AB فصيلة

يتضح لك من الجدول أن كلاً من الجين I^A و I^B يسود سيادة كاملة على الجين i ، إلا أنه لا يسود أي منهما على الآخر كما هو ظاهر في فصيلة الدم AB، إذ يعمل كل منهما بشكل مشترك لتكوين مولدي الإلaciaق A,B، وتكون السيادة في هذه الحالة سيادة مشتركة.

مسألة محلولة :

توصيل إلى احتمالات ظهور فصائل الدم المختلفة في جيل الأبناء لأب فصيلة دمه A وتركيبيه الجيني $I^A i$ وأم فصيلة دمها B والتركيب الجيني لها $I^B i$ في (الشكل - ١٤).



الشكل (١٤)

ستلاحظ أن $\frac{1}{4}$ عدد الأبناء يحملون فصيلة الدم A وتركيبها الجيني ($I^A i$) و $\frac{1}{4}$ العدد يحملون فصيلة الدم B وتركيبها الجيني ($I^B i$) و $\frac{1}{4}$ العدد يحملون فصيلة الدم (O) وتركيبها الجيني (ii)، و $\frac{1}{4}$ العدد يحملون فصيلة الدم AB وتركيبها الجيني ($I^A I^B$)، وهي:

الفصيلة التي تبدو فيها ظاهرة السيادة المشتركة للجينات. وقد وجد أن دراسة توارث فصائل الدم مهمة جداً في الطب الشرعي، إذ تساعد على نفي الأبوة ولكن لا تثبتها، بل يثبتها الحامض النووي (DNA)، كما سترى ذلك في الوحدة اللاحقة.

- هل يمكن أن تكون فصيلة دم الطفل AB إذا كانت فصيلة أحد أبيه O ؟

النشاط (٩)

توصيل إلى احتمالات ظهور فصائل الدم لأبناء أب و أم أحدهما يحمل فصيلة الدم A وتركيبيه الجيني ($I^A i$) ويحمل الآخر فصيلة الدم O.

وراثة العامل الرايزيسى .Rheusus Factor

- ما المقصود بالعامل الرايزيسى ؟ وما أهميته؟

- كيف يتم توارث العامل الرايزيسى ؟

العامل الرايزيسى هو مولد التصاقى يوجد على غشاء خلايا الدم الحمراء فى الإنسان، ويرمز إليه بالرمز (Rh). وفي حالة وجوده يكون الشخص موجب العامل الرايزيسى (Rh⁺)، وفي حالة عدم وجوده يكون الشخص سالب العامل الرايزيسى (Rh⁻) ويمثل الأشخاص الذين يحملون العامل الرايزيسى حوالي ٨٥٪ من مجموع أفراد المجتمع، بينما تكون النسبة الباقية لأشخاص سالبي العامل الرايزيسى.

ويتحكم في توارث العامل الرايزيسى زوج من الجينات، فالجين D يكون سائداً ويعمل على تكوين مولد الإلصاق الرايزيسى بينما الجين d يمنع تكون مولد الإلصاق للعامل الرايزيسى، والشخص الموجب للعامل الرايزيسى يكون تركيبه الجيني DD (صفة نقية) أو Dd (صفة هجينة)، بينما يكون التركيب الجيني للشخص سالب العامل الرايزيسى (dd).

- مسألة محلولة :

تزوج رجل موجب العامل الرايزيسى (صفة نقية) من إمرأة موجبة العامل الرايزيسى (صفة هجينة) فما التركيب الجيني لأبنائهم؟.

ستلاحظ أن جيل الأبناء كلهم موجبي العامل الرايزيسى بنسبة ٥٠٪ يحملون الصفة النقية و ٥٠٪ يحملون الصفة الهجينة.

جيل الآباء: أب موجب نقى × أم موجبة هجينة			
Dd	×	DD	التركيب الجيني :
(D d)	×	(D D)	الأم شاج :
D	D	D D	الأبناء :
d	Dd	Dd	

(الشكل ١٥)

النشاط (١٠)

توصى إلى احتمالات توارث فصائل الدم والعامل الرايزيسى لدى الأبناء لأب فصيلة دمه (A) موجب العامل الرايزيسى (هجين) وأم فصيلة دمها سالبة العامل الرايزيسى، موضحاً نسبة كل فصيلة وعاملها الرايزيسى .(AB⁻,B⁻,A⁻,AB⁺, B⁺ , A⁺)

وللعلم فإنّه يجب مراعاة نوع العامل الرايزيسي للدم عند نقل دم شخص إلى آخر. فمثلاً عند نقل دم من شخص فصيلة دمه A موجب العامل الرايزيسي إلى شخص فصيلة دمه A سالب العامل الرايزيسي، فإنّ جسم الشخص المستقبل يبدأ بإنتاج أجسام مضادة لولد الإلصاق (Rh) مما يؤدي إلى تراكم الأجسام المضادة في دمه، وإذا تكرر نقل نفس فصيلة الدم إليه فإنّ الأجسام المضادة تعمل على تخثير خلايا الدم الحمراء في الدم المنقول إليه مما قد يتسبب في وفاته.

– ما تأثير العامل الرايزيسي على الجنين في بطن أمه؟


عند تزاوج رجل موجب العامل الرايزيسي (صفة نقية) بامرأة سالبة العامل الرايزيسي فإنّ جميع الأجنحة التي تحمل بهم الزوجة يكونون موجبي العامل الرايزيسي، وغالباً ما يولد الجنين الأول سليماً، ولكن أثناء ولادته ينتقل جزء من دمه الموجب العامل الرايزيسي إلى دم الأم السالب فيستجيب دم الأم مكوناً أجساماً مضادة، فيصبح دم الأم حاملاً لهذه الأجسام المضادة، وعندما تحمل الأم بالجنين الثاني تنتقل الأجسام المضادة من دمها إلى دم الجنين عبر المشيمة، فتعمل هذه الأجسام على إلصاق كريات الدم الحمراء في الجنين وتحليلها، فيصاب الجنين بفقر الدم وقد يؤدي إلى وفاته، وتزداد خطورة الأجسام المضادة في دم الأم على الأجنحة في مرات الحمل التالية.

وقد ساعد التقىم الطبي الحديث في إنتاج مصل تحقن به الأم سالبة العامل الرايزيسي خلال الثلاثة أيام من ولادتها للجنين، فيعمل هذا المصل على إبطال مولدات الإلصاق المتسرية إلى الأم من الجنين مما يؤدي إلى عدم تكوين أجسام مضادة في دم الأم، وأيضاً أصبح بالإمكان تغيير دم الجنين وهو في رحم أمه كحل للمشكلة.

ثالثاً : الجينات المميتة Lethal genes

مانتيجة تزاوج فأر أصفر مع انشي صفراء اللون كلاهما هجين ؟
ووجد أن اللون الأصفر في الفئران يسود على غيره من الألوان مثل اللون الأسود
لهذا تكون نتيجة النسل .

١/ أصفر نقى ، $\frac{1}{2}$ أصفر هجين ، $\frac{1}{4}$ أسود إلا أن الربع الأصفر النقى يموت غالباً
قبل الولادة أو في أطواره الجنينية الأولى وهذا راجع إلى إجتماع عاملين (جيني) اللون
الأصفر معاً مما يؤدي إلى وفاة الفأر الحامل لهما ولهذا يقل عدد الفئران الناتجة بنسبة
٢٥٪ وبهذا المثال لا بد من التنبيه إلى أن جين اللون الأصفر (Y) ذو تأثيرين فهو سائد
من حيث الشكل المظاهري ومتناهى من حيث قدرته على إحداث الوفاة أما جين اللون



الأسود (y) فهو متناهى من
حيث الشكل المظاهري وسائد
من حيث الحيوية . لذلك
نلاحظ عند اجتماع جين
اللون الأصفر Y مع جين اللون
الأسود y فإن يسود عليه
سيادة تامة وبذا يظهر الفأر
أصفر هجين Yy

أي أن نتيجة تزاوج فأر
أصفر هجين مع انشي صفراء
هجين هو شكلين مظاهريين

اصفر واسود بنسبة ٢ : ١

على الترتيب كما في الشكل (١٦)

- بماذا تفسر ظهور بادرات بيضاء اللون خالية من اليخصوصور (الكلوروفيل) بنسبة
٢٥٪ وبادرات خضراء اللون بنسبة ٧٥٪ عند زراعة بذور ذرة ناتجة من تلقيح
ذاتي لنبات ذرة أخضر اللون مع العلم بأن جين تكوين اليخصوصور سائد وحيوي
بينما جين انعدام تكوين اليخصوصور متناهى وميت .

الوراثة والجنس

للجنس دور كبير في ظهور بعض الصفات الوراثية لدى الأبناء، فللوراثة دور أساسي في تحديد جنس الوليد، كما أن كثيراً من الصفات في الأبناء ترتبط عواملها الوراثية (الجينات) بالكروموسومات الجنسية، وصفات أخرى يتأثر ظهورها أو عدم ظهورها بجنس الفرد.

أولاً : دور الوراثة في تحديد الجنس:

- ما الذي يجعل الجنين ينموا إلى ذكر أو أنثى بإرادة الله؟

- كيف يتم توارث صفات الذكورة أو الأنوثة في الإنسان؟

لقد عرفت أن كل خلية من الخلايا الجسدية في جسمك تحتوي على (٢٣) زوجاً من الكروموسومات، وأن (٢٢) زوجاً من هذه الأزواج تسمى الكروموسومات الجسدية (الذاتية) (Autosomes)، وأما الزوج الأخير فتسمى الكروموسومات الجنسية (Sex Chromosomes)، والكروموسومان الجنسيان في الإنسان هما الكروموسوم (X) والكروموسوم (Y) وقد ثبت علمياً أن الكروموسوم الجنسي (Y) هو المحدد للذكورة في الإنسان .

وقد اتضح أن هناك أنماط مختلفة من كروموسومات تحديد الجنس في الكائنات الحية المختلفة ومنها الإنسان، وهذه الإنماط هي :

١- النمط (XX - XY) ويوجد هذا النمط في الإنسان، كما عرفت سابقاً، كما يوجد في كثير من الحيوانات الأخرى مثل ذبابة الفاكهة .

٢- النمط (XX- X0) ويوجد في بعض الحشرات مثل الصرصور والنطاط، حيث يعني الرمز (0) صفراءً بمعنى عدم وجود الكروموسوم (Y) في الذكر أما الأنثى فتحتوي خلاياها على كروموسومين جنسيين هما (XX) .

٣- النمط (ZW-ZZ) ويوجد في بعض الحيوانات كالطيور والأسمك والفراسات؛ حيث تحوي خلايا الذكر فيها على كروموسومين (ZZ) بينما خلايا الأنثى تحوي كروموسومين مختلفين هما (ZW) ، وهذا يعني أن تحديد الجنس في أبناء هذه الحيوانات التي تحمل هذا النمط تحدده الأنثى (الأم) وليس الذكر كما في النمط البشري (XY) .

٤- نمط العدد الفردي أو الزوجي (n) أو (2n) من الكروموسومات: حيث وجد أن الجنس في النمل والنحل يتحدد بعدد الكروموسومات في خلية الفرد، فالأنثى


تحوي عدداً زوجياً من الكروموسومات (2n) لأنها تنتج من بيض مخصب، بينما الذكر يحوي عدداً أحادياً من الكروموسومات (n) لأنه ينتج من بيض غير مخصب.

ثانياً: توارث الصفات المرتبطة بالجنس:

لقد وجد أن كثير من الصفات الوراثية تحمل جيناتها على الكروموسومات الجنسية، لهذا تسمى صفات يرتبط توارثها بالجنس.

- ما الكروموسومات الجنسية؟

- ما هو الكروموسوم الجنسي الذي يحمل معظم الصفات المرتبطة بالجنس؟ ومن أمثلة الصفات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء في الإنسان مرتبطة بالكروموسومات الجنسية، وخاصة الكروموسوم (X)، مرض عمى الألوان الشكل ١٧، ومرض نزف أوسيولة الدم الهيموفيليا (Hemophilia) ومرض البول السكري وغيرها، وهي جميعاً صفات متنحية مسؤولة عن إظهارها جين متعدد على الكروموسوم (X). وصفة الشعر الكثيف في الأذن المرتبطة بالكروموسوم Y.




الشكل (١٧) بطاقة فحص عمى الألوان

فمثلاً يظهر عمى الألوان بين الأبناء وهو عدم القدرة على التمييز بين اللونين الأخضر والأحمر. ويمكن الكشف عن وجود المرض باستخدام البطاقة المبينة في الشكل (١٧). فالشخص الذي يرى الرقم (4) فقط في البطاقة يكون مصاباً بعمى اللون الأخضر وأما الشخص الذي يرى الرقم (2) فقط يكون مصاباً بعمى اللون الأحمر. أما الشخص الذي يستطيع قراءة الرقم (42) فيكون طبيعياً وغير مصاب بالمرض. والجدول (٣) يوضح التركيب الظاهري والتركيب الجيني للمصابين بمرض عمى الألوان وحاملي المرض والأشخاص السليمين من المرض.

- ما التركيب الجيني لأنثى مصابة بعمى الألوان؟
- ما التركيب الجيني لذكر مصاب بعمى الألوان؟

النشاط (١١)

- توصل إلى احتمالات ظهور عمي الألوان لدى الأبناء لأب مصاب وأم تحمل المرض.



الشكل (١٨) لتوارث صفة الصلع في الإنسان

تركيبيهم الجيني ($b^+ b$)، وهذا يعني أن جين الصلع يكون سائداً في حالة الذكور ويكون متمنحاً في حالة الأنثى، أي إنه لا بد من وجود الجينين (bb) في الأنثى لإظهار صفة الصلع، وهذا يفسر سبب انتشار ظاهرة الصلع بين الرجال وندرة وجود هذه الصفة بين النساء.

ادرس الشكل (١٨) ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

- ما التركيب الجيني للرجل الأصلع؟
- ما التركيب الجيني للرجل الذي لا يصاب بالصلع؟
- ما التركيب الجيني للمرأة التي تصاب بالصلع؟
- ما احتمال إصابة الرجل بالصلع؟
- ما احتمال إصابة المرأة بالصلع؟

وراثة مجموعة الجينات المترابطة


– ما المقصود بالجينات المترابطة؟

– كيف يتم توارث الجينات المترابطة؟

لقد وجد أن الجينات الواقعة على الكروموسوم الواحد والمتقاربة لا تتوزع توزيعاً حراً (حسب قانون مندل الثاني) عند تكوين الأمشاج بل تورث معاً كمجموعة واحدة تسمى المجموعة المترابطة، وقد توصل العالم مورجان (Morgan ١٨٦٦-١٩٤٥م)، أثناء دراسته لتوارث بعض الصفات في ذبابة الفاكهة إلى أن هناك نوعين من الارتباط هما:

الاربطان التام : Complete Linkage

في تجربة لدراسة توارث صفاتي لون الجسم وحجم الأجنحة في ذبابة الفاكهة؛ زواج مورجان بين أنثى من النوع البري رمادية اللون وذات أجنحة طويلة (نقية)،



وذكر أسود اللون ذي أجنحة قصيرة من النوع الناتج عن طفرة وراثية، كما في (الشكل - ١٩) ، لاحظ الناتج من أفراد الجيل الأول .
 – ما لون أجسام أفراد الجيل الأول؟
 – ما الشكل الظاهري لاجنحتها؟

الشكل (١٩) توارث صفاتي طول الأجنحة ولون الجسم في ذبابة الفاكهة عن طريق الاربطان التام للجينات.


ثم قام مورجان بإجراء تلقيح اختباري بين ذكر رمادي اللون طويل الأجنحة من أفراد الجيل الأول وأنثى سوداء قصيرة الأجنحة كما في الشكل (١٩) ولاحظ صفات اللون وطول الأجنحة بين الأبناء فوجد أن ٥٠٪ من الأفراد كانت رمادية اللون طويلة الأجنحة و ٥٠٪ منها كانت سوداء اللون وقصيرة الأجنحة (بنسبة ١:١).

– قارن بين هذه النتائج والنتائج المتوقعة تبعاً لقانون التوزيع المنديلي؟

– ما سبب ظهور الصفات بنسبة ١:١ مختلفة عن نسب قانون التوزيع الحر؟
وضع مورجان تفسيراً لهذه النتائج بأن كلاً من جين لون الجسم الرمادي وجين الأجنحة الطويلة موجود على أحد الكروموسومات، بينما توجد جينات لون الجسم الأسود والأجنحة القصيرة على الكروموسوم الآخر المقابل، ولهذا ينتقل الجينان معاً كما في الشكل (١٩).


٢- الارتباط غير التام للجينات : Incomplete Linkage

عند ما كرر العالم مورجان التلقيح الاختباري، بتزويد أنثى هجينية رمادية اللون وطويلة الأجنحة مع ذكر أسود اللون وقصير الأجنحة كما في الشكل (٢٠)، لاحظ أن النتائج كانت أيضاً مخالفة لlaw of inheritance .



- ما الأشكال الظاهرة لللون الجسم وطول الأجنحة في أفراد الجيل الأول من ذباب الفاكهة؟
- ما مدى تشابه أفراد الجيل الأول مع الأبوين؟
- لقد وجد مورجان أن نسبة الأفراد التي تشبه الأبوين في صفاتي

الشكل (٢٠) توارث لون الجسم وطول الأجنحة في ذبابات الفاكهة



الشكل (٢١) عبور الجينات بين كروموسومين متجلزرين
عند حدوث عبور مختلقة عن صفات الآبوبين على كروموسوم واحد.

ـ ما المقصود بالعبور للجينات؟

لقد لاحظ العلماء أنه بالرغم من أن الجينات الموجودة على أحد الكروموسومات تنتقل مترابطة من جيل الآباء إلى جيل الأبناء إلا أنه يحدث أحياناً انفكاك لبعض الجينات فتنتقل من الكروموسوم الذي يحملها إلى الكروموسوم المقابل له في عملية تسمى العبور كما في الشكل (٢١)، وينتج عن ذلك تغير في الصفات المرتبطة بتلك الجينات.

ـ ما أهمية العبور للكائنات الحية؟

ـ كيف تتم عملية العبور للجينات من كروموسوم إلى آخر؟

وراثة الجينات المتعددة (التراكمية)

ـ ما الذي يحدد ظهور الألوان المختلفة للجلد بين الناس؟

ـ ما العوامل التي تجعل صفة الطول متباينة بين الأشخاص؟


لقد وجد أن ظهور بعض الصفات مثل اللون والطول والوزن ودرجة الذكاء يتحكم فيها ثلاثة أزواج من الجينات على الأقل . فالشخص شديد السواد يكون تركيبه الجيني **AA BB CC** ، والشخص ذو البشرة شديدة البياض يكون تركيبه الجيني **aa bb cc** ، بينما الشخص الذي يكون تركيبه الجيني **Aa Bb Cc** فيكون لون جلده وسطاً بين اللونين الأسود والأبيض، ويقترب لون البشرة من اللون الأسود أو من اللون الأبيض بحسب عدد الجينات ذات الأحرف الكبيرة أو الجينات ذات الأحرف الصغيرة في كروموسومات الفرد.

كما وجد أن بعض الصفات يتم توارثها في النباتات عن طريق جينات متعددة مثل توارث صفة لون حبوب القمح، فالحبوب ذات اللون الأحمر يكون تركيبها الجيني

، والحبوب ذات اللون الأبيض يكون تركيبها الجيني $AA BB RR$ ، وبقية الألوان بينهما .

- كيف يتم توارث لون الجلد في الإنسان؟ لاحظ الشكل (٢٢) ثم أجب عن الأسئلة الآتية :

١ - ما نسبة عدد الأبناء شديدي البياض الناتجة من تزاوج فردان يحملان لون



الشكل (٢٢) توزيع لون الجلد بين أفراد جيل الأبناء الثاني .

لقد وجد أن سبب التباين الشديد في ألوان الناس وأوزانهم ودرجات الذكاء لديهم يعود إلى أن كل جينين متقابلين من الجينات المتعددة المسئولة عن وراثة الصفة تتحتل موقعاً على أحد الأزواج الكروموسومية، ولهذا فقد يشارك أكثر من زوج من الكروموسومات أو أكثر من موقع كروموسومي في إظهار الصفة التي تمثلها الجينات المتعددة .


تقويم الوحدة

- ١ - عرف كلاً ما يأتي : - الوراثة - الصفة - الصفة السائدة - الهجين (الخلط)
- قانون إنزال الصفات - قانون التوزيع المستقل (الحر)
- ٢ - ما الفرق بين المظهر الخارجي والتركيب الجيني للفرد ؟
- ٣ - لماذا كان مندل موفقاً في اختياره لنبات البازلاء لإجراء تجربته عليه ؟ ولماذا لا يعتبر الإنسان مادة صالحة للتجارب الوراثية ؟
- ٤ - ماذا يقصد بالتلقيح الاختباري ؟ وما أهميته ؟
- ٥ - لما يعد مرض عمى اللونين الأحمر والأخضر نادراً بين النساء ؟
- ٦ - اشرح على أساس وراثية علاقة الكروموسومات بتحديد الجنس .
- ٧ - ما هو الدور الذي يلعبه Y في الإنسان ؟
- ٨ - ما المقصود بالارتباط والعبور ؟ اشرح ذلك .
- ٩ - اشرح على أساس وراثية وراثة الصلع .
- ١٠ - ما الفرق بين صفة مرتبطة بالجنس وصفة متأثرة بالجنس ؟
- ١١ - تزوج رجل ببني العينين كان أبوه أزرق العينين بإمرأة زرقاء العينين ما هو احتمال لون عين ابنائهم ؟ إذا علمت أن اللون البني سائد على اللون الأزرق .
- ١٢ - نتيجة لقيام مندل بتجربتين نباتات بازلاء مستديرة البذور مع بعضها البعض فقد حصل على (٧٣٢٤) بذرة موزعة كالتالي : (٥٤٧٤) بذرة مستديرة الشكل و (١٨٥٠) بذرة مجعدة . وضح على أساس وراثية التركيب الجيني للأباء والأبناء ؟
- ١٣ - ينشأ اللون الأسود في حيوان الوبر عن جين سائد يرمز له بالرمز B وللون الأبيض عن جين مت recessive يرمز له بالرمز b وكذلك ينشأ الشعر الحسن عن جين سائد R والشعر الناعم عن جين مت recessive r ما هو احتمال ناتج اخصاب ذكر الوبر تركيبه الجيني BB Rr لأنثى الوبر تركيبها الجيني BbRr ؟
- ١٤ - إذا حدث تزاوج بين ذكر من الفئران أصفر اللون وأنثى صفراء اللون وكلاهما هجين كان الناتج من هذا التزاوج ففستان سوداء وصفراء بنسبة ٢:١ ، علماً بأن اللون الأصفر في الفئران سائد على غيره من الألوان . - علل ذلك على أساس وراثية .
- ١٥ - ثلاثة أطفال فصيلتهم الدموية كانت على النحو الآتي : AB, O, B وكل طفل ينتمي لعائلة مختلفة ، وكانت الزمرة الدموية لأبوي كل عائلة هي :
 - العائلة الأولى: الأب: O والأم: AB - العائلة الثانية: الأب: A والأم: A
 - العائلة الثالثة: الأب: A والأم: B (نتيجة). - هل يمكن تعين كل طفل للعائلة التي ينتمي إليها ؟

- ١٦ - تزوج رجل فصيلته الدموية **AB** من امرأة فصيلتها الدموية **O** . ما هو احتمال التركيب الجيني للأبناء؟ وهل يجوز للأب أن يسuff أبناءه بكمية من دمه؟ ووضح ذلك على أساس وراثية.
- ١٧ - أنجب زوجان أربعةأطفال فصيلة كل منهم مختلفة عن الآخر.
- ما زمرة الدم في كل من الزوج والزوجة . ووضح ذلك على أساس وراثية.
- ١٨ - امرأة فصيلتها الدموية **O** وزوجها فصيلته الدموية **AB** .
- هل يمكنهما وراثياً إنجاب طفل فصيلته الدموية **O** ؟
- ١٩ - تزوج رجل موجب بالنسبة لعامل رايزيس **Rh⁺** من امرأة سالبة لهذا العامل **Rh⁻** .
- ما التركيب الجيني للرجل بالنسبة لعامل رايزيس؟ وما نسبة احتمال أن يكون الطفل الثاني موجباً لهذا العامل؟
- ٢٠ - في نبات حنك السبع سلالتان الأولى ذات أزهار حمراء (**R**) والثانية ذات أزهار بيضاء (**W**) وبتهجين السلالتين معاً كانت جميع أفراد الجيل الأول ذات أزهار وردية اللون . وعندما هجنت أفراد الجيل الأول فيما بينها توزعت أفراد الجيل الثاني بين فئات مظهرية ثلاثة كالتالي :
 $\frac{1}{4}$ أحمر ، $\frac{1}{2}$ وردي ، $\frac{1}{4}$ أبيض .
- اعط تحليلاً لوراثة صفة لون أزهار نبات حنك السبع .
- ٢١ - تزوج رجل مصاب بعمى اللونين الأحمر والأخضر بأثنى حاملة للمرض؟
- ما هي احتمالات ظهور هذا المرض في الأبناء؟
- ٢٢ - لدى إجراء دراسة لنسب إحدى العائلات، تبين أن أنتي رؤيتها طبيعية للألوان، كان والدها مصاباً بمرض عمي الألوان وأمها طبيعية، فإذا تزوجت رجلاً رؤيته طبيعية، ما هي التراكيب الجينية المحتملة لأبنائهما؟ وما نسبة الإصابة بمرض عمي الألوان بين الذكور والإإناث؟
- ٢٣ - إذا كانت خصلة الشعر البيضاء في الإنسان صفة متمنحية مرتبطة بالجنس، فما هي احتمالات توريث هذه الصفة في الأبناء الناتجين عن زواج رجل ذي شعر عادي، بامرأة ذات خصلة بيضاء؟
- ٢٤ - استنتج نوع الجين المميت (سائد أم متمنحي) وعدد الأشكال المظهرية للأفراد الناتجة التي تعيش ونسبتها في وراثة لون الفغران ووراثة لون بادرات نبات الذرة؟

الوراثة الجزيئية Molecular Genetics

الوحدة الخامسة



أهداف الوحدة

- يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن:
- ١- تبين مكونات كلاً من الكروموسوم والجين.
 - ٢- توضح التركيب الثنائي للحمض النووي الريبيوزي منقوص الأكسجين .**DNA**
 - ٣- تصف كيفية تضاعف حمض .**DNA**
 - ٤- تصف كيفية نسخ الحمض النووي الريبيوزي .**RNA**
 - ٥- تصف خطوات بناء البروتين في الخلية.
 - ٦- تعطي أمثلة لبعض تطبيقات الوراثة الجزيئية .

الوراثة الجزيئية Molecular Genetics

عرفت أن العالم مندل هو أول من وضع أساس علم الوراثة؛ حيث أوضح أن الصفات الوراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء عبر الأمشاج الذكرية والأنثوية. وهذا الأمر ينطبق على جميع الكائنات الحية التي تتکاثر جنسياً. مستعيناً بما درسته في الوحدات السابقة، أجب عن الأسئلة الآتية:

- كيف توصل مندل إلى النتائج التي حصل عليها؟
- كيف تنتقل الصفات الوراثية عبر الأمشاج؟
- ما المقصود بالصفة السائدة والصفة المتنحية؟
- ما المقصود بالوراثة غير المنلية؟

علمت بأن مندل عندما وضع أساس علم الوراثة لم تكن هناك معلومات حول الكروموسومات والجينات. وعند اكتشافها أمكن تفسير الأساس الوراثية على ضوئها. ومع التطور المتتسارع في علم الوراثة ظهر علم الوراثة الجزيئية الذي يركز على الكروموسومات ومكوناتها من الحمض النووي والجينات. وقد ساعد هذا العلم على فهم كيفية توارث الصفات بل وكيفية توريث الصفات المرغوبة عن طريق الهندسة الوراثية.

الكروموسومات والجينات :

علمت أثناء دراستك في الصف الأول الثانوي إن الخلية الحية تحتوي على نواة توجد فيها تراكيب خيطية تسمى الكروموسومات **Chromosomes**، وإن هذه الكروموسومات تتكون من حموض نووية تحمل الجينات **Genes** المسئولة عن نقل الصفات الوراثية. وهناك نوعان من الحموض النووية في خلايا الكائنات الحية، الأول هو الحمض النووي الريبيوزي منقوص الأكسجين **DNA**.

- ما اسم الحمض النووي الآخر؟ وبماذا يرمز له؟
- ما الفرق بينه وبين الحمض **DNA**؟

وقدتمكن علماء الوراثة من معرفة دور حمض **DNA** في تركيب الكروموسومات، وأهمية هذا الحمض كمادة وراثية في الأربعينات من القرن الماضي. أما اليوم فقد أصبح بالإمكان تصنيع الحمض النووي **DNA** في اختبارات العلمية أو إجراء تعديلات عليه وإدخاله إلى خلايا حية وبالتالي تغيير خصائصها الوراثية.

يعرف العلم الذي يختص بدراسة أهمية جزيئات DNA في مختلف جوانب حياة الكائنات الحية باسم علم الوراثة الجزيئية Molecular Genetics

اكتشاف التركيب البنياني لجزيء DNA :

توصل العالم أوزوالد آفري Oswald Avery ومساعدوه (ماك كارتي، وماكلارود) عام ١٩٤٤ إلى أن الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين RNA هو المادة الوراثية في خلايا الكائن الحي. واستمرت الدراسات على هذا الحمض لسنوات عديدة إلى أن جاء اكتشاف تركيبه البنياني على يد كل من جيمس واطسونFrancis Crick وفرانسيس كريك James Watson دراسة جميع المعطيات المعروفة عن هذا الحمض، وخاصة بعد حصولهما على صورة بالأشعة السينية للحمض النووي DNA. كانت قد التققطتها روزا ليندا فرنكلين وقد توصل واطسون وكريك إلى أن للحمض النووي تركيب سلّمي مؤلف من شريط حلزوني مزدوج (الشكل ١) يتكون كل منهما من سلسلة من النيوكليوتيدات.

وتتألف كل نيوكلويوتيد ما يأتي :

أ - مجموعة فوسفات.

ب - سكر الرايبوز منقوص الأكسجين.

ج - قاعدة نيتروجينية.

وهناك أربعة أنواع من القواعد النيتروجينية تدخل في تركيب DNA، وهي كما يأتي :

١ - أدينين Adenine ويرمز له بالحرف A .

٢ - جوانين Guanine ويرمز له بالحرف G .

٣ - سايتوسين Cytosine ويرمز له بالحرف C .


٤ - ثايمين Thymine ويرمز له بالحرف T .

وتترتب القواعد النيتروجينية في شريط

على هيئة درجات السلالم الحلزوني بحيث


يرتبط C مع G بثلاثة روابط هيدروجينية كما

يرتبط T مع A برابطتين هيدروجينيتين . الشكل (١)



الشكل (١) جزء من شريط DNA المزدوج

- ما هو تعريف الجين؟ و مم يتكون؟
يمكن تعريف الجين بأنه وحدة وراثية يمثلها موقع محدد على جزيء الحمض



الشكل (٢) الجينات على شريط DNA

النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين **DNA**، وهو يتكون من سلسلة محدودة من النيوكليوتيدات، كما هو موضح في الشكل (٢).


تضاعف الحمض النووي : DNA

عرفت أن الخلية الحية حقيقية النواة تنقسم مكونة خليتين ماثلتين للخلية الأصلية، ولعلك تتذكر أن للخلية دورة تسمى دورة الخلية **Cell Cycle** تحدث خلالها تغيرات واضحة في الخلية.

- سُمّ المراحل الثلاث التي تسبق الانقسام الخطي **Mitosis**
- في أي مرحلة من المراحل الثلاث يتضاعف حمض **DNA**؟

انظر الشكل (٣) الذي يبين ميكانيكية تضاعف حمض DNA، والتي تحدث

على النحو الآتي :



الشكل (٣) تضاعف حمض DNA

١- في البداية تنفصل السرواب ط الهيدروجينية بين القواعد النيتروجينية عند نقاط معينة على **DNA** امتداد جزيء **DNA** وتسمى كل من هذه

النقاط منشأ التضاعف **Origin of Replication** ، (شكل - ٣ أ)، ويحدث ذلك بفعل بروتينات معينة وأنزيمات خاصة تسمى (هيليكيسيز) **Helicases**. وتجدر الإشارة إلى أن هناك المئات، بل الآلاف أحياناً، من نقاط منشأ التضاعف على امتداد جزيء DNA المترافق.

٢- تبدأ عملية تضاعف الحمض النووي من نقاط منشأ التضاعف العديدة وتستمر في اتجاهين متضادين على كل نقطة، وي بيان الشكل (٤) هذه العملية كما تحدث في منشأ تضاعف واحد.

٣- تستمر عملية التضاعف في جميع نقاط المنشأ إلى أن يكتمل تضاعف جزيء حمض DNA، علماً بأن عملية التضاعف تتم بفعل أنزيمات بلمرة حمض DNA



الشكل (٤) حمض DNA أثناء التضاعف

ويمثل الشكل (٤) شريطي
الحمض النووي DNA
أثناء عملية التضاعف.

ولاحظ أن شريطي الحمض النووي DNA الأصليين (باللون الأزرق) يمثلان قالبين يعمل كل منهما على بناء شريط جديد (باللون الأصفر).

النشاط (١)

- قارن تسلسل القواعد النيتروجينية على الشرطيين الجديدين بتسلسلهما على الشرطيين الأصليين. فماذا تلاحظ؟

دور حمض DNA في نقل الصفات الوراثية :

أوضحت نتائج العديد من الدراسات في الوراثة الجزيئية أن جزيء حمض DNA يحمل الشفرات التي تحتوي على التعليمات الخاصة بتركيب ووظائف مكونات الكائن الحي. إضافة إلى ذلك، توصل العلماء إلى أن هذه التعليمات تحملها حموض نووية أخرى ليتم في ضوئها بناء وتركيب المكونات المختلفة لجسم الكائن الحي مثل الحموض الأمينية في البروتينات.

- هل تذكريت اسم الحمض النووي الآخر ورمزه؟
 - كيف يمكن لحمض DNA بقواعد التيتروجينية الأربع أن يحدد تسلسل الحموض الأمينية التي يبلغ عددها عشرين في جزيء البروتين؟
لقد اتضح أن الحمض النووي الآخر الذي يقوم بهذا العمل هو الحمض النووي الريبيوزي RNA.

الحمض النووي الريبيوزي RNA :

- ما الفرق بين الحمض النووي الريبيوزي RNA والحمض النووي الريبيوزي منقوص الأكسجين DNA ؟

توصل العلماء إلى عدد من الأدلة التي تبين أن حمض RNA قد يكون له دور في ترجمة المعلومات الجينية التي يحملها جزيء حمض DNA إلى سلسلة من الحمض الأمينية ليكون منها سلسلة البروتين العديد Polypeptide ، ومن هذه الأدلة :


١- وجود حمض RNA بكثرة في سيتوبلازم الخلية ، وهو المكان الذي تصنع فيه الخلية البروتينات .

٢- وجود كميات كبيرة من حمض RNA في خلايا الأجنة النامية . ماذا تستنتج من ذلك ؟

٣- تحتوي الخلايا التي تصنع البروتينات على كميات وفيرة من الريبيوسومات ، علماً بأن الريبيوسومات تمثل ثلثي جزيء حمض RNA .

- ما دور الريبيوسومات في الخلية ؟

قدم العالم فرانسيس كريك مقتراحًا أسماه (وجهة النظر المركزية Central Dogma)



والذي يتلخص في أن حمض DNA يتضاعف ، وهو الذي يقوم بنسخ حمض mRNA ، الذي يقوم بدوره بترجمة المعلومات إلى المواد البروتينية ، ويبين الشكل (٥) مخططاً لهذا المقترن .

- ولكن ، كيف يتم نسخ حمض RNA ، وكيف تصنع الخلية البروتين ؟ إن الاختلاف الجوهرى بين حمض DNA وحمض RNA يتمثل فيما يأتي :

أ - يكون حمض DNA بهيئة شريط مزدوج حلزوني بينما يكون حمض RNA بهيئة شريط مفرد .

ب - تدخل أربعة قواعد نيتروجينية في تركيب كل منها . ثلاثة ووجهة النظر المركزية


من هذه القواعد مشتركة بينهما وهي : أدينين (A) وجوانين (G) وسايتوسين

(C) ويختلفان في القاعدة الرابعة؛ حيث تكون ثايمين (T) في DNA بينما تكون يوراسييل (U) في حمض RNA .

وهناك ثلاثة أنواع من حمض RNA في خلايا الكائنات الحية ، يتم نسخها من حمض

ويؤدي كل نوع منها دوراً معيناً في خطوات بناء البروتين في الخلية ، وهذه الأنواع هي :

- ١- الحمض النووي الريبيوزي الراسل **Messenger RNA** ويرمز له mRNA
 - ٢- الحمض النووي الريبيوزي الناقل **Transfer RNA** ويرمز له tRNA
 - ٣- الحمض النووي الريبيوزي الريبوسومي **Ribosomal RNA** ويرمز له rRNA



الشكل (٦) نسخ حمض RNA الراسل

ويبيّن الشكل (٦) كيفية نسخ حمض الراسل من حمض RNA.

قارن في هذا الشكل شريط **RNA** المستنسخ بشريط **DNA** غير الفعال في عملية النسخ من حيث نوعية القواعد النيتروجينية وسلسلتها، ماذا تلاحظ؟

يعتبر اكتشاف حمض RNA خطوة مهمة في معرفة كيفية نقل المعلومات الوراثية من الحمض النووي الريبي إلى الكائنات؟

إلا أنه ينبغي أن نتساءل كيف أن هناك أربعة قواعد نيتروجينية في الحموض النووي بينما يصل عدد الحموض الأمينية في البروتينات إلى (٢٠) حمضًا أمينيًّا. فكيف تعمل هذه القواعد النيتروجينية على تحديد هوية الحموض الأمينية ووضعها في تسلسل معين لبناء جزيء البروتين؟

— لقد ساعد اكتشاف الشيفرة الوراثية العلماء في التوصل للإجابة على هذا السؤال.

الشفرة الوراثية : The Genetic Code

إذا افترضنا أن لكل حمض أميني قاعدة نيتروجينية تحدد هويته، فإن القواعد الأربع لا تحدد أكثر من هوية أربعة حموض أمينية فقط. دعنا نفترض أن بالإمكان تحديد هوية الحمض الأميني بقاعدتين نيتروجينتين فإن هذا يعني إمكانية وجود $n = 4^2 = 16$ احتمالاً وبالتالي تحديد هوية (١٦) حمضاً أمينياً فقط. ويبين الجدول (١) الاحتمالات الستة عشر.

جدول (١) احتمالات تحديد هوية
الحمض الأميني بقاعدتين فقط

	A	G	C	U
A	AA	AG	AC	AU
G	GA	GG	GC	GU
C	CA	CG	CC	CU
U	UA	UG	UC	UU

ولكن هذا لا يكفي لتحديد هوية جميع
الحمض الأميني والبالغ عددها (٢٠) حمض
أمينياً كما ذكرنا.

ونتيجة لذلك لم يبق أمامنا سوى افتراض أن
الحمض الأميني يحتاج إلى ثلاث قواعد
نيتروجينية لتشخيصه أو لتحديد هويته (وبذلك
تكون الشيفرة ثلاثية). ويكون بالإمكان الحصول

على (٦٤=٤٣) احتمالاً في هذه الحالة.

وعليه يمكن أن يكون لمعظم
الحمض الأمينية أكثر من شفرة ثلاثية
لتحديد هويته كما هو مبين في
الشكل (٧).

وتعرف كل من الاحتمالات
الثلاثية بالشفرة الوراثية
TAT,GAC,ATT

تكون الشفرات على شكل وحدات،
ويكون لكل وحدة منها معناها الخاص
لتنتهي حمض أمينياً محدداً، كما
توجد بعض الشفرات التي تعمل على
إنهاء الرسالة المطلوب استنساخها.

الشكل (٧) قاموس الشيفرة الوراثية


وعندما تتوقف الخلية عن إضافة الحمض الأميني إلى السلسلة (Stop) كما أن
هناك شفرات تعطي إشارة البدء بالتخليق للسلسلة الببتيدية (Start).

خطوات بناء البروتين : Protein Synthesis

انظر الشكل (٨) وتتبع خطوات بناء البروتين في الخلية كما هي مرقمة في
الشكل، فجزيء البروتين في جسمك يتم بناؤه وفق الخطوات الآتية :

- ١- يتم نسخ الحمض النووي الريبوزي الراسل من حمض DNA في نواة الخلية،
وينتقل RNA الراسل إلى سيتوبلازم الخلية.
- ٢- في سيتوبلازم الخلية كل حمض أميني يرتبط بحمض نووي رايبيوزي ناقل خاص
به وذلك بمساعدة أنزيم محدد وتحتاج العملية إلى طاقة لإتمامها.

الشكل (٨)
تخليق جزيئ
البروتين




- ٣- تبدأ في الخطوة الثالثة عملية بناء سلسلة الببتيد العديد وذلك بأن يلتقي كل من حمض RNA الراسل مع أول حمض RNA ناقل ووحدة الرايبوسوم، حيث يقوم حمض RNA الناقل بقراءة الشفرة من الحمض RNA الراسل.
- ٤- تبدأ في الخطوة الرابعة عملية الاستطالة وفيها يحدث تتابع وحدات حمض RNA الناقل بالإضافة حموض أminoية جديدة إلى سلسلة الببتيد العديد المكونة، بينما يتحرك حمض RNA الراسل تباعاً خلال الرايبوسوم بمعدل حركة واحدة لكل شفرة وراثية.
- ٥- في الخطوة الخامسة يتم إنتهاء بناء السلسلة بإشارة قف، انظر (الشكل - ٨)، فينتهي بذلك بناء الببتيد العديد (جزيء البروتين).
- ٦- يتحرر جزيء البروتين المكون إلى سيتوبلازم الخلية ليبدأ وظيفته في الجسم. ويمكنك الآن من الشكل (٨) فهم توريث الصفات ومكونات جسم الإنسان حيث تتولى الجينات وشفراتها الوراثية مهمة إنتاج البروتين الذي يجعل لون العين أزرق مثلاً أو إنتاج جين جديد للدم أو تحديد لون جلد الإنسان أو طوله أو مقدار دكتانته وغير ذلك من الصفات.

تطبيقات في الوراثة الجزيئية:

لقد استفاد الإنسان من نتائج الدراسات والأبحاث على حمض DNA والوراثة، الحりيعية في عدة تطبيقات، نذكر منها ما يأتي :

- ١- **بصمة الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين DNA Finger Print**.
- لقد عرف الإنسان بصمة الأصابع وأهميتها، حيث إنها صفة مميزة لكل فرد، وتستخدم في تحديد هوية الشخص، وقد اتضح أن هناك بصمة أخرى لدى الإنسان تتعلق بحمضه النووي، فقد توصل العلماء إلى أن لكل إنسان تسلسل محدد في شريط الحمض النووي DNA في خلاياه، ويمكن أن تتشابه بعض أجزاء هذا الشريط بين الأبناء وآبائهم، وقد استفاد العلماء من هذه الحقيقة واستعملوا بصمة الـ DNA في التعرف على هوية الشخص وكذلك في إثبات أو نفي العلاقة بين الأب وابنه . فإذا ادعى أو أنكر شخص أنه أب لطفل فإنه يمكن التتحقق من ذلك باستعمال بصمة حمض DNA.




الشكل (٩) بصمة الحمض النووي

انظر إلى الشكل رقم (٩) والذي يمثل بصمة DNA لثلاثة أشخاص، أم وطفل، ورجل يزعم أنه أبو للطفل، وللحقيق من ذلك أجريت مقارنة لبصمة DNA لكل منهم. تلاحظ أن أي خط لا يتطابق مع بصمة الأم، ولكنه يتطابق مع بصمة الرجل، فإن ذلك يثبت أن الرجل أبو للطفل كما يتضح ذلك من الخطوط المعلمة باللون الأصفر.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام بصمة الحمض النووي DNA في التحقيق من هوية مجرم إذا ترك أثراً من نسيج حي من جسمه، ك قطرة دم أو شعرة مثلاً، وذلك بإعداد بصمة DNA من هذا النسيج ومقارنتها مع الأشخاص المشتبه بهم لإثبات أو نفي ارتكابهم للجريمة.

٢- علاج أو إصلاح الجينات : Gene Therapy

تمكن العلماء باستخدام تقنية الهندسة الوراثية من علاج أو إصلاح بعض أنواع الخلل التي تحدث في بعض الجينات . فإذا كان هناك شخص يعاني من مرض جيني معين يمكن تحديده وتشخيصه ، فإن بالإمكان استبدال ذلك الجين بآخر سليم ، وذلك باستنساخ الجين السليم من شخص آخر وزرعه في خلية لها القدرة على الانقسام بصورة مستمرة ، كخلايا نخاع العظم .



الشكل (١٠) علاج أو إصلاح الجينات

تتبّع كيفية إجراء هذه التقنية في الشكل (١٠) والتي أجريت لشخص لا يستطيع نخاع عظامه إنتاج أحد البروتينات الحيوية . لاحظ أن العملية تجري على النحو الآتي :

- ١- إدخال الجين السليم في فيروس غير مرض من النوع الذي يستطيع بناء حمض RNA باستعمال قالب DNA .
- ٢- إدخال الفيروس في خلية نخاع العظام .
- ٣- دخول حمض RNA الذي بناء الفيروس إلى كروموسوم الخلية .
- ٤- حقن الخلايا الحاملة للجين السليم في جسم المريض وبعد ذلك يستطيع نخاع العظم الذي تم علاجه إنتاج البروتين المطلوب .

تقويم الوحدة

١- بين العلاقة بين المكونات النووية الآتية :

- الكروموسوم .

- الحمض النووي الريبيوزي منقوص الأكسجين **DNA** .

- الجين .

٢- ضع الإنجاز الذي قام به كل عالم إزاء اسمه في الجدول الآتي :

الإنجاز	اسم العالم
	واطسون وكريلك
	روزا ليندا فرانكلين
	أوزوالد افري

٣- اذكر أسماء القواعد النيتروجينية في الحمض النووي الريبيوزي منقوص الأكسجين ورمز كل منها؟

٤- اذكر أنواع الحمض النووي الريبيوزي **RNA** .

٥- اشرح خطوات تضاعف حمض **DNA** .


٦- اشرح خطوات بناء البروتين .

٧- اعط مثلاً لبعض تطبيقات الوراثة الجزيئية .

التقانة الحيوية

Biotechnology

الوحدة السادسة



أهداف الوحدة

يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن:

- ١- توضح المقصود بالتقانة الحيوية.
- ٢- تستنتج دور الهندسة الوراثية (الجينية) في التقانة.
- ٣- تبين كيفية استخدام التقانة الحيوية في إنتاج بعض المواد الغذائية كالجبين.
- ٤- تشرح بعض طرائق إنتاج الأدوية والمضادات الحيوية باستخدام التقانة الحيوية.
- ٥- تذكر كيفية استخدام التقانة الحيوية في تحسين الإنتاج النباتي والحيواني.
- ٦- تعرف دور التقانة الحيوية في تنقية المياه العادمة في محطات معالجة الصرف الصحي.
- ٧- توضح أهمية التقانة الحيوية في التخلص من المخلفات الضارة بالبيئة.

التقانة الحيوية Biotechnology


ما المقصود بالتقانة الحيوية

لاحظ أن مفهوم التقانة الحيوية في اللغة الإنجليزية **Biotechnology** يتكون من مقطعين هم **(Bio)** ويعني حيوي و **technology**، ويعني تقانة ويقصد بمفهوم التقانة الحيوية تحويل المعارف العلمية لعلم الأحياء إلى تطبيقات عملية يستفيد منها الإنسان، في جوانب حياة المختلفة، وبمعنى آخر فإن التقانة الحيوية تعنى: كيفية استخدام الكائنات الحية أو النظم والتعليمات الحيوية في التصنيع وإنتاج مواد جديدة.

وقد بدأ الإنسان باستخدام التقانة الحيوية في إنتاج مواد جديدة منذ القدم وخاصة في صناعة بعض المواد الغذائية، كالجبنة واللبن الرائب (الزيادي)، وفي عمليات التخمر وفي صناعة الخبز.

– ما الذي يضيفه الخباز إلى عجينة الخبز؟ ولماذا؟

بالرغم من أن الإنسان يستخدم التقانة الحيوية منذ القدم فقد أدى التقدم المتتسارع في المجالات التكنولوجية والكيمياء الحيوية وعلم الحياة الجزيئي هذه الأيام إلى تطورات متلاحقة في مجال التقانة الحيوية والصناعات المتنوعة المعتمدة عليها.



شكل (١) إنتاج البنسلين

وكانت بداية الصناعات الحديثة المعتمدة على التقانة الحيوية في أيام الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨)، عندما كان الألمان بحاجة إلى الدهون النباتية لإنتاج الجليسروول اللازم لتصنيع المتفجرات، فاتجه علماؤهم إلى تخمير المنتجات النباتية بواسطة فطر الخميرة لإنتاج مواد بديلة عن الجليسروول الذي يدخل في إنتاج المتفجرات.


وكان اكتشاف البنسلين في عام ١٩٢٨م تقريباً، كمضاد حيوي يقوم بإنتاجه فطر البنسلوم، له أثر فاعل في معالجة كثير من الأمراض والالتهابات، وخطوة

هامة في تطور عمليات الاستفادة من التقانة الحيوية لمساعدة الإنسان.

- من مكتشف البنسلين؟ وكيف تم اكتشافه؟

ويتم حالياً إنتاج البنسلين بصورة تجارية في أنحاء مختلفة من العالم.

استمرت عملية التطور لإنتاج مواد مختلفة اعتماداً على التقانة الحيوية،



الشكل (٢) حمض DNA في الكائنات الحية

خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وبدأ التطور المتسارع للتقانة الحيوية منذ بداية عقد السبعينيات نتيجة لتركيز العلماء والباحثين على الحمض النووي والجينات المكونة له في الكائنات الحية، وخاصة الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا، واستخدام الهندسة الوراثية أو الجينية في إضافة أو حذف جين أو أكثر من حمض DNA للكائن الحي، حتى يمكن الاستفادة منه في صناعة منتجات متنوعة وخاصة في مجال الغذاء والأدوية كإنتاج هرمون الأنسولين وهرمون النمو مثلاً.

- مم يتكون حمض DNA؟

- كيف يتم إنتاج الحموض الأمينية؟ والبروتينات عن طريق الحموض النووية؟

الهندسة الجينية أو الوراثية :

تعد الهندسة الوراثية أو الجينية من أحدث التقنيات في مجال علوم الحياة في عصرنا الحديث. وقد بدأ العلماء تطوير هذه التقانة في السبعينيات من القرن العشرين ومنذ ذلك الوقت تطورت الهندسة الوراثية تطوراً متسارعاً، وأخذت استخدامات التقنيات الحيوية المرتبطة بها في الانتشار والاتساع في مجالات متعددة، حتى أصبحت كثير من الصناعات والمنتجات الهامة لحياة الإنسان تعتمد اعتماداً كلياً على هذه التقانة.

وتحتسب الهندسة الوراثية على علم الحياة الجزيئي Molecular Biology

الذي يعد الآن من أهم فروع علوم الحياة، ويركز على الخواص الكيميائية والفيزيائية للجزيئات التي يتكون منها الكائن الحي، بينما تهتم الهندسة الوراثية بإعادة ترتيب أو تركيب الجينات التي يتكون منها حمض DNA في الكائن الحي. وبطرق البعض على الهندسة الوراثية القبلة البيولوجية نظراً لأهميتها لحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى كونها ذات صلة قوية بنوعية الحياة الإنسانية ومستقبلها خاصة إذا أحسن استغلالها واستخدامها لما فيهفائدة الإنسان ومصلحته، فمن طريق الهندسة الوراثية يمكن تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، كما يمكن معالجة كثير من الأمراض وإنتاج أنواع متنوعة من المواد الغذائية والدوائية وغيرها.

ويعرف العلماء حالياً على دراسة الخارطة الجينية للإنسان ومحاولة التعرف على وظيفة وعمل كل جين من الجينات فيها، والتي يبلغ عددها مائة ألف جين، وقد تم الإعلان عن الغالبية العظمى من الشيفرة الوراثية.

– ما المقصود بالشيفرة الوراثية؟

لقد تم اكتشاف حوالي ٩٧٪ من الجينات في الإنسان، ولم يبق منها سوى ٣٪ يتوقع التعرف عليها قريباً. وقد وجد أن كل البشر يتلقون في ٩٩٪ من الشيفرة الوراثية في أجسامهم، (أي إن الاختلاف بينهم يمثل فقط بـ ١٪ من الشيفرة الوراثية في أجسامهم، فسبحان الخالق العظيم). وتساعد معرفة عمل كل جين ووظيفته في الإنسان في معالجة كثير من الأمراض وخاصة الأمراض الوراثية منها، فقد تم التعرف على أكثر من ٧٠٠٠ مرض وراثي يتطلع العالم إلى إمكانية معالجة الكثير منها عن طريق هندسة الجينات.

كما يركز العلماء على دراسة الجينات في الكائنات الحية المختلفة للتوصيل إلى حلول للمشكلات التي تواجه الإنسان وب بيئته. وبالفعل تمكّن العلماء من إنتاج أدوية مهمة للإنسان، مثل هرمون الأنسولين وهرمون النمو باستخدام البكتيريا، وتم تحسين إنتاج كثير من النباتات والحيوانات الهامة لغذاء الإنسان. ولا تزال الأبحاث مستمرة للتوصيل إلى معالجات جينية لكثير من المشكلات التي تواجه الإنسان وب بيئته. وتستخدم هندسة الجينات حالياً بشكل واسع في تحسين الإنتاج النباتي.

استخدام التقانة الحيوية في إنتاج الغذا :

– اذكر بعض الأطعمة التي تدخل التقانة الحيوية في إنتاجها؟

– كيف ينتج كل من الجبن واللبن الرائب (الزبادي)؟



شكل (٣) أنواع من منتجات الزبادي والجبن

يُنتج الحسين والزبادي والجبن عن طريق إضافة كمية بسيطة من حفين أو زبادي سابق إلى الحليب الجديد وتركه فترة من الوقت، ثم تتبع بعض الإجراءات المختلفة حتى يتحول الحليب إلى حفين أو زبادي أو جبن بحسب الطلب.

– ما الذي يحيويه الحفين أو الزبادي المضاف إلى الحليب؟

النشاط (١)

• نفذ النشاط الخاص بإنتاج الزبادي في كتاب الأنشطة والتجارب العملية .

إن عملية إنتاج الحفين والزبادي والجبن تتم هذه الأيام في مصانع متخصصة، حيث يتم إنتاج كميات كبيرة منها وفق طرق علمية حديثة يتم التحكم بها آلياً. والخطوات التي تتبع عادة في إنتاج الزبادي صناعياً كما يأتي :

- ١- يتم التأكيد من تعقيم كل الأواني والأدوات التي سيتم معالجة الحليب فيها لتحويله إلى زبادي.
- ٢- يحضر الحليب، بحيث يتم التحكم في نسبة المواد الدهنية والمواد البروتينية فيه بحسب رغبة المستهلك (إنتاج زبادي مع الدهون أو خالٍ من الدهون).
- ٣- يتم التأكيد من خلط الدهن جيداً في الحليب، حتى لا يجتمع وينفصل عنه أثناء عملية الإنتاج.
- ما فائدة قيام المرأة في الريف بخض الحليب لفترة طويلة من الوقت؟
- ٤- تتم بسترة الحليب.
- وضح الخطوات التي تتم بها بسترة الحليب؟
- ما أهمية عملية البسترة للحليب؟



شكل (٤) أوعية إنتاج اللبن الرائب في الريف اليمني

٥- بعد التأكيد من تعقيم الحليب وخلوه من الكائنات الحية الدقيقة، وخاصة البكتيريا الضارة، يتم إضافة مخلوط يحتوي على بكتيريا التخمر إلى الحليب. ويحتوي المخلوط عادة على بكتيريا الاستريتو كوكاس ثيرمونيلومس وبكتيريا الأكتوباسيلوس بولي بكتيريا.

- ما الدور الذي تقوم به هذه البكتيريا في عملية التخمير؟

٦- تثبيت درجة حرارة الحليب، حيث تتم عملية التخمر في أفضل حالاتها عند درجة حرارة ٤٦ درجة مئوية.

٧- تبدأ بكتيريا التخمر بتكسير سكر اللاكتوز في الحليب وتحويله إلى حمض اللاكتيك. كما في المعادلة الآتية:



— لماذا يكون مذاق الزبادي لاذعاً؟

- يعمل حمض اللاكتيك على تجميع بروتين الكازائين في الحليب وتحويل شكل الحليب إلى الشكل المكثف، حيث يتجمع بروتين الكازائين في كتلة واحدة بينما يتجمع الماء بشكل منفصل في الإناء ليتم التخلص منه ويبقى الشكل المكثف الذي يعرف بالزبادي.

٩- بعد التأكد من إنتاج الزبادي يتم تخفيف درجة الحرارة في المخج إلى ٥ درجات مئوية، لإيقاف نشاط بكتيريا التخمر عن العمل.

– ما الذي يحدث اذا استمرت البكتيريا في عملية التخمير؟

(النشاط)

– قم بزيارة مصنع لإنتاج الزبادي في منطقتك أو متى أتيحت لك فرصة لذلك .

كيف يتم إنتاج الجن؟


توصيل الإنسان إلى طريقة إنتاج الجبن من الحليب منذ مئات السنين، إذ يقوم الفلاحون ورعاة الأبقار والأغنام بإنتاج أنواع مختلفة من الجبن.
- اذكر بعض أنواع الجبن الموجودة في السوق؟



شكل (٥) أنواع من منتجات الاجبان

إن إنتاج الجبن في عصرنا الحالي يتم في مصانع متخصصة حيث ينتج في أشكال وأنواع مختلفة. وتشابه بعض خطوات إنتاج الجبن مع خطوات إنتاج الزبادي وعادة ما تتبع مصانع إنتاج الجبن الخطوات الآتية في إنتاجه:

- يتم تعقيم الأوعية والأدوات التي سيتم فيها معالجة الحليب وتحويله إلى جبن.
 - يتم تحضير الحليب والتحكم بكمية الدهن والبروتين فيه وخلطها جيداً في الحليب.
 - يعمق الحليب عن طريق البسترة.
 - تثبت درجة حرارة الحليب عند ٤٠ درجة مئوية.
 - تضاف بكتيريا التخمر إلى الحليب. وتختلف أنواع البكتيريا المضافة بحسب نوعية الجبن المراد إنتاجه. وعادة ما يضاف بكتيريا الاستريلتو كوكس وبكتيريا اللاكتوبا سيلوس والتي تسمى بكتيريا حمض اللاكتيك.
 - تعمل هذه البكتيريا على تحويل لاكتوز الحليب إلى حمض اللاكتيك كما في المعادلة الآتية :



- ٧- تضاف مجموعة من الأنزيمات، وأهمها أنزيم الكيموزين .
 - من أين يتم الحصول على أنزيم الكيموزين؟.
 - ٨- يعمل أنزيم الكيموزين على تجميع بروتين الكازائين في الحليب وتحویله إلى حالة شبه صلبة من اللبن المتاخر.
 - ٩- يتم التخلص من السائل المائي المتجمع في الإناء، ويبقى اللبن المتاخر في حالته شبه الصلبة .

- ١٠ - يعرض اللبن المتخثر إلى الضغط والتجميف للتخلص من كميات السوائل المتبقية فيه. وتكون درجة التجميف بحسب نوعية الجبن الذي يراد إنتاجه.
- ١١ - تستمر البكتيريا في إنتاج الأنزيمات الخاصة التي تعمل على تكسير البروتينات والدهون في الجبن وتحويلها إلى حموض أمينية وحموض دهنية، والتي تعطي الجبن مذاقه المتميز ونكهته المفضلة.
- وللعلم فإن أنزيم الكيموزين يتم الحصول عليه من معدة العجل الصغيرة. إلا أن التقدم العلمي في مجال التقانة الحيوية وهندسة الجينات مكن الإنسان من إنتاج هذا الأنزيم من فطر الخميرة أو من بكتيريا تسمى *Escherichia coli* بعد إضافة الجين الخاص بإنتاجه إلى الحمض النووي للفطر أو البكتيريا.

النشاط (٣)

- نفذ النشاط الخاص بإنتاج الجبن البلدي والموجود في كتاب الأنشطة.

- ما الأغذية الأخرى التي تتدخل التقانة الحيوية في إنتاجها؟
- ما المقصود بالأغذية المعدلة وراثياً؟

لقد صاحب التطور المتسارع في التقانة الحيوية وخاصة في مجال دراسة الجينات الوراثية وهندستها إنتاج أغذية معدلة وراثياً، ويتم تعديل بعض الجينات بإزالة أو إضافة جين أو أكثر في كروموسومات الكائن الحي للتخلص من صفات غير مرغوب فيها أو تحسين صفات محددة، فتحسن إنتاجيته للغذاء كماً أو نوعاً، فمثلاً استطاع العلماء تحسين إنتاج الأرز الذي يعد الطعام الرئيسي لأكثر من نصف سكان العالم عن طريق حذف أو إضافة جينات معينة في كروموسوماته، مما يساعد في إكساب الأرز صفات جيدة تساعد على تحسين الإنتاج وتوفير كميات أكبر من الأرز. وقد تمكّن العلماء عن طريق عزل جين في الأرز من إنتاج أنواع منه ذات ساقان قصيرة ولكنه أكثر إنتاجية وذات نوعية جيدة.


ويعمل العلماء في مختبرات متعددة في أنحاء العالم على دراسة جينات نباتات مختلفة، كالذرة والقطن، باستخدام تقنيات حيوية تركز على هندسة الجينات الوراثية لتتمكن من إنتاج نباتات الحاصيل القادرة على مقاومة الجفاف أو الأمراض أو زيادة



شكل (٦) النبات ذو الأوراق الكبيرة تم إنتاجه
بواسطة الهندسة الوراثية

قيمة منتجاتها الغذائية، أو تكبير أوراقها كما في الشكل (٦). ويرى العلماء أن هذه التقانة ستساعدهم على اكتشاف وظائف آلاف الجينات للنباتات المنتجة الغذاء، مما يجعل بالإمكان تحديد الجينات التي ينبغي حذفها من الكروموسومات أو إضافتها إليها،

كأن تنتقل جينات من نبات إلى آخر لتحسين إنتاجه، مثل نقل جينات من البطاطس إلى الذرة. ولهذا فإن علماء التقانة الحيوية يبشرؤن فقراء العالم بمنتجات غذائية رخيصة ولكنها تحمل قيمة غذائية عالية، إلا أن هناك معارضة قوية لاستخدام الأغذية المعدلة وراثياً خوفاً من أن يكون لها آثار ضارة على مستهلكيها.




شكل (٧) تحسين الإنتاج الحيواني

ويمكن أيضاً استخدام التقانة الحيوية في زيادة إنتاج الغذاء الحيواني، كأن يتم نقل الجينات المسئولة عن الإنتاج الوفير من الحليب من نوع من الأبقار يتميز بهذه الخاصية إلى نوع آخر يتميز بإنتاج حليب أقل، فيزيد إنتاج الحليب لديها، أو لزيادة إنتاج اللحوم فيها. وجعلها أكثر وفرة وذات نوعية جيدة.

استخدام التقانة الحيوية في إنتاج الدوا

تساهم التقانة الحيوية هذه الأيام في إحداث تطور متسارع في الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والمضادات الحيوية مقاومة الأمراض. ومنذ أن تمكن الإنسان من اكتشاف تأثير البنسلين على أنواع من البكتيريا الممرضة واستخدامه كمضاد حيوي وإنتاجه بكميات تجارية في الأربعينيات من القرن العشرين، حصل تطور كبير في




إنتاج المضادات الحيوية والهرمونات والأدوية بكميات كبيرة، وذات نوعيات فاعلة مما كان لها أكبر الأثر في مكافحة كثير من الأمراض ورفع المستوى الصحي للإنسان. لاحظ الشكل (٨) :

- ما سبب وجود منطقة خالية من البكتيريا ؟
- كيف يعمل المضاد الحيوي على الشفاء من المرض بإذن الله ؟

والمضادات الحيوية المتنوعة عبارة عن مواد كيميائية يتم إنتاجها بواسطة كائنات حية دقيقة تعمل على مقاومة البكتيريا المرضية عند دخولها جسم الإنسان، وشل حركتها ونشاطها، حتى يتم من القضاء عليها. ويكون تأثير بعض المضادات الحيوية مثل البنسلين محدوداً بينما البعض الآخر من المضادات الحيوية مثل الكلورامفينيكول يكون مدى تأثيرها واسعاً في وقف نشاط أنواع متعددة من البكتيريا المرضية. وعلى الرغم من اكتشاف ما يقرب من (٥٠٠٠) مضاد حيوي إلا أن حوالي (١٠٠) منها فقط تستخدم بفاعلية في معالجة الأمراض والتهابات البكتيريا المعدية.

ويتم إنتاج المضادات الحيوية في معامل الإنتاج المخصصة لذلك، وفقاً لشروط ومعايير محددة. فمثلاً في إنتاج البنسلين يوضع مخلوط الفطريات المكونة من فطر بنسلينيوم ناتاتوم وبنسيوليوم كريسوجننيوم في أوعية خاصة تحت ظروف محددة، مثل درجة حرارة (٢٤ درجة مئوية)، وإمداد مناسب من الأكسجين، ووسط يميل قليلاً إلى القاعدية، حيث تبدأ الفطريات في إنتاج البنسلين بعد حوالي (٣٠) ساعة ويصل أقصى حد للإنتاج بعد حوالي أربعة أيام، ثم يبدأ بالتناقص حتى يتوقف بعد حوالي ستة أيام، وبعد ذلك يتم ترشيح المخلوط لتجمیع السائل في وعاء خاص، ويكون محتواه على البنسلين الذي يتم تنقيته باتباع بعض العمليات الكيميائية، ليصبح بعد ذلك جاهزاً للاستخدام.



ومع زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تابع العلماء بحثهم عن أنواع جديدة منها تكون أكثر فاعلية. وقد بدأ الاتجاه نحو الاستعاة بهندسة الجينات وتعديل جينات بعض الكائنات الحية، بحيث تصبح هذه الكائنات الحية المعدلة جينياً قادرة على إنتاج مضادات حيوية أكثر قوة وفاعلية، وقد ساعد ذلك في إنتاج مضادات أخرى غير البنسلين، مثل الاستربتومايسين والكلورامفينيكول، وغيرها. وتستخدم تقانة هندسة الجينات الآن في إعادة تشكيل الحمض النووي (DNA) للكائنات

شكل (٩) آلية إنتاج الهرمونات بواسطة الهندسة الوراثية
الحقيقة – في إنتاج أنواع متعددة من الهرمونات، مثل هرمون النمو، وهرمون الإنسولين في خطوات محددة كما في الشكل (٩)، والذين كانا يستخلاصان في السابق من أنسجة الحيوانات. وبالنسبة لإنتاج الأنسولين فإنه يؤخذ الجين المسؤول عن بناء الهرمون وإنتاجه في جسم الإنسان من الخلية البشرية وينقل إلى الحمض النووي (DNA) في الخلية البكتيرية (كما في الشكل) ثم يتم وضع الكائنات الدقيقة في أوعية خاصة تتعرض فيها لظروف ملائمة؛ حيث تتكاثر هذه الكائنات وتنتج الهرمون المطلوب، ثم يمر الهرمون بعدة عمليات معقدة لتنقيته، وجعله جاهزاً للاستخدام، ومن أهم الهرمونات التي يتم إنتاجها بهذه الطريقة هرمون الأنسولين الذي يستخدمه مرضى السكر، وهرمون النمو الذي يستخدم لعلاج القراءة. كذلك يتم حالياً إنتاج بعض المركبات الهرمونية كالكورتيزون، والهرمونات التناسلية، كالتيستوستيرون والاسترويديون.

كما يتم إنتاج الهرمونات التي تستخدم في زيادة الإنتاج الحيواني مثل هرمون البوفرين سوماتورافين **Bovine Somatotrophin (BST)** الذي يعطى للأبقار لزيادة إنتاج الحليب منها.

استخدام التقانة الحيوية في إنتاج الوقود :


إن جهود العلماء المتواصلة في البحث عن بدائل لمصادر الطاقة المتوفرة حالياً جعلتهم يتوجهون إلى استخدام التقانة الحيوية في إنتاج أنواع من المواد والتي يمكن استخدامها وقوداً بديلاً للوقود الأحفوري (منتجات النفط والفحم) المستخدم حالياً. وقد أمكن استخدام هذه التقانة في إنتاج الكحول (الميثanol والإيثانول) والذي يمكن استخدامه كوقود لتشغيل الآلات بدلاً عن المنتجات النفطية. ويركز على استخدام المواد ذات المصدر الحيوي، كالأخشاب، ونفايات الغابات، ونفايات قصب السكر، وقشر الحبوب، وزيت الزيتون النباتي، ومخلفات المخاري، والحيوانات وبقايا الأوراق، في إنتاج الوقود منها. وقد بدأ العلماء في البرازيل في السبعينيات (١٩٧٥م) من القرن الماضي محاولاً لهم لإنتاج الكحول عن طريق استخدام فطر الخميرة في تخمير مخلفات وسيقان قصب السكر. وقد نجحوا في إنتاج كحول الإيثانول بكميات كبيرة يمكن استخدامها كوقود، وتوصلت الأبحاث في هذا الاتجاه وتم إنشاء ما يزيد عن ٤٠٠ وحدة تخمير وتقدير لإنتاج وقود الكحول، حيث يستخدم الآن بصورة الندية أو عن طريق خلطه مع البنزين وقوداً في معظم السيارات في البرازيل، كما يستخدم وقود الكحول في تشغيل الآلات في وحدات التخمير والتقطير، مما يجعل إنتاجه رخيصاً ويمكن استخدامه بصورة تجارية.

كما أنه أمكن استغلال قدرة بعض الكائنات الحية الدقيقة على تكسير مكونات المخلفات والفضلات (سواء المخلفات الصلبة أو مخلفات الصرف الصحي)، لإنتاج غاز الميثان منها والذي يمكن استخدامه كوقود في تشغيل الآلات أو المنازل.

ويتميز غاز الميثان عن الكحول في أنه لا يحتاج إلى عمليات معقدة في إنتاجه، ويتم إنتاجه بطريقة سهلة، إذ لا تحتاج عملية إنتاجه لأكثر من وعاء خاص يسمى Digester الذي يملأ بالمخلفات الآدمية، مثل المخلفات المنزلية أو مخلفات الصرف الصحي أو المخلفات الزراعية، ثم يضاف إليها خليط من أنواع محددة للبكتيريا، حيث تنشط وتقوم بعملية التنفس اللاهوائي أو التخمير للمخلفات في وعاء التخمير وينتج عنها غاز الميثان، ويتم جمع الغاز في أوعية خاصة ليستخدمة في الطبخ أو الإضاءة أو التدفئة. ويستخدم غاز الميثان الحيوي لهذه الأغراض في بلدان عديدة، مثل الهند والصين.

استخدام التقانة الحيوية في معالجة المخلفات الملوثة :

تتواصل محاولات العلماء في استخدام الكائنات الدقيقة في تحليل كثير من المخلفات والمواد الملوثة للبيئة والتخلص من أضرارها البيئية مثل: مخلفات الصرف الصحي والمخلفات البلاستيكية والمخلفات النفطية وغيرها.



شكل (١٠) إنتاج غاز الميثان من مخلفات الصرف الصحي

فبالنسبة لمخلفات المجاري فإنه يتم استخدام الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا بشكل فاعل لتحليل مخلفات الصرف الصحي في محطات معالجة مجاري مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مواد غير ضارة، بل يمكن الاستفادة منها في أغراض مختلفة، مثل الوقود. والأهم من كل ذلك أن تحليل مخلفات المجاري والصرف الصحي يساعد على تخلص البيئة

من ملوث رئيسي لها. ويتم التحليل الحيوي التخميري إما في وجود الأوكسجين أو في عدم وجوده. وتتمثل خطوات التحليل الحيوي لهذه المخلفات في عدم وجود الأكسجين، بأن يتم أولاً تجميع المخلفات في أحواض في صورة طينية بعد فصل الجزء الأكبر من الماء في أحواض أخرى، وتضاف الكائنات الحية الدقيقة إلى الأحواض التي تحوي المخلفات في شكلها شبه الصلب وترفع درجة الحرارة فيها إلى حوالي ٢٥ درجة مئوية، لتببدأ بكتيريا التحليل نشاطها الحيوي التخميري (تنفس لاهوائي)، حيث تعمل على تحويل المواد العضوية للمخلفات إلى حموض دهنية وحموض أمينية وسكريات أحادية، ثم تنشيط أنواع أخرى من البكتيريا لتحويل هذه النواتج إلى حموض عضوية ومواد كحولية، ومن ثم تنشيط أنواع أخرى من البكتيريا -*(Mo-thanogenic)* لتحويلها إلى غاز الميثان (CH_4) والماء إذ يمكن استخدام الميثان كوقود.

وفي حالة التحليل الحيوي في وجود الأكسجين، فإنه يتم تنشيط بعض الكائنات الحية الدقيقة، مثل أنواع النيتروباكتر والزوجليا والنتروسوموناس وغيرها، لتقوم بعملية أكسدة للمواد العضوية المكونة للمخلفات وتحويلها إلى مواد غير ضارة، وقد تتحول عملية التحليل في وجود الأكسجين لإنتاج أسمدة ومخصبات زراعية من مخلفات الصرف الصحي.

وبالنسبة لخلفات المواد البلاستيكية، فإن الاتجاه الآن بأن يتم الاستعانة بالكائنات الحية الدقيقة، لتقوم بعملية التحليل الحيوي للمخلفات البلاستيكية.

النشاط (٤)

ناقش مع مجموعة من زملائك طرائق التخلص من المواد البلاستيكية في منطقتك، والأضرار البيئية التي يمكن أن تنتج عن هذه الطرائق واكتب تقريراً عن ذلك يقدم للمدرس.

وبالفعل فإنه بالإمكان الآن استخدام بعض الكائنات الدقيقة، مثل فطر كلادوسبوريوم ريزاين في تحليل كثير من المخلفات البلاستيكية وخاصة الأنواع المرنة منها، مثل الأكياس والألعاب البلاستيكية، إلا أن الأنواع الصلبة مثل قطع الأثاث البلاستيكية وأواني المطبخ تحتاج إلى وقت أطول ليتم تحليلها حيوياً.

ويتم الاستعانة ببعض الكائنات الحية الدقيقة في معالجة التلوث النفطي في البحار والمحيطات والذي ينتج عن حوادث ناقلات نفط أو تسرب نفطي من الناقلات أو أنابيب التحميل في الموانئ، ويسبب هذا النوع من التلوث أضراراً كبيرة للبيئة البحرية ومكوناتها الحيوية. ويواجه الإنسان صعوبة كبيرة في التخلص من البقع النفطية التي تنتشر لمسافات كبيرة على سطح الماء. وقد اتجه العلماء إلى تطوير أنواع من الكائنات الحية الدقيقة من الفطريات، والبكتيريا عن طريق هندسة جيناتها لجعلها قادرة على تحليل البقع النفطية والتغذية عليها وتحويلها إلى مواد غير ضارة بالبيئة البحرية والكائنات الحية ومكوناتها.

كما أمكن للإنسان الآن الاعتماد على التقانة الحيوية في التخلص من المخلفات الكيميائية الخطيرة الناجمة عن الأنشطة الصناعية والزراعية للإنسان، كمخلفات مصانع الأوراق والمبيدات وما تشكله من خطورة كبيرة على البيئة ومكوناتها.



ويعمل العلماء حالياً على تطوير أنواع من الكائنات الحية الدقيقة التي يمكنها أن تنشط في وسط هذه المخلفات والعمل على تحليلها وتحويلها إلى مواد غير ضارة أو مواد قد يستفيد منها الإنسان، مثل إنتاج غاز الميثان واستخدامه كوقود.

شكل (١١) بعض الملوثات البلاستيكية

استخدام التقانة الحيوية في إنتاج بعض المواد الصناعية :


استطاع الإنسان الاستعانة ببعض الكائنات الحية الدقيقة في صناعة وإنتاج بعض المواد الضرورية لحياته، مثل الصابون والمواد المنظفة الأخرى والمواد المذيبة والمواد الداخلة في صباغة الأقمشة وتلوينها والمواد الحافظة ومبيدات الحشرات والأعشاب الضارة، إضافة إلى صناعة الأدوية والمضادات الحيوية والهرمونات والأنزيمات، وغيرها.

ويمكنك العودة إلى الوحدة السابقة (وحدة الوراثة الجزيئية) لمراجعة بعض التطبيقات للهندسة الوراثية في عالمنا المعاصر.

الاستنساخ

بعد الاستنساخ من أهم تطبيقات التقانة الحيوية وأخطرها في هذه الأيام، حيث يمكن استنساخ الكائن الحي من حيوان أو نبات. ويقصد بالاستنساخ إنتاج كائن حي من خلية جسدية لکائن حي آخر ويكون الكائن الجديد مشابه تماماً للكائن الذي أخذت منه الخلية الجسدية.

ولعلك قد سمعت عن استنساخ النعجة (دوللي) قبل عدة سنوات عندما اتبع العلماء خطوات محددة في عملية استنساخها كما هي مرقمة في الشكل (١٢). وتجري هذه الخطوات كما يأتي:



الشكل (١٢) خطوات استنساخ - النعجة دولي

- ١- وضعت خلية مأخوذة من ضرع نعجة (Dorset) في وسط غذائي فقير جداً بالمواد الغذائية وأدى تجويح الخلية إلى وقف انقساماتها وجيئناتها النشطة، مع بقاء نواتها سليمة .
- ٢- في تلك الأثناء أخذت بويضة غير مخصبة من نعجة (Black face) ثم انتزعت منها النواة بما فيها DNA، وبقيت بويضة فارغة تحوي كل المواد اللازمة للإنتاج جيني .
- ٣- وضعت الخلية الجسدية بجانب البويضة (الخلية التناسلية)، ثم أطلق نبض كهربائي حاكي النشاط الكيميائي والبيولوجي الطبيعي أثناء عملية الإخصاب، فاندمجت نواة الخلية الجسدية مكان نواة البويضة المنزوعة كأي بويضة مخصبة (لاقحة) .
- ٤- بعد حوالي ستة أيام زرع الجنين الناتج في رحم نعجة أخرى من فصيلة (Black face) .

٥- بعد فترة الحمل ولدت نعجة (Black face) نعجة من فصيلة (Dorset) أطلق عليها (دوللي) والتي تمثل في صفاتها الوراثية النعجة التي أخذت منها الخلية الجسدية.

ورغم الفوائد الكبيرة المتوقعة لعملية استنساخ الحيوان والنبات إلا أن خطورة هذه العملية تكمن في محاولة بعض العلماء استنساخ الإنسان رغم معارضة كثير من الهيئات والمجتمعات والدول لأن هناك جوانب أخلاقية مرتبطة بهذه العملية الخطيرة.

فمثلاً : دعنا نتساءل عن النتائج المستقبلية للاستنساخ؛ فهل الشخص المستنسخ ابن من أخذت منه الخلية الجسمية، أم هو أخي له؟ وإذا كانت الخلية من امرأة، فإن المولودة ستكون أنثى، فماذا يمكن اعتبار هذه المولودة إذا زرعت في رحم نفس المرأة، هل هي أبنتها أم اختها.

- ناقش أنت وزملاؤك فوائد ومضار الاستنساخ، وتوصلوا إلى استنتاجات تكتب بشكل تقرير.

قضية للبحث

تقويم الوحدة

أجب عن الأسئلة الآتية :

- ١ : عرف كلاً من التقانة الحيوية، والهندسة (الجينية) بكلمات من تعبيرك.
- ٢ : ما علاقة الهندسة الوراثية بالتقانة الحيوية؟
- ٣ : اذكر بعض الكائنات الحية التي تسهم في الإنتاج الصناعي للمواد المختلفة.
- ٤ : ما الفرق بين إنتاج البنسلين في عام ١٩٢٨ م وطريقة إنتاجه حالياً؟
- ٥ : كيف يتم إنتاج هرمون الأنسولين باستخدام التقانة الحيوية؟
- ٦ : اشرح خطوات عملية الاستنساخ في الحيوان.
- ٧ : علل ما يأتي تعليلاً علمياً دقيقاً :
 - أ - تضييف ربة البيت جزءاً من الزبادي (اللبن الرائب) إلى الحليب لإنتاج كمية جديدة من الزبادي.
 - ب - إضافة أنزيم الكيموزين إلى الحليب لإنتاج الجبن ؟
 - ح - تساهم التقانة الحيوية في معالجة المخلفات الملوثة للبيئة.
 - د - التقانة الحيوية سلاح ذو حدين.
- ٨ : اذكر بعض المنتجات الصناعية من بيئتك والتي تدخل التقانة الحيوية في إنتاجها.
- ٩ : وضح دور الكائنات الحية الدقيقة في معالجة مخلفات الصرف الصحي .
- ١٠ : اشرح الخطوات التي يمكن اتباعها لإنتاج أحد المضادات الحيوية بواسطة البكتيريا المتواجدة في الأمعاء الغليظة للإنسان .

الوحدة السابعة

البيئة ومشكلاتها



أهداف الوحدة

يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن :

- ١- توضح مراحل تطور علاقة الإنسان بالبيئة .
- ٢- تعرف على أهم المشكلات التي تتعرض لها البيئة .
- ٣- تحدد مصادر التلوث وأنواعها .
- ٤- تتوصل إلى المشكلات الناتجة عن تلوث مكونات البيئة .
- ٥- تبين أهم الموارد البيئية التي تتعرض للاستنزاف .
- ٦- تتوصل إلى بعض الحلول لمشكلات استنزاف المياه والتربة والغطاء النباتي .
- ٧- تقترح بعض المعالجات للمشكلات البيئية في بلادنا .

البيئة ومشكلاتها

– ما المقصود بالبيئة؟

– كيف تطورت علاقة الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها؟

– البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان مع بقية الكائنات الحية الأخرى ويحصل منها على ما يحتاج إليه من مقومات الحياة المختلفة كالغذاء والماء والكساء، ومصادر الطاقة المتنوعة التي تعد من أهم مقومات حياة الإنسان الحديث.

– اذكر بعض مصادر الطاقة في البيئة؟

كان النظام البيئي حتى عهد قريب متوازناً وزاخراً بعناصره الحية وغير الحية بأعداد وكثافات ثابتة ومستقرة. وقد استمر الإنسان، منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، في التفاعل مع بيئته التي يعيش فيها دون أن تحدث المشكلات التي تعاني منها البيئة هذه الأيام، ويمكن توضيح المراحل التي مر بها الإنسان في علاقته مع البيئة التي يعيش فيها كما يأتي:

١- مرحلة الجمع والالتقاط:

حيث كان يحصل على محتاجاته الغذائية عن طريق التقاط وجامع ثمار الأشجار والنباتات من البيئة التي يعيش فيها.

٢- مرحلة القنص والصيد:

وقد وصل الإنسان إلى هذه المرحلة بعد أن ابتكر بعض الأدوات من الصخور والمعظام لاستخدامها في صيد الحيوانات للحصول على غذائه أو للدفاع عن نفسه.

٣- مرحلة الرعي واستئناس الحيوانات:

وهي الفترة التي استطاع الإنسان فيها أن يستأنس بعض الحيوانات ليرعاها فيحصل منها على الغذاء وبعض حاجاته الأخرى.

٤- مرحلة الزراعة والاستقرار:

وهي الفترة التي بدأت باكتشاف الإنسان للزراعة واستصلاح الأرض لإنتاج النباتات للحصول على الغذاء وحاجاته الأخرى، ويقدر العلماء أن الإنسان بدأ زراعة الأرض قبل حوالي (١٢) ألف عام، وتعد هذه الفترة فترة الاستقرار للإنسان وظهور التجمعات السكانية وحضارات الإنسان الأولى وخاصة في مناطق تواجد الأنهر ومصادر المياه مثل: وادي الرافدين، ووادي النيل، وخزن مياه الأمطار في السدود كما الحضارات اليمنية القديمة.

٥- مرحلة الصناعة والتطورات التكنولوجية :

وهي المرحلة الحديثة التي نعيشها، وتبدأ منذ اكتشاف الإنسان للطاقة البخارية ثم اختراع آلة الاحتراق الداخلي (الآلة التي تستخدم مشتقات النفط في تشغيلها) منذ



الشكل (١) مصنع سيارات


أكثر من ٢٠٠ عام. وقد تمكّن الإنسان من خلال استخدام الآلات المبتكرة والمتقدمة باستمرار من السيطرة على البيئة ومكوناتها من حوله، والحصول على الموارد الطبيعية واستغلالها بصورة شديدة لم يسبق لها مثيل.

وقد نتج عن التطورات الصناعية والتكنولوجية المتسارعة في عصرنا الحديث كثير من المشكلات البيئية

التي لم تكن معروفة في المراحل السابقة، ومن أهم المشكلات التي تتعرض لها البيئة وتثنى من وطأتها مشكلات التلوث، ومشكلات استنزاف الموارد الطبيعية والتصحر وظاهرة الانحباس الحراري (ارتفاع درجة حرارة الجو)، وتأكل طبقة الأوزون، والأمطار الحمضية، والارتفاع الكبير في عدد سكان الأرض، وغيرها. وأهم المشكلات التي سبقت مناقشتها في هذه الوحدة ما يأتي:

مشكلات التلوث لمكونات البيئة :

يقصد بالتلوث حصول تغيير كمي، أو نوعي، في أحد مكونات البيئة من هواء وماء وترية وكائنات حية، مما يؤدي إلى خلخلة الاتزان في النظام البيئي وحدوث أضرار لهذه المكونات. فمثلاً: ارتفاع نسبة CO_2 في الهواء الجوي يعدّ تغيراً كمياً لأن هذا الغاز موجود في النظام البيئي بنسبة ثابتة، إلا أن انبعاثه من المصانع وعواdm السيارات والحرائق أدى إلى الارتفاع المستمر في كميته في الهواء الجوي، مما جعله أحد الملوثات للبيئة. بينما تعدّ المواد الكيميائية التي ابتكرها الإنسان حديثاً مثل المبيدات الحشرية والمخلفات البلاستيكية، من الملوثات النوعية للبيئة ومكوناتها لأنها مواد جديدة لم تعرفها البيئة من قبل. وتلوثات البيئة قد تكون ذات مصدر صناعي أو مصدر طبيعي كما هو موضح في الشكل (٢) الآتي:



وهذه الملوثات إما أن تلوث الهواء أو الماء أو التربة أو الغذاء وذلك كما يأتي :

أولاً : ملوثات الهواء Air Pollution

وأهم الغازات التي تلوث الهواء هي :

١- أكسيد الكبريت والنيتروجين.

يحتوي الوقود كمشتقات النفط والفحم الحجري، على الكبريت والنيتروجين، وعندما يحترق في آلات المصنع أو السيارات تنطلق إلى الهواء أكسيد الكبريت مثل SO_2 وأكسيد النيتروجين مثل NO_2 .
لاحظ (الشكل - ٣).



الشكل (٣) انطلاق الأكسيد من مدخن المصانع

– ما تأثيرات أكسيد الكبريت؟

تتمثل تأثيرات أكسيد الكبريت مثل ثاني أكسيد الكبريت SO_2 بما يأتي :

أ – زيادة معدلات أمراض الجهاز التنفسي مثل (الربو المزمن – الالتهاب الرئوي – انتفاخ الرئة).

ب – إزالة مادة الكلوروفيل (اللون الأخضر) من أوراق النباتات و يؤدي ذلك إلى خفض معدل عملية البناء الضوئي فيها.

ج – يتحول SO_2 في الجو إلى SO_3 في وجود الأشعة الشمسية، ويتحول هذا الأخير إلى جزيئات سائلة دقيقة من حمض H_2SO_4 الذي يؤثر على الجهاز التنفسي في الإنسان، ويخالط مع ماء المطر على شكل مطر حمضي، وتأتي خطورة هذا



الشكل (٤) تأثير المطر الحمضي على الأشجار

المطر عندما ينتقل في الهواء بعيداً عن مصدره ليسقط في مناطق مختلفة مسبباً مشكلات كبيرة مثل:

١- إتلاف الغابات والنباتات.

الشكل (٤) .

٢- الإضرار بمواد البناء والهيكل المعدنية والآثار.

٣- تهديد حياة الأحياء المائية في الأنهر والبحيرات.

ولأكسيد النيتروجين تأثيرات ضارة و مشابهة لتأثيرات أكسيد الكبريت مثل:

أ – إعاقة نمو النبات وانخفاض محصوله من الشمار.

ب – زيادة معدلات الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية التنفسي خاصة بين الأطفال وتلاميذ المدارس.

ج – يسهم NO_2 مع الهيدروكربونات في وجود الأشعة الشمسية لتشكيل الضباب الدخاني الملحوظ في ساعة الصباح الباكر في المدن الكبرى.

د – ارتفاع معدلات نسبة NO_2 يؤدي إلى تأثيرات مماثلة لغاز ثاني أكسيد الكبريت.

كيف يختلف معدل انبعاث أكسيد الكبريت عن معدل أكسيد النيتروجين من مصادر التلوث المختلفة؟

تمنع المجدول الآتي الذي يبين اختلافات معدل كمية الغازات المنشعة من مصادرها،

النسبة المئوية المساهمة	المصدر
أكسيد النيتروجين	ثاني أكسيد الكبريت
45	1
37	71
12	19
3	5
3	4

ولاحظ إسهام ثاني أكسيد الكبريت تقل في نواتج الصناعة بينما يزيد معدل تكوني أكسيد النيتروجين من استخدام محرّكات المركبات.

٢- أكسيد الكربون : وتشمل الأكسيد الآتية:

أ- ثانوي أكسيد الكربون CO_2 .

- ما مصدر ثاني أكسيد الكربون؟

ينتج ثاني أكسيد الكربون من عملية تنفس الكائنات الحية، ومن احتراق الوقود الأحفوري في المصانع والمركبات، وينتج أيضاً من احتراق الغابات. ومن التأثيرات الناتجة عن ارتفاع معدل CO_2 في الهواء الجوي ما يأتي:

- يؤثر التركيز العالي منه على نسبة الأوكسجين في الأماكن قليلة التهوية مما قد يؤدي إلى الاختناق.

- يؤدي زيادة نسبة CO_2 في الغلاف الجوي إلى تغير في الأحوال الجوية، وارتفاع درجة الحرارة في الجو نتيجة لقدرته على تكوين غلاف محاط بالأرض يمنع خروج حرارة الأرض أثناء الليل، وهي الظاهرة المعروفة بـ(الانحباس الحراري).

- قد ينتج عن الزيادة العالية منه ظواهر طبيعية خطيرة مثل ارتفاع منسوب البحار.

ب- أول أكسيد الكربون CO .

ينبعث أول أكسيد الكربون من السيارات وآلات الاحتراق الداخلي الأخرى نتيجة الاحتراق غير الكامل للوقود، ويعتبر أشد الملوثات سمية لأنه يتتحد مع هيموجلوبين الدم مكوناً كاربوكتسي هيموجلوبين، وهذا الأخير يتميز بعدم قدرته على الاتخاد مع الأوكسجين مما قد يؤدي إلى الوفاة.

وقد وجد أن اتحاد الهيموجلوبين بأول أكسيد الكربون أشد من اتحاده بالأوكسجين بنحو (٢٥٠) مرة مما يؤدي إلى نقص إمداد الجسم بالأوكسجين اللازم له،

ويضطر القلب إلى رفع معدل نبضاته، وكذلك الجهاز التنفسي، وهذا يؤدي إلى توتر وإجهاد شديدين، وينتج عن ذلك أمراض القلب والصدر، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي وفقر الدم.

٣- المركبات الهيدروكربونية:

تبعد هذه المركبات أثناء الاحتراق غير الكامل للوقود في المصنع والمركبات وتبخر المواد البترولية. ومن هذه المواد الميثان CH_4 والإيثان C_2H_6 والإيثيلين C_2H_4 والبنزوبيرين Benzoperene .

– ما تأثير المواد الهيدروكربونية؟

تكمم خطورة هذه المواد فيما يأتي:

أ – تشتراك في تكوين الضباب الدخاني (Smog).

ب – يعمل الإيثيلين على تكوين مادة الفورمالدهايد المهيجه للدموع.

ج – تؤكد أبحاث العلماء أن مركب البنزوبيرين Benzoperene أهم المواد المسيبة للسرطان.

وينتج مركب البنزوبيرين نتيجة لأنشطة مختلفة للإنسان مثل:

– الاحتراق غير الكامل للغاز.

– نيران الزيوت البترولية.

– صناعة المطاط.

– دخان السجائر.

• ابحث في موضوع تأثيرات التدخين الضارة على الفرد والبيئة.

قافية للبحث

٤- الجسيمات:

يحمل الهواء أجساماً صلبة أو سائلة مثل الغبار، والدخان (Smog)، والضباب، السنаж . ما طبيعة هذه الجسيمات ، وما تأثيراتها؟
ادرس الجدول (٢) وتعرف على ذلك ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:

جدول (٢)

الجسيمات	طبيعتها	تأثيراتها
الغبار الساقط	- قطرها يزيد عن ١٠ ملليميكرون.	<ul style="list-style-type: none"> - تحدث ضرراً على المنشآت والأبنية. - تعمل على إغلاق ثغور النباتات فتعيق ثبات الغازات. - ذات تأثير خفيف على الإنسان.
الغبار المعلق	<ul style="list-style-type: none"> - يتراوح قطرها بين ١٠ - ١٠٠ ملليميكرون. - تسبب التهاب الشعب الهوائية والانتفاخ الرئوي . - تؤدي إلى ارتفاع نسبة أمراض الصدر في سكان المناطق الحبيطة بمصانع الأسمدة خاصة مرض السيليليكوز الذي يحدث تلفاً رئوياً وألمًا صدرياً وضيقاً للتنفس. - تترسب على مياسم الأزهار فتعيق جزيئاته عملية الإخصاب . 	
السناج	<ul style="list-style-type: none"> - يضاف على الوقود على هيئة رابع إيشيل الرصاص . - ينبعث من عوادم السيارات على شكل جزيئات دقيقة . - تشكل ٩٧٪ من الرصاص في الجو. 	<ul style="list-style-type: none"> - له صفة سمية وتراكمية في الأنسجة. - يسبب صداعاً وضعفاً عاماً. - أحد أسباب التخلف العقلي وانخفاض مستوى الذكاء. - ذو علاقة تراكمية في الأغشية الجنينية وحالة التشوه الخلقي كالصمم، والعمى، وبعض الأمراض العصبية.

- بماذا تفسر التأثير الضار للغبار الساقط على الأجسام؟
- ماذا يترب عن تساقط الغبار المعلق على الأزهار في النبات؟
- وبينتج عن الجسيمات المعلقة في الهواء الجوي بعض الظواهر التي تشكل خطورة على الحياة مثل الانعكاس الحراري .
- ما المقصود بالانعكاس الحراري؟

تحدث عملية الانعكاس الحراري عندما تعلو طبقة من الهواء الدافئ طبقة من الهواء البارد؛ حيث إن الوضع الطبيعي هو انخفاض درجات الحرارة التي تقل بالارتفاع، ويترب على الانعكاس الحراري احتجاز الضباب الدخاني دون تبدد في طبقة الهواء القريبة من سطح الأرض ويتركز أو يبقى الهواء ساكناً مما يترب عليه ازدياد تلوثه وانعدام الرؤية أحياناً وينعكس ذلك على الجهاز التنفسي. وقد حدثت حالات الانعكاس الحراري في الأربعينيات والخمسينيات في بعض المدن الصناعية الكبرى، مثل لندن ونيويورك، أدت إلى موتآلاف الأشخاص.

التحكم في ملوثات الهواء Control of Air Pollution

هناك العديد من الوسائل التي يمكن بواسطتها التخلص من ملوثات الهواء الجوي أو على الأقل تخفيضها إلى حدود مناسبة، ومن هذه الطرق ما يأتي :


- ١- استخدام مصادر طاقة أفضل من الوقود الحالي مثل الطاقة الشمسية والكهرباء والغاز الطبيعي.
- ٢- استعمال الوسائل والأجهزة الخاصة بتنظيف الهواء والتقليل من مصادر تلویثه مثل:
 - أ - استخدام المرشحات لحجز المواد الصلبة من مداخن المصانع وأنابيب إخراج عوادم السيارات .
 - ب- إخراج الملوثات الصلبة في غرف متعددة لتقليل سرعتها وترسيبها بتأثير الجاذبية الأرضية .
 - ج- حرق الغازات قبل انتلاقها في الوسط المحيط .
 - د - إذابة الغازات الملوثة في الماء أو بعض المحاليل الكيميائية قبل إخراجها إلى الهواء الجوي .
 - هـ- إجراء تعديلات على المحركات لتحقيق الاحتراق الكامل .
 - و - صيانة المحركات بصفة دورية .

تطبق كثيرون من الدول بعض الإجراءات للحفاظ على سلامة الهواء. ابحث ذلك في ضوء دراستك السابقة، ووضع بعض المقترنات للحفاظ على الهواء من التلوث مع دعم ذلك باقتراحات لازمة لتقليل تلوث الهواء في منطقتك.

قضية
للبحث

ثانياً: تلوث الماء Water Pollution

الماء أساس الحياة لجميع أنواع الكائنات الحية من إنسان أو حيوان أو نبات تصديقاً لقوله تعالى : ﴿ وَحَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ ...﴾ (الأنبياء: ٣٠) ، فالماء يدخل في بناء أجسام الكائنات الحية، كما يعتبر وسطاً هاماً لكل التفاعلات التي تحدث في جسم الكائن الحي، كما أنه يعد مكاناً مناسباً لحياة العديد من أنواع الكائنات الحية التي تعيش في البحار والخليطات والأنهار والبحيرات وغيرها، إلا أنه في هذه الأيام أصبح يتعرض للملوثات المختلفة.



مصادر تلوث المياه:

- ما مصادر تلوث المياه؟

يتعرض الماء إلى ملوثات مختلفة مثل الملوثات العضوية والحيوية (كائنات حية مسببة للمرض)، إضافة إلى المواد المترسبة والتلوث الحراري والإشعاعي وغيرها. لاحظ الشكل (٥).

وأهم مصادر التلوث للمياه ما يأتي :

١- مياه المجاري والصرف الصحي وما تحويه من مخلفات المنازل والمدارس والمعامل والمؤسسات والمصانع،

وجميعها تحتوي على مركبات عضوية قابلة للتحلل، إضافة إلى العوامل الممرضة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والديدان الخيطية وغيرها.

٢- المواد الكيميائية والمياه الناتجة عن الأنشطة الصناعية المختلفة والتي قد تكون ناتجة عن صناعات عضوية مثل صناعة الدواء والجلود والأقمشة، أو الناتجة عن الصناعة غير العضوية مثل الكسارات ومناشير قطع الأحجار.

٣- المخلفات النفطية والبترولية والتي ينتج عنها نفايات سامة تلوث البحار والخليطات وغيرها من مصادر المياه.

٤- الأمطار الحمضية التي تنتج في المناطق الصناعية.

٥- الاستخدام العشوائي للأسمدة والمبادات، وخاصة التي يدخل في صناعتها الزئبق الذي يعد من العناصر السامة؛ لأن المواد التي يدخل في صناعتها هذا العنصر قد تنتقل إلى المياه الجوفية فتلويتها.

٦- التلوث الحراري الناتج عن استعمال المياه كمصدر للطاقة في محطات الكهرباء التي تدار بواسطة البخار أو الطاقة الذرية، أو استعمال المياه في تشغيل المعامل والمصانع في الأوساط المائية وجميعها تعمل على رفع درجة حرارة الماء فتقل نسبة الأكسجين المذاب فيه مما يؤثر على حياة الكائنات الحية التي تعيش فيه كالأولياء



الشكل (٦) تأثير الملوثات على النباتات

والطحالب والأسماك، ويشكل ذلك تهديداً مباشراً للحياة في المحيطات المائية، وقد يؤدي إما إلى وفاة الأحياء المائية، أو وقف تكاثرها أو هجرتها، وينتتج عنه في النهاية تدمير هذا النظام البيئي وموت ما فيه من حيوان ونبات كما في الشكل (٦).

- ما المقصود بالنظام البيئي؟
- كيف تكون البيئة المائية نظاماً بيئياً متزناً؟
- ومن الملوثات التي تؤثر بشكل كبير على البيئة المائية الملوثات النفطية.

- تأثيرات التلوث النفطي :

يحدث تلوث مياه البحار والمحيطات بالنفط

بسبب غرق السفن المحملة بالنفط الذي يطفو على سطح الماء ويكون طبقة رقيقة تعمل على عزل المياه عن الغلاف الجوي، ومنع التبادل الغازي بينهما، مما

يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين المذاب في الماء. وقد يُغطى طن واحد من النفط ١٢ كم^٢، ويؤدي ذلك إلى قتل العديد من الكائنات المائية (الشكل - ٧)، كما يجعل هذه المياه غير صالحة للاستعمال. ويقضي هذا التلوث على مصدر مهم من مصادر غذاء الإنسان.

وتتلوث مياه البحار والمحيطات أيضاً بالعناصر الثقيلة مثل الرصاص الموجود في وقود وسائل النقل البحري، أو بالزئبق والزرنيخ



الشكل (٧) تأثير التلوث النفطي
على الحيوانات

والحديد والنحاس والخارصين، وجميعها تؤثر على الأحياء البحرية وتترسب في أجسامها مما يؤدي إلى القضاء عليها، أو نقل تأثيرات هذه المعادن إلى الإنسان الذي يتغذى عليها. كما تتلوث المياه بمواد المشعة الناتجة عن تجربة التجارب النووية أو الكوارث المرتبطة بالمفاعلات النووية أو المخلفات المشعة وغيرها.

- تلوث المياه الجوفية :

تعتبر المياه الجوفية المصدر الأساسي لمياه الشرب إلا أنها في الآونة الأخيرة " وخاصة في بلادنا " تتعرض لمشكلات مختلفة أهمها الاستنزاف والتلوث . ومن مصادر تلوث المياه الجوفية ما يأتي :

- ١- المخلفات البشرية والصناعية .
- ٢- الزيوت العادمة الناتجة عن وسائل النقل .
- ٣- الممارسات الزراعية الخاطئة وغير المنظمة كالاستعمال العشوائي للأسمدة الكيميائية والمبيدات ؛ لأن الأسمدة النيتروجينية تؤدي إلى زيادة النترات في المياه الجوفية التي قد تحول بفعل بعض أنواع البكتيريا إلى أملاح نترات سامة جداً .

- حماية المياه من التلوث :

إن حماية المياه من التلوث شرط أساسي للمحافظة على سلامة الكائنات الحية النباتية والحيوانية بما فيها الإنسان . ومن أجل ضمان عدم تلوث المياه يجب عمل الآتي :

- ١- معالجة مياه المجاري قبل إعادتها إلى مصادر المياه ؛ لأن هذه المياه وما تحويه من فضلات ومخلفات بشرية تلوث المياه الجوفية وينتج عنها كثیر من الأمراض مثل التيفوئيد والتهابات الكبد المعدية والطفيليات .
- ٢- معالجة مياه المصانع الكيميائية والمصافي ؛ كمصفاة تكرير البترول ، للتخلص من النفايات السامة قبل طرحها في مياه البحار ، للمحافظة على سلامة الأحياء البحرية من نبات وحيوان ، وكذا قبل طرحها في التربة للمحافظة على المياه الجوفية من التلوث .

ثالثاً : التلوث الضوضائي Noise Pollution

يُعد الضجيج في الوقت الحاضر أحد أشكال التلوث الفيزيائي الذي يتعرض له الإنسان ، خصوصاً سكان المدن الذين يعانون منه في المسكن والطريق وأثناء العمل . والضجيج عبارة عن ازدحام وحدة الأصوات التي ترعرع الإنسان وتضر سمعه وجهازه العصبي .

- ما مصادر الضجيج؟

للضجيج مصادر مختلفة منها ما يرتبط بأنشطة الإنسان، ومنها ما يرتبط بمصادر طبيعية. إلا أن مصادر الضجيج المرتبطة بالإنسان هي السبب الرئيس لهذه المشكلات في هذه الأيام. ويمكن توضيح هذه المصادر كما يأتي:

أ- عوامل النشاط الإنساني:

يعتبر النشاط الإنساني في الحالات المختلفة عاملًا رئيسيًّا في زيادة مشكلة الضجيج وتلوث البيئة به. ومن مصادر الضجيج الناجمة عن عوامل النشاط الإنساني ما يأتي:

١- المصنع والمعامل مثل مصانع الطوب والبلاط، ومناسير الحجارة وورش الحدادة والألمونيوم، والنحارة والخراطة، وورش صيانة السيارات المنتشرة في الأحياء السكنية ووسط المدن بسبب التخطيط العشوائي وغياب إنشاء المناطق الصناعية بعيدة عن المدن.

٢- وسائل النقل مثل الدراجات النارية والسيارات والطائرات، نتيجة لعدم الاهتمام بالصيانة السليمة لها، ومرور طرق المواصلات الرئيسية وسط الأحياء السكنية، وعند استخدام المبهات بطريقة غير سليمة.

٣- عملية البناء والتشييد العمراني نتيجة استخدام الآلات والمعدات الثقيلة الخاصة بتشييد البناء.

٤- الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل مثل المكنسة الكهربائية والراديو والتلفزيون .. إلخ.

٥- مكبرات الصوت والمسجلات في محلات بيع أشرطة الموسيقى والفيديو، وكذا المستخدمة في المناسبات والحفلات الموسيقية الصاخبة مثل حفلات الزفاف.

٦- التفجيرات أثناء الحروب أو في الأعمال الإنسانية أثناء السلم.

ب- عوامل طبيعية:

قد تصدر الضوضاء من عوامل طبيعية مثل الانفجارات البركانية، والرعد، والزلزال، وأمواج البحر العالية، وغيرها. إلا أن العوامل المرتبطة بأنشطة الإنسان هي المصدر الرئيس لهذه المشكلة في هذا العصر.

الآثار المترتبة على الضجيج:

- ما التأثيرات الناجمة عن الضوضاء؟

الضجيج العالي يؤثر سلبًا على الحالة النفسية للإنسان، وعلى الأداء الوظيفي للجسم عند تعرضه لأصوات عالية تزيد شدتها عن (٩٠) ديسيلل لفترة طويلة من الزمن

وأحياناً لفترات قصيرة.

وتظهر تأثيرات هذا الضجيج على الإنسان بعدة صور منها:

- ١- التأثيرات النفسية، وتظهر على شكل اكتئاب وقلق نفسيين يحدان من قدرة الإنسان على التركيز والإنتاج.



الشكل (٨) الضجيج يحيط بالإنسان

- ٢- التأثيرات العصبية، تظهر على شكل توتر عصبي، وقد يشكو البعض من آثار الضجيج الذي يعانون منه في مكان العمل والذي يستمر تأثيره من بعد مغادرتهم العمل لمنازلهم على شكل طنين مستمر.

- ٣- التأثيرات على السمع، إذ يؤدي الضجيج المستمر - في حالة عدم توفر الحماية

الكاملة للأذن - إلى تدهور تدريجي في حاسة السمع قد يصل إلى الصمم التام (فقدان السمع)، كما تؤدي الانفجارات إلى توليد أصوات شديدة تزيد شدتها عن (١١٥) ديسibel تعمل على تمزيق غشاء الطبقة، والإصابة بفقدان السمع.

مكافحة الضجيج :


تهدف مكافحة الضجيج إلى التوصل لأقل مستوى منه عبر اتباع أفضل الوسائل الممكنة، أو اتخاذ الإجراءات الالزمة للحد منه مثل الآتي:

- ١- تحطيط المدن الصناعية وبناء المدارس والمستشفيات في أماكن بعيدة عن الأسواق والأماكن العامة الأخرى لحمايتها من الضجيج، مع وضع الإرشادات المناسبة بجانبها، وخاصة التي تمنع استخدام المنبهات الخاصة بوسائل النقل والمحددة للسرعة وأماكن عبور المشاة.

- ٢- إبعاد المطارات عن المدن الرئيسية.

- ٣- إخراج المصانع والورش من الأحياء السكنية داخل المدن إلى مناطق صناعية منعزلة وبعيدة عن المساكن.

- ٤- نشر الوعي الشعافي عن الضجيج وتأثيراته بين المواطنين بطريقة تكفل منع خروج الضجيج الناتج عن الأجهزة الكهربائية من المنازل والحد من استخدام مكبرات الصوت والمسجلات بشكل مزعج في محلات بيع وشراء الأشرطة المسجلة وأنباء المناسبات والحفلات، وخاصة حفلات الزفاف.




الشكل (٩) صورة لتفجير نووي في صحراء

رابعاً: التلوث الإشعاعي:

يعتبر التلوث الإشعاعي أخطر أنواع التلوث على الإطلاق وذلك لبقاءه في البيئة لفترة زمنية طويلة جداً، وينتج التلوث الإشعاعي من مصادر طبيعية وصناعية الشكل (٩) كما يأتي :

أ- مصادر طبيعية:

تعرضت الكائنات الحية - بما فيها الإنسان - منذ بداية الحياة إلى الإشعاعات الكونية الطبيعية وإشعاعات القشرة الأرضية والإشعاعات الذاتية أو الشخصية للكائن الحي، وقد تأقلمت الكائنات الحية مع بعض الإشعاعات ذات التركيز المنخفض، بينما أحدثت بعض الإشعاعات طفرات في جميع أنواع الكائنات الحية.



الشكل (١٠) تخلف اليد ١٣١ عن سباق التفجيرات النووية بين الدول المتقدمة.

تصل الإشعاعات الكونية إما من الفضاء الخارجي، أو من البيئة المحيطة بالإنسان، في أشكال مختلفة كالبروتونات وأشعة الفا والإلكترونات .. إلخ، وتنتج من :

- ١- اصطدام جزيئات دقيقة ذات طاقة مرتفعة مع مكونات الغلاف الجوي.
- ٢- الانفجارات الشمسية .
- ٣- إشعاعات القشرة الأرضية.
- ٤- الإشعاعات الصادرة عن الغذاء والماء والهواء من مواد ضرورية لحياة الإنسان،

فالكربون (١٤) المشع يؤثر على الإنسان أثناء تغذيته على النبات، والبوتاسيوم (٤٠) عند تناوله منتجات الألبان. وتأثير هذه الإشعاعات على الإنسان من الداخل وخاصة على نخاع العظام والرئتين.

بـ- مصادر صناعية:

الإشعاعات الناتجة عن الأنشطة الصناعية للإنسان أصبحت منذ بداية الأربعينات مصدراً لتلوث البيئة، وتشكل خطراً على صحة الإنسان وحياته إلى جانب الإشعاعات الطبيعية، وبذا ازدادت كمية الإشعاعات التي يتعرض لها الإنسان اليوم.

وتنتج الإشعاعات الصناعية من عدة مصادر منها:

- ١ـ التفجيرات النووية، وهي أكثر المصادر خطراً على البيئة، فكل تفجير نووي يؤدي إلى زيادة تلوث عناصر البيئة الأرضية مثل: الماء والهواء والسلال الغذائية، والتي تسبب بدورها تلوثاً داخلياً وخارجياً للإنسان. (الشكلان - ٩ ، ١٠).
- ٢ـ المفاعلات النووية التي تستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية.
- ٣ـ الأشعة المستخدمة في الطب في عملية التشخيص والعلاج والتي يتعرض لها المريض والفنيون.

٤ـ الإشعاعات الناتجة من استعمال المواد المشعة في بعض الأبحاث والدراسات في مجال الفيزياء والكيمياء والأحياء والطب والزراعة، إضافة إلى استخدام بعض الإشعاعات مثل: أشعة جاما – في حفظ الأغذية كاللحوم والأسماك والفاكه، كما تدخل الإشعاعات في عدد من المجالات الصناعية مثل اكتشاف عيوب صناعة المعادن وصقلها، وفي قياس مقدار التسرب في أنابيب النفط.

الآثار الصحية للإشعاعات:

تؤثر الإشعاعات التي تصل إلى البيئة على الكائنات الحية بما فيها الإنسان، ويعتمد تأثيرها على عدد من العوامل أهمها:

- ١ـ نوعية الكائن الحي.
- ٢ـ درجة الإشعاع.
- ٣ـ الفترة الزمنية التي يتعرض لها الكائن.

إن تأثير الإشعاعات على الكائنات الحية في مرحلة الطفولة أكثر من تأثيرها في المراحل الأخرى نظراً للنشاط الكبير للخلايا أثناء مرحلة الطفولة.

ومن أشهر تأثيرات الأشعة على الإنسان ما يأتي:

- ١- أمراض الأعضاء المكونة للدم مثل سرطان خلايا الدم البيضاء الذي يؤدي إلى سرطان الدم (اللوكيومياء)، وضعف المقاومة للأمراض .
- ٢- أمراض الغدد التناسلية التي تؤدي إلى العقم .
- ٣- أمراض الجلد .
- ٤- أمراض الجهاز الهضمي، وجميعها تؤدي إلى الهرم والموت المبكر.

خامساً: ملوثات الغذاء:

يتعرض الغذاء الذي يتناوله الإنسان إلى أنواع مختلفة من الملوثات، فقد يتعرض إلى ملوثات كيميائية مثل المبيدات الحشرية والمواد الحافظة، أو حيوية مثل تلوث الغذاء بالبكتيريا والفيروسات والديدان، أو ملوثات إشعاعية مضرة بالإنسان. ويمكن توضيح أهم الملوثات التي يتعرض لها الغذاء فيما يأتي :

١- تلوث الغذاء باليكروبات والطفيليات :

تتلوي الماء الغذائية بالملوثات الحيوية بواسطة المياه أو الهواء أو الحشرات أثناء إنتاجها وتصنيعها، أو أثناء إعدادها للاستهلاك، أو عند استخدام مياه المجاري (الملوحة) في سقي الخضروات. وأهم الملوثات الحيوية ما يأتي :

- أ - الفطريات : وهذه تفرز سمواً شديدة الضرر، وتلوث الماء الغذائية أثناء الحصاد والتخزين وخاصة عند توفر الرطوبة في مخازن الغلال والحبوب، ومن هذه الفطريات فطر النسيروم، وفطر الفيوزاريوم. لذا يجب أن تكون مخازن الحبوب خالية من الرطوبة حتى لا تنمو الفطريات.

ب - البكتيريا : تفرز البكتيريا بعض السموم التي تلوث الماء الغذائية، وخاصة اللحوم والبيض، وقد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم إسعاف المريض بسرعة ومعالجته، وأهم هذه البكتيريا السالمونيلا *Shigella* *Salmonella* والشيجلا *Clostridium botulinum*، وقد يكون تلوث الغذاء بالبكتيريا وبائيًا، وينتج عنه أمراض مثل التيفوئيد، والدوستاريا العصوية، وإسهالات الأطفال، والكوليرا.

٢- تلوث الغذاء بالمواد الكيميائية :

يتلوث الماء بالمواد الكيميائية وهي متعددة وكثيرة، مثل الماء الناتجة عن الأسمدة والمبيدات، والمواد المضافة أثناء الصناعة، مثل الماء الملونة ومواد النكهة

والمواد الحافظة، وبعض هذه المواد لها آثار سرطانية. ومن أخطر المواد الحافظة المضادات الحيوية التي قد يؤدي استخدامها غير الوعي إلى ظهور سلالات من بكتيريا السالمونيلا لا تتأثر بالمضادات الحيوية، كما تتلوث المواد الغذائية بالأمطار الحمضية والنفط والهرمونات التي تصاف إلى علف الدواجن للتسمين والتي تؤدي إلى أضرار جسيمة للمستهلكين.

٣- تلوث الغذاء بالمواد المشعة.

قد يتعرض الغذاء أيضاً إلى ملوثات إشعاعية وخاصة عند حدوث كوارث ينتج عنها إشعاعات ملوثة كالتفجيرات النووية وحدوث مشكلات للمفاعلات النووية كما حصل لفاعل تشنوبول في الاتحاد السوفيتي سابقاً.


حماية الغذاء من التلوث:

يمكن المحافظة على الغذاء من التلوث بوسائل مختلفة مثل ما يأتي :

- ١- عدم استخدام مياه المجاري والصرف الصحي في سقي المزروعات وخاصة الخضروات .
- ٢- فحص المواد الغذائية الطازجة لمعرفة نسبة المواد الكيميائية الضارة التي تحتويها والناجمة من استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية، ونسبة المعادن الثقيلة والمواد المشعة والمواد الأخرى، ويجب أن تكون نسبة هذه المواد هي النسبة المسموح بها حسب المعايير العالمية .
- ٣- يجب أن تكون الأغذية المعلبة حسب المعايير العالمية من حيث حفظها في أوعية ملائمة للتعليق ، وأفضلها الأوعية الزجاجية ، وتحديد تاريخ الإنتاج وانتهاء صلاحيتها .
- ٤- غسل الخضروات والفواكه بالماء الجاري النظيف ، أو غسلها بالماء المضاف إليها بعض المواد المعقمة مثل برمنجتان البوتاسيوم .
- ٥- زراعة نباتات مقاومة للآفات والحشرات بدلاً من استخدام المبيدات الحشرية .
- ٦- وضع برامج تعليمية وتشعيبية للتقليل من استخدام المبيدات الزراعية .
- ٧- دعم الأبحاث العلمية الرامية إلى إيجاد الوسائل البديلة لمقاومة الآفات الزراعية وتشجيع تطبيقاتها العملية .

سادساً : تلوث التربة:

تعرضت التربة إلى التلوث نتيجة لأنشطة الإنسان المختلفة، والنمو السكاني الزائد الذي تبعه زيادة نسبة الأرض المزروعة لتوفير الغذاء، وزيادة استغلال الموارد الطبيعية، وقد أدى ذلك إلى تغيير مكونات التربة الأساسية واستنفاد بعض عناصرها أو زيادة ملوحتها نتيجة الاستعمال غير الجيد لمياه الري والاستخدام العشوائي للأسمدة الكيميائية والمبيدات.



الشكل (١١) آثار المبيدات الحشرية

كما أدى الاستنزاف غير الوعي للكسائ الأخضر من نباتات وأشجار إلى كشف التربة مما جعلها معرضة للتعرية والانحراف بتأثير عوامل الرياح والعواصف والأمطار. وقد أدت الزيادة الكبيرة في السكان والأنشطة الإنسانية المختلفة من زراعة، وصناعة، واستهلاك، وغيرها إلى إنتاج ملايين الأطنان من النفايات الصلبة سنوياً والتي تطرح في البيئة من خلال مقاالت القمامات أو الأراضي الزراعية، مما أدى إلى استغلال مساحة شاسعة من التربة لهذه النفايات، إضافة إلى تلوث التربة بسبب طرح كثير من النفايات المنزلية الضارة كاللуб الفارغة وصناديق الكرتون والزجاج والأثاث المستهلك



الشكل (١٢) الكسائ الأخضر يحفظ التربة

وبقایا الصناعات الحديدية. وأهم من ذلك المواد المصنعة من البلاستيك مثل الأكواب والأطباق وقوارير المياه والاستخدام العشوائي لأكياس النايلون وجميعها لا تتحلل بسهولة، وكل ذلك أدى إلى إتلاف التربة وزيادة مساحة الأراضي الملوثة مقابل نقصان مساحة الأراضي الصالحة للسكن والزراعة.

كما أدت المبيدات المستعملة في



الشكل (١٣) تربة ملوثة

مكافحة الآفات الموجودة على النبات أو الموجودة على التربة إلى تهديد حياة الآلاف من الكائنات الحية النباتية والحيوانية في التربة مسببة دماراً لبعض الأنظمة البيئية نتيجة الإخلال بالتوازن البيولوجي للأحياء.

مشكلات استنزاف الموارد البيئية:

تنقسم الموارد الطبيعية في البيئة إلى الأنواع الآتية:

١- موارد دائمة:

وهي الموارد التي لا تنضب مهما استهلك منها الإنسان، ويتوقع أن تظل متوفرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه الموارد هي: الطاقة الشمسية والهواء والماء.

٢- موارد متعددة:

وهي الموارد التي تمتلك القدرة على التجدد باستمرار، وهي الشروق الحيوانية والثروة النباتية والتربة، إلا أنها تتعرض إلى ضغط شديد بسبب أنشطة الإنسان المدمرة لها.

٣- موارد غير متعددة (ناضبة):

وهي الموارد التي لا تتتجدد، أو تتتجدد ببطء شديد خلال آلاف السنين، وتوجد في البيئة بكميات محدودة مثل البترول والفحم الحجري والغاز الطبيعي وخامات المعادن. إن قدرة الإنسان على استخدام الآلات والوسائل التكنولوجية الحديثة جعلته يستغل الموارد البيئية بألوانها المختلفة، ويعمل على استنزافها بشكل متتسارع، وقد أدى ذلك إلى الإخلال بتوازن النظم البيئية وتدحرجها بشكل ملحوظ. ومن أهم الموارد التي يتم استغلالها واستنزافها بشكل شديد سواء في بلادنا أو في كثير من البلدان الأخرى ما يأتي:

١- استنزاف المياه:

تحصل بلادنا على احتياجاتها من الماء عن طريق مصادرتين أساسين هما مياه الأمطار والمياه الجوفية.



الشكل (١٤) مضخة ارتوازية تسحب الماء من جوف الأرض

وتعاني بلادنا حالياً من الاستنزاف الشديد للمياه؛ حيث نضبت كثيرة من مصادرها الجوفية مثل حوض مدينة تعز.

ويتوقع أن تنضب أحواض جوفية أخرى مثل: حوض صنعاء، وحوض صعدة، إذا استمرت سلوكياتنا السلبية تجاهها.

- كيف تكونت أحواض المياه الجوفية؟

- لماذا يتوقع أن تنضب المياه الجوفية في بلادنا؟

لقد توصلت الدراسات إلى أن أهم عامل لانخفاض منسوب أحواض المياه الجوفية في اليمن هو الاستنزاف الشديد لمحتها المائية؛ حيث إن ما يستهلك منها سنوياً لا يغوص من مياه الأمطار. وببدأ تناقص منسوب المياه في الأحواض الجوفية خلال النصف الثاني من القرن العشرين وحتى الآن نتيجة التوسيع في حفر الآبار الارتوازية لري حقول القات حيث بلغ عدد الآبار في حوض صنعاء فقط أكثر من (١٣) ألف بئر حتى الآن.

- لماذا لم يحصل تناقص في أحواض المياه الجوفية قبل هذه الفترة؟

إن الاستنزاف الشديد لأحواض المياه الجوفية في هذه الأيام لا يتم تعويضه مما يؤدي إلى حصول عجز سنوي ينبع عنه تناقص مستمر في الأحواض الجوفية حتى ينتهي محتواها من الماء. والجدول الآتي يوضح العجز السنوي الناتج:

كمية الماء	حالة الماء
٢٨٠٠ - ٣٤٠٠ مليون متر مكعب.	- المياه الجوفية المستهلكة سنوياً .
٢١٠٠ - ٢٥٠٠ مليون متر مكعب.	- المياه المتتجددة في الأحواض سنوياً .
٧٠٠ - ٩٠٠ مليون متر مكعب.	- العجز السنوي في الأحواض .

وتزداد خطورة هذا الاستنزاف على بلادنا من حقيقة أن اليمن تعد من أفقر الدول في الجانب المائي، إذ لا يتعدى نصيب الفرد السنوي من الماء (١٣٧) متراً مكعباً فقط، بينما حدد خط الفقر المائي بمقدار ١٠٠٠ م٣ سنوياً على مستوى دول العالم، وحددت حاجة الفرد السنوية من الماء كل عام بمقدار ٤٠٠ م٣.

النشاط (١)

إذا كان المتبقى في حوض صناعة مثلاً في عام ٢٠٠٠م، حوالي ١٠ مليارات م^٣ من الماء واستمر السحب السنوي في حدود ٨٠٠ مليون م^٣، وكان معدل التعریض (التجدد) هو ٢٦٥ مليون م^٣ كل عام ففي أي عام يتوقع نضوب مياه الحوض؟

النشاط (٢)

نصيب الفرد بالمتر المكعب	استهلاك الماء
٧٥٠٠	على مستوى العالم
٥٥٠٠	في أفريقيا
٣٥٠٠	في آسيا.
٢٠٠٠	في العالم المتقدم.
٩٥٠ - ١٠٢٥	في الوطن العربي.
٨٠٠	في مصر.
١٧٠	في الأردن.
١٣٧	في اليمن.

ادرس الجدول المقابل بعناية، ثم أجب عن الأسئلة الآتية في كراسة الأنشطة:

- ما نسبة نصيب الفرد من الماء في اليمن إلى نصيب الفرد في آسيا؟
- لماذا نصيب الفرد في مصر أعلى من نصيب الفرد في اليمن بالرغم من ارتفاع عدد السكان في مصر؟
- كم نسبة نصيب الفرد في اليمن إلى حاجة الفرد السنوية؟

- ما نسبة نصيب الفرد على مستوى الوطن العربي إلى نصيب الفرد في العالم المتقدم؟

وقد اتضح أن حوالي ٩٠٪ من كمية المياه المستخدمة سنوياً في اليمن تستهلك في الجوانب الزراعية، وتذهب معظم هذه المياه في ري مزارع القات.

النشاط (٣)

نقاش جماعي حول أهم المعالجات التي يمكن اتباعها للمحافظة على الثروة المائية في بلادنا.

٢- تآكل المسقمر للتربة الزراعية:

يعتبر تآكل التربة من المشكلات البيئية، ويقدر بـ ٢٥ مليون طن كل عام على مستوى العالم. وتبعد هذه المشكلة بشكل واضح في اليمن نتيجة لعوامل عددة من أهمها:



الشكل (١٥) انحراف التربة بفعل السيول

أ - إهمال الاعتناء بالدرجات الزراعية والوديان والمحافظة على التربة فيها من الانحراف .

ب- الزحف الحضري على الأراضي الزراعية واستغلالها في بناء المساكن الجديدة أو المنشآت أو شق الطرق ، وغير ذلك .


ج- القطع غير المرشد للأشجار والغطاء النباتي مما يؤدي إلى عدم تماسك التربة وبالتالي انحرافها وخاصة التربة الزراعية في الدرجات الجبلية والوديان .

وقد أدى التآكل المستمر للتربة الزراعية وإهمالها إلى ظهور مشكلة التصحر، وزحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية، ويتوقع أن تكون ٩٧٪ من أراض الجمهورية اليمنية مهددة بالتصحر إذا استمرت المشكلة بدون وضع الحلول والمعالجات لها .

- ما أهم مظاهر التصحر في اليمن؟

النشاط (٤)

- ناقش مع مجموعة من زملائك أهم المعالجات التي يجب اتباعها للمحافظة على التربة الزراعية من التدهور .



الشكل (١٦) اقتطاع الأشجار

٣- تدهور الغابات والثروة النباتية :

تعتبر هذه المشكلة من المشكلات البيئية الرئيسية على مستوى العالم بشكل عام ، وفي بلادنا بشكل خاص . فقد وجد أنه يتم اقتطاع حوالي ٢٠ مليون هكتار من الغابات كل عام على مستوى العالم ، وفي بلادنا تم القضاء على الكثير من الغابات والأحراج ، وخاصة في العقود القليلة الماضية . وأهم الأسباب التي تدفع الناس إلى اقتطاع الأشجار والقضاء على الغابات والمناطق الحرجية ما يأتي :

- ١- استخدامها كوقود.
 - ٢- استخدامها في البناء.
 - ٣- استخدامها في الصناعات ، كالصناعات الورقية.
 - ٤- للحصول على أراض زراعية جديدة.
 - ٥- للتوسيع العمراني وشق الطرق.
 - ٦- قد تموت بفعل الأمطار الحمضية.
 - ٧- قد تنتهي بفعل الحرائق في الغابات.
- ما أهمية الغابات والأشجار للحياة؟

الثروة النباتية مهمة جداً للحياة على الأرض، إذ لا يمكن استمرار الحياة بدونها؛ فهي في غاية الأهمية، وما يقوم به الإنسان من تدمير واستنزاف لهذه الثروة فإنما يهدد الحياة وبقاءها على سطح الأرض. وترجع أهمية الأشجار والغابات إلى ما يأتي:

- ١- تعتبر مصدر الغذاء للإنسان والحيوان.
- ٢- تعمل على بقاء غاز الأوكسجين وغاز ثاني أوكسيد الكربون بنسب ثابتة في الهواء الجوي.
- ٣- تحافظ على التربة الزراعية وتعمل على تماسكها.
- ٤- تشكل بيئات ومواطن لمعيشة أنواع مختلفة من الكائنات الحية.
- ٥- تمنع حركة الكثبات الرملية وتوقف زحف التصحر.
- ٦- يحصل منها الإنسان على الأخشاب والأوراق ومنتجات صناعية ودوائية أخرى لا حصر لها.
- ٧- مصدر مهم للطاقة.
- ٨- تبعث في النفس الراحة والبهجة والسعادة.

النشاط (٥)

- زيارة منطقة غابات أو أحراج، وكتابة تقرير عنها.

تقويم الوحدة

١- وضح المقصود بـ:

- المطر الحمضي - الانعكاس الحراري - السنаж - أنواع الملوثات الصناعية .

٢- اذكر أمثلة لأمراض شائعة تنتقل مسبباتها مع الهواء .

٣- ما التأثيرات التي تحدثها ملوثات الهواء الآتية :

- أكسيد النيتروجين ، - أكسيد الكبريت ، - المركبات الهيدروكربونية .

٤- اقترح طرقاً للتقليل من ملوثات الهواء في بيئتك .

٥- ما أهم ملوثات المياه العذبة في بلادنا؟

٦- وضح تأثير التلوث النفطي على الحياة في البحار والمحيطات .

٧- كيف أثرت الأنشطة الإنسانية في زيادة مشكلة الضجيج؟ وما آثارها على صحة الإنسان؟

٨- بين المشكلات التي تتعرض لها التربة في بلادنا؟

٩- كيف يمكن الحفاظة على التربة الزراعية في منطقتك؟

١٠- حدد العوامل التي أدت إلى تدهور الشروق النباتية في اليمن، واقتراح حلولاً لهذه المشكلة .

١١- ما أهم ملوثات الغذاء؟ وكيف يمكن مكافحتها؟


١٢- يعتبر الإنسان الحديث ناهب للموارد البيئية ووضح ذلك؟

١٣- اشرح أهم أسباب استنزاف المياه الجوفية في اليمن؟ وكيف يمكن المحافظة عليها من الاستنزاف؟

١٤- حدد أهم المشكلات البيئية في منطقتك . واقتراح معالجات وحلولاً لها .

الوحدة الثامنة

تاريخ الأرض



يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون قادرًا على أن:

- ١- توضح المقصود بكل من: - الطبقة. - سطح عدم التوافق الأحفوري. - الأحفورة المرشدة. - مبدأ تعاقب الطبقات. - مبدأ تعاقب الحياة. - المضاهاة. - السجل الجيولوجي. - سطح عدم التوافق.
- ٢- توضح كيفية حفظ الأحفير.
- ٣- تبيّن أهمية دراسة الأحفير.
- ٤- تقارن بين المضاهاة الأحفورية والمضاهاة الصخرية.
- ٥- توضح كيف استطاع العلماء بناء سلم الزمن الجيولوجي.
- ٦- تفسر بعض الأحداث الجيولوجية بناءً على دراسة سلم الزمن الجيولوجي.
- ٧- تشرح أهم الأحداث الجيولوجية التي مرت بها الجمهورية اليمنية عبر الزمن.

تاريخ الأرض

هو مجموعة الظروف والأحداث التي مرت على تكون الصخور والطبقات الأرضية.

- ما المبادئ التي اعتمدت في تاريخ الأرض؟
- كيف تمكن العلماء من تقسيم الزمن الجيولوجي للأرض؟

لا يمكن الإلحاد بتاريخ الأرض إلا إذا قسم إلى وحدات كبيرة وصغيرة، وتعتبر طبقات الصخور الرسوبيّة أصغر وحدة في تاريخ الأرض، وما تحتويه الطبقات من رواسب وأحافير دليل على زمن نشأة وتكون هذه الطبقات.

كيف تكون الطبقات؟ وبماذا تختلف الطبقات عن بعضها البعض؟

● أولاً: الصخور الرسوبيّة (الطبقية) :



الشكل (١) طبقات رسوبيّة متعاقبة

توجد الصخور الطبقية في الطبيعة على شكل طبقات أفقيّة (متوازية) أو قريبة من الوضع الأفقي، وتتراكم فوق بعضها لتكون تعاقبات طبقية كما يظهر في الشكل (١)، ويسمى هذا بالتطبّق، ووحدته هي: الطبقة، وهي أصغر وحدة صخرية تتراوح في سماكتها بين جزء من

السنتيمتر إلى عدة أميال حسب استمرارية تجانس المواد المترسبة فيها، وظروف التعرية والنقل وفترة الترسيب. فالطبقات الرقيقة كما تلاحظ في الشكل تمثل فترات ترسيب قصيرة، بينما الطبقات الأسمك تمثل فترات ترسيب أطول.

- الطبقة (Stratum) :

يمكن تعريف الطبقة بأنها وحدة مسطحة من الصخور الرسوبيّة لها تركيب معدني ونسيج مميز، وقد تكون كتليّة أو تحوي تراكيب داخلية محددة أو تكون كتليلية، تميزها عما فوقها وعما تحتها، ولكل طبقة سطح علوي وسطح سفلي يفصلانها عن بقية الطبقات. انظر الشكل (١). ويكون التعاقب أو التتابع الطبقي لأن الطبقة الواحدة تترسب في ظروف فيزيائية وكيميائية وبيولوجية محددة، وإذا اختلفت هذه الظروف أو إحداها يؤدي ذلك إلى انتهاء تكوين الطبقة السابقة، وبدء

تكوين طبقة أخرى جديدة فوقها مختلفة عنها، وهكذا وباستمرار تراكم كثير من الطبقات وتصخرها في أثناء الزمن الجيولوجي يتكون التعاقب الطبقي.

إذا تفحصت طبقتين متتعاقبتين في الشكل (١)، أو في الطبيعة، فإنك حتماً ستكتشف السبب الذي جعلهما طبقتين وليس طبقة واحدة، والذي قد يكون هو الاختلاف في الآتي :


١- التركيب المعدني للطبقات، كالصخر الجيري والصخر الرملي أو الصخر الطيني .

٢- حجم الحبيبات المكونة لكل طبقة .

٣- شكل الحبيبات المكونة لكل طبقة .

٤- ترتيب الحبيبات المكونة لكل طبقة .

٥- نوع المادة اللاحمة للفتات الصخري لكل طبقة .



الشكل (٢) صخور الطفل

٦- وجود مادة أخرى غير متجانسة بين الطبقتين.

فمثلاً إذا تفحصت صفائح صخور الطفل (Shale) المتجانسة (شكل ٢) ترى أن التطبق بين هذه الصفائح سببه وجود رقائق من الميكا مرصوفة فيما بينها .

(١١) النشاط

- قم بزيارة وزملاؤك إلى منطقة قريبة من المدرسة بها تتابع طبقي للصخور الرسوبية للتعرف على الطبقات وتحديد مميزات (خصائص) كل طبقة ، ثم قدم تقريراً بمحاضراتك مدعماً بالرسم لمقطع في الطبقات .

- التوافق وعدم التوافق في الطبقات :Conformity & Unconformity

التوافق هو أن تكون الطبقات المترسبة أفقية موازية لبعضها البعض ومستمرة؛ بحيث تكون أسطح الطبقات المتتعاقبة متوازية ومتتالية، مثل هذه الطبقات تسمى الطبقات المتواقة كما يظهر في الشكل (١)، ويدل التوافق على استمرار الترسيب . إلا أنها لا نجد هذا في الطبيعة دائماً وإنما نجد الآتي :

– طبقات أفقية يلاحظ فيها عدم اكتمال مجموعة من الطبقات أو حتى غيابها .


– طبقات مائلة تعلوها طبقات أفقية .

وهذا يعني وجود عدم التوافق، مما يدل على وجود توقف في الترسيب لحقبة زمنية .

ما أنواع عدم التوافق؟ وما المقصود بسطح عدم التوافق؟

أنواع عدم التوافق عديدة أهمها :


١- عدم التوافق الحتى (Erosional Unconformity) :



الشكل (٣) عدم التوافق الحتى

انظر الشكل (٣) تلاحظ مجموعتين من الطبقات السفلية الأقدم والعلية الأحدث، وبينهما سطح متعرج (س) يدل على أن طبقة أو عدة طبقات كانت بين المجموعتين لكنها الآن غير موجودة ل تعرضها لعوامل التعرية، ويسمى السطح الفاصل المتعرج بسطح عدم التوافق.

٢- عدم التوافق الزاوي (Angular Unconformity) :




الشكل (٤) عدم التوافق الزاوي

في هذا النوع تكون مجموعة الطبقات الأقدم مائلة، أما مجموعة الطبقات الأحدث فهي أفقية كما يظهر في الشكل (٤) وما يميز هذا النوع عن السابق هو أن الصخور قد تعرضت إلى حركات أرضية، بعد انحسار البحر، أدت إلى ميلانها قبل حدوث الترسيب مرة أخرى للمجموعة الأحدث. ويسدل هنا على حدوث عدم التوافق من وجود طبقة صخور الكونجلوميرات (حصى وزلط) بقاعدة المجموعة العليا الأحدث.

٣- الالتوافق (Nonconformity) :

يحدث الالتوافق عندما ترسب صخور رسوبية فوق صخور نارية أو متحولة، وبعد السطح بينهما سطحاً لا متوافقاً، لأنه يمثل



الشكل (٥) عدم التوافق المتباین

فترة انقطاع في الترسيب في وقت تكون الصخور النارية والمحولة كما في الشكل (٥). وبناء على ما سبق يمكن تعريف سطح عدم التوافق بأنه: سطح يفصل بين مجموعتين من الصخور إحداهما قديمة والأخرى أحدث منها،

ويوضح هذا السطح حدوث تعرية أو انقطاع في الترسيب يصاحبه حركات أرضية أو يليها ، ويمثل فترة زمنية ضائعة بين المجموعتين ، أي الفترة بين ترسيب الطبقات الأقدم وترسيب الطبقات الأحدث فوقها .

والتعرف على سطح عدم التوافق ميدانياً عن طريق الملاحظة المباشرة في أغلب الأحيان يكون صعباً . فلو أنك لاحظت طبقات أفقية متوازية ، فلا يكفي للحكم على عدم وجود سطح عدم التوافق ، إذ لا بد من معرفة أعمار الطبقات بمعرفة محتواها الأحفوري .

● **ثانياً : الأحافير (Fossils) :**

ما المقصود بالأحافير؟ وكيف تم حفظها؟ وما فوائدها؟

الأحافير هي بقايا أو آثار كائنات حية عاشت في أزمنة جيولوجية مختلفة تدل على نوع الكائن الحي في تلك الأزمنة ، غالباً ما توجد محفوظة في الصخور الرسوبيّة ، أو على شكل نماذج أو قوالب أو طبعات وغيرها . وفي حالات نادرة تحفظ بقايا الكائن الحي دون تغيير في تركيبه الكيميائي .

- **كيفية حفظ الأحافير:**

تسمى عملية حفظ كائنات الأحافير في الصخور الرسوبيّة أو الثلوج أو في الكهرمان (صمع نبات قديم) بالتحفر (Fossilization) . وحتى تتكون الأحافير لا بد من أن تتوافر شروط معينة أهمها :

١- أن يكون للكائن الحي هيكل صلب أو صدفة صلبة ، مثل عظام الحيوانات وأصداف الرخويات وأشواك الاسفنجيات والقشريات ومادة السيلولوز في الخشب ومادة الكيتيين في الحشرات . ويندر حفظ أحافير ليس لها هيكل صلب إلا إذا صادفتها ظروف خاصة تساعد على حفظها كأن تدفن مثلاً في الشلوج أو في مواد إسفلتيّة أو صمغية .


٢- الدفن السريع للكائن بعد موته في روابض تحميّه من التحلل . وتعد أحافير الكائنات البحريّة أكثر شيوعاً وانتشاراً من الكائنات البريّة التي تكون فرصة تحفّرها نادرة ، نظراً لأن البيئات البحريّة أكثر ملاءمة للدفن السريع ، كما أن عوامل التحلل أكثر نشاطاً على اليابسة منها في المناطق المغطاة بالماء كالبحار ، وأيضاً محدودية وسائل الدفن السريع على اليابسة وندرتها .

٣- أن تحفظ الأحافير في طبقات غير مسامية لا تسمح للمياه الأرضية بالتسرب ، وإذابة الأحفورة أو محو آثارها .

٤- أن لا تتعرض الطبقات التي تحتفظ بالأحافير لحركات أرضية عنيفة تؤدي إلى تحولها، وبالتالي إلى طمس معالمها أو محوها.

- طرائق التحف:


توجد طرائق عدة لحفظ بقايا الكائنات الحية وآثارها أهمها:



الشكل (٦) حفرية الماموت الصوفي



الشكل (٧) حفرية وحيد القرن الصوفي



الشكل (٨) حشرات محفوظة في الكهرمان

١- الحفظ الكامل:

وهي طريقة نادرة في التحف؛ حيث يحفظ الكائن بكل أجزائه أو الأجزاء الصلبة دون تغير في التركيب الكيميائي، مثل حفرية حيوان الماموث الذي وجد بكامله محتفظاً بلحمه وشعره، وغذيه داخل أمعائه في ثلوج سيبيريا انظر (الشكل - ٦)، وحفرية وحيد القرن الصوفي. انظر (الشكل - ٧) الذي وجد محفوظاً في الطبقات الإسفلية في جبال الكاربات في أوروبا الشرقية.


أ- حفظ بعض الحشرات وحبوب اللقاح النباتية في الصمغ النباتي حيث التصقت به وانضم الصمغ في الأرض وتحول بمرور الزمن إلى كهرمان، كما في (الشكل - ٨).

ب- حفظ الأجزاء الصلبة الأصلية:

في كثير من الأحيان يمضي وقت بين موت الكائن الحي وحفظه، وهذا يسمح بتحلل الأجزاء الرخوة وحفظ الأجزاء الصلبة دون أن يتغير تركيبها الكيميائي، فقد تكون الأحفورة عظاماً أو أسناناً أو أصدافاً وقواقع أو جذوعاً وأغصاناً وحبوب لقاح. انظر (الشكل - ٩) ترى بقايا أجزاء



الشكل (٩) أحافير أصداف ثنائية المصاريع



الشكل (١٠) أحفورة مستبدلة من ذرات المصارعين



الشكل (١١) أحفورة ساق شجرة متصرخة
(Petrification)

صلبة لأصداف محفوظة في حجر جيري مارلي كما هي محفوظة بتركيبتها الأصلي دون تغير.

٢- تصخر الأجزاء الصلبة الأصلية:
وفيها تتحول المادة الأصلية لهياكل الحيوان أو النبات إلى مادة حجرية أو معدنية مع بقاء الشكل الخارجي والتفاصيل الأخرى دون تغيير.

وتعتبر هذه الطريقة من أهم طرائق حفظ الأحافير وتم بإحدى الطرائق الآتية:


أ- الاستبدال أو الإحلال (Replacement)
يتم ذلك بأن تحل بعض المواد المعدنية الذائبة في المياه - التي تتخلل الصخور المحتوية على بقايا الكائنات كالسيليكا وأكسيد الحديد وكربونات الكالسيوم وغيرها - إحلالاً كاملاً أو جزئياً محل المادة الصلبة الأصلية المكونة لهيكل الكائن الحي بحيث تحافظ بشكلها وبجميع التفاصيل الدقيقة دون حدوث تغيير في شكل هيكل الكائن وحجمه. انظر الشكل (١٠)
لأحفورة ذات مصارعين تغير التركيب الكيميائي للصدفة من الكالسيت إلى معدن الكوارتز مع بقاء شكل وحجم الصدفة كما هو . وإذا حل معدن ما محل المادة العضوية، كما هو الحال في الخشب، حيث تحل

كماء السيليكا محل السيلولوز، وتدعى هذه العملية تصخر الخشب

كما في الشكل (١١).

ب- التشرب بالمعدن أو التمعدن (Permineralization) :

تحدث هذه العملية نتيجة ترسب بعض المعادن من المحاليل المتخللة للصخور



الشكل (١٢) أحفورة عظمة متمعدنة



الشكل (١٣) أحفورة نبات سيجيلاريا متحفمة

وتتم هذه العملية عندما تدفن النباتات في روابض طينية بعد موتها، وتتعرض إلى ضغط وحرارة عاليين، إضافة إلى عامل الزمن، فتبدأ عمليات التفحيم بأن يتطاير الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين الموجود في خلايا النباتات ويتبقى عنصر الكربون بشكل فحم يمثل الشكل بكل تفاصيله الأصلية التي يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن نوعه.



الشكل (١٤) آثار أقدام ديناصورات

والمشبعة بها في الفراغات والتجاويف للأجزاء الصلبة لعظام الفقاريات، والإسفنجيات والمرجانيات.

ولا يتم هنا إحلال للأجزاء الصلبة.
ويقال عندها أن الكائن قد

تشرب بمحاليل أدت إلى ترسب مواد ذات تركيب مختلف عن تكوينه. انظر الشكل (١٢) ترى عظمة متحفة بهذه الطريقة.

ج - التفحيم (Carbonization) :

انظر الشكل (١٣) تلاحظ أنه بقايا نبات قديم يسمى سيجيلاريا، وهي متفحمة وجدت في الطفل الأسود الذي يعتبر من أحد الدلائل على أن البيئة كانت بيئه مستنقعات.

٣- الآثار الأحفورية (Ichnofossils) :

هي آثار كائنات حية قديمة تمثل أنشطتها وطرق معيشتها، كآثار:

أ - سير الحيوانات (طبعات الأقدام) :
مثل طبعات أقدام الديناصور التي تظهر بالشكل (١٤) .

ب - آثار زحف أو حفر، التي تحفرها




الشكل (١٥) آثار زحف ديدان

ويحفظ كنوع من أنواع الأحافير مثل براز الطيور الذي يتراكم أثناء هجرتها الجماعية عند تغيير الفصول السنوية، وكذلك مخلفات الديناصورات التي وجدت مرافقها لبقاياتها المتحجرة.

٤- القوالب والنماذج : (Molds & Casts)

ت تكون القوالب والنماذج عند دفن القواعق والأصداف أو العظام.



الشكل (١٦) القالب والنموذج

الزواحف وبعض اللافقاريات على شكل قنوات أو مرات في الرواسب الطيرية، وتتملئ بالرواسب فيما بعد، وعندما تتصلد هذه الرواسب تحفظ آثار الزحف والمحفر كنوع من أنواع الأحافير كما في (الشكل - ١٥).

ج- إفرازات الحيوانات : ترك بعض الحيوانات برازها الذي يتصلد

ويحفظ كنوع من أنواع الأحافير مثل براز الطيور الذي يتراكم أثناء هجرتها الجماعية عند تغيير الفصول السنوية، وكذلك مخلفات الديناصورات التي وجدت مرافقها لبقاياتها المتحجرة.

انظر (الشكل - ١٦) ولاحظ كيف يتكون القالب والنموذج. تلاحظ أنه إذا طمرت قوقة في رسوبيات كما في (الشكل - أ) تتحلل مادتها الرخوة أولاً (الشكل - ب)، ثم تعرضت لاحقاً لتخلل المحاليل التي تعمل على إذابة الصدفة (الشكل - ج)، فتتكون فجوة داخل الرسوبيات أو الصخرة تسمى قالباً (أحفورة القالب). وتلاحظ أن القالب أخذ الشكل الخارجي للقوقة.

ويمكن أن تتكون القوالب أيضاً بأجزاء صلبة أخرى لبعض الفقاريات.

أما إذا امتلا القالب فيما بعد برسوبيات طينية أو جيرية (الشكل - د)، أو تربست فيه معادن ناتجة من تخلل الصخرة بمحاليل مشبعة بعناصر تلزم لتكوين القالب، تنتج أحفورة تسمى نموذجاً تحمل جميع التفاصيل الداخلية للقوقة.

- فوائد الأحافير :

تظهر أهمية دراسة الأحافير في النتائج التي توصل إليها العلماء، وهي :

١- معرفة البيئات الرسوبيّة القديمة (Palaeoenvironment) :

يقصد بها الأماكن التي عاشت فيها كائنات الأحافير. انظر الشكل (١٧) تلاحظ بيئات مختلفة لتكون أحافير عاشت في فترة زمنية واحدة.



الشكل (١٧) بيئات مختلفة لتكون أحافير عاشت في الفترة الزمنية نفسها

أ - **بيئات بحرية**: تشتمل على البحار والمحيطات المختلفة الأعمق من مناطق عميقة متوسطة وضحلة وتتميز البيئات البحرية القديمة بأنواع معينة من الأحافير.

فمثلاً الشعاب المرجانية تعيش في قيعان جيرية على عمق ضحل نسبياً، لذا فوجودها دليل على بيئة بحرية ضحلة وهكذا.

ب - **بيئات قارية** : تشتمل على مجاري الأنهار وضفافها والصحاري وحتى الجليديات القارية. وتتميز كل منها بأ نوع خاصة من الكائنات، وبالتالي بأ نوع معينة من الأحافير، وتسود النباتات معظم أنواع البيئات القارية .

ج - **بيئات انتقالية**: تشتمل على دلتا الأنهار والمناطق الشاطئية، وتتميز بأ نوع محددة من الحياة، وبالتالي بأ نوع معينة من الأحافير.

٢ - **معرفة البيئات الحياتية القديمة (Palaeoecology)** : يقصد بها الظروف الحياتية القديمة التي كانت تحيط بالكائن الحي من درجة حرارة وضغط وملوحة وغذاء وغيرها . ولكل كائن ظروف مناسبة له .

فمثلاً الجلدشوكيات التي تعيش حالياً على الشواطئ الضحلة تحت ظروف حياتية معينة كدرجة الحرارة والضغط والملوحة والغذاء، إذ عشر على أحافيرها في صخور العصر الكرتسي ، فذلك يدل على أنها قد عاشت في ذلك العصر وفي بيئات بحرية ضحلة تمثل الظروف الحياتية السابقة الذكر.

٣- **المجغرافيا القديمة (Palaeogeography)** :

نظراً لأن الكائنات تنتشر في بيئات معينة ، ذات شروط تناسب ظروفها المعيشية، فإن أحافير هذه الكائنات ترشدنا إلى معرفة حدود اليابسة والمحيطات القديمة وفي تحديد هذه العلاقة في مختلف العصور القديمة .

٤- المناخ القديم (Palaeoclimate) :

من الشروط البيئية التي تتكيف بها الكائنات الحية الشروط المناخية. فوجود أحافير معينة تؤخذ دليلاً على المناخ السائد في العصر الذي كانت تعيش فيه. فأحافير المرجان والنخيل وغيرها التي عثر عليها في صخور العصر الجوارسي تدل على المناخ الدافئ، وهناك أحافير حيوانية ونباتية أخرى عثر عليها في صخور العصر البرمي مثلاً تدل على المناخ البارد. أي إن الأحافير تدل على تغير الأحوال المناخية في العصور المختلفة.

٥- دراسة التطورات التي مرت بها الحياة على الأرض وفهمها .

٦- تحديد العمر النسبي للطبقات ومصاهاها

(Age Determination & Correlation)

لكل كائن حي فترة زمنية عاشها، وإذا حفظت بقاياه بعد موته على شكل أحافورة فإنها تكون دليلاً مرشدًا على الفترة الزمنية أو العصر الذي عاش فيه.

لذا تساعد الأحافير في تحديد أعمار الصخور التي تحويها وتعيين موضعها الصحيح في السجل الزمني، كما تفيد أيضاً في مقارنة الصخور ذات العمر الواحد محلياً وإقليمياً حتى وإن اختلفت الصخور في تركيبها. وقياساً على ذلك فإن تشابه الأحافير المتزامنة في الطبقات يساعد على تنسيب الصخور ومقارنتها ببعضها إقليمياً (في أماكن متباعدة) حتى وإن اختلفت الصخور في تركيبها.

- السجل الجيولوجي :

ما المقصود بالسجل الجيولوجي؟

السجل الجيولوجي هو سجل ينظم طبقات الصخور والأحداث والأحافير، حسب ترتيب موضعها الأصلي خلال التاريخ الجيولوجي.

وأول ما تضفت عليه الجهد للتعرف على تتابع التاريخ الجيولوجي للأرض هو تنظيم علاقات الطبقات بعضها ببعض وترتيب الأحداث الجيولوجية بشكل نسبي، أي نسبة إلى بعضها البعض، أيها أقدم وأيها أحدث، وربط هذه بذلك، لكن بعد اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي، قيست أعمار الصخور وحددت تحديداً مطلقاً، أي بعدد السنين.


أولاً: مبادئ التاريخ النسبي للصخور:

يعتمد التاريخ النسبي على عدة مبادئ في تاريخ الأحداث الجيولوجية،

فبواسطته يتم ترتيب الطبقات ترتيباً زمنياً من الأقدم إلى الأحدث، أي إنه يخبرنا أن شيئاً ما سبق حدثاً ما وتلاه حدث آخر، لكنه لا يعطينا عمرًا محدداً لحدث ما.
وهناك مجموعة من المبادئ اعتبرت أساساً للتاريخ النسبي هي:

١- مبدأ أو قانون تعاقب الطبقات : (Law of Superposition)

وضع العالم الإيطالي «ستينو» القانون الأول في علم الطبقات وينص على أنه:



في أي تتابع لطبقات الصخور الرسوبيّة تكون كل طبقة أحدث من الطبقة التي تقع أسفلها، وأقدم من الطبقة التي تعلوها، وبالتالي فإن الطبقات الأقدم تكون في الأسفل والطبقات الأحدث في الأعلى – ما لم تتعرض لقوى تؤدي إلى تغيير نظام تعاقبها الأصلي كالقلب أو الطي أو التصدع. انظر الشكل (١٨)، ثم اذكر اسم الطبقة الأقدم في هذا التتابع؟ والطبقة الأحدث؟

رتب الطبقات من الأقدم إلى الأحدث بإعطائهما أرقاماً؟


الشكل (١٨) تعاقب طبقات

٢ - مبدأ تعاقب الحياة (تعاقب الجاميع الحيوانية والنباتية) : (Law of Faunal and Floral Succession)

يمكن الاستدلال على تعاقب الحياة من خلال الأحافير الموجودة في الطبقات؛ حيث تستعمل الأحافير للاستدلال على العمر الجيولوجي للصخر الذي وجدت فيه، ولأغراض المضاهاة (المقارنة) بين الطبقات. لكن على ماذا يعتمد ذلك؟
يعتمد ذلك على ظاهرة تغير أنواع الحياة وتطورها عبر الزمن، فكل طبقة تتميز بظهور حياة بكتيريات جديدة لم تكن موجودة في الطبقات الأقدم، وانخفاء حياة كائنات لأنواع كانت موجودة في الطبقات الأقدم.

وقد عبر عن هذه الحقيقة العالم البريطاني وليم سميث في قانون تعاقب الحياة أو قانون الترابط الأحفوري على النحو الآتي:

كل طبقة أو مجموعة من طبقات الصخور الرسوبيّة تحتوي على أحافير محددة تختلف عن تلك الموجودة في الطبقات الأقدم والأحدث منها، كما في الشكل (١٩).



الشكل (١٩) تتابع أحافير

وعلى هذا الأساس يمكن التعرف على زمن تكوين الطبقة أو عمرها من دراسة أنواع الأحافير فيها، كما يمكن التعرف على ترتيبها بين الطبقات الأخرى.


٣- المضاهاة بين الطبقات (Correlation)

ما المقصود بالمضاهاة؟ وما أنواعها؟

المضاهاة: هي مطابقة أو مقارنة الطبقات الصخرية في أماكن مختلفة على سطح الأرض عبر مسافات جغرافية قريبة أو بعيدة، وهناك نوعان من المضاهاة هما:

أ- المضاهاة الصخرية (Lithocorrelation)

هي عملية مضاهاة أو مطابقة بين الطبقات في أماكن مختلفة لتحديد أعمارها النسبية بالاعتماد على التشابه الصخري من حيث التركيب المعدني والخصائص الفيزيائية كالنسيج واللون والتركيب الداخلية لهذه الطبقات، وإجراء عمليات المضاهاة الصخرية يمكن اتباع الخطوات الآتية:



الشكل (٢٠) المضاهاة الصخرية

١- دراسة الخواص والمميزات الحجرية لكل طبقة من طبقات قطاع ما ول يكن (س) كما يظهر بالشكل (٢٠).

٢- تعين العمر الزمني للطبقات الحجرية في القطاع (س) بتطبيق قانون تعاقب الطبقات، أي بتسجيل ترتيب الطبقات على حسب تتابعها في القطاع من الأقدم إلى الأحدث.


٣- تعين الطبقات الحجرية المشابهة للطبقات السابقة في قطاع آخر (ص).

٤- ربط الطبقات المشابهة بعضها البعض وتحديد الأعمار النسبية والتعاقب الزمني لطبقات القطاع (ص) كما يلاحظ في (الشكل - ٢٠).

ولكن هل طريقة المضاهاة الصخرية تؤدي دائمًا إلى نتائج صحيحة؟
لقد اتضح للعلماء أن فاعلية هذه الطريقة تكون جيدة عند استعمالها في المضاهاة والمقارنة بين قطاعات قريبة من بعضها البعض، أما في حالة استعمالها في المناطق المتباعدة فقد لا تؤدي إلى نتائج صحيحة، لأن الترببات غالباً ما تكون مختلفة.
ولهذا فإنه يلزم الاعتماد على نوع آخر من المضاهاة، وهي المضاهاة الزمنية بواسطة الأحافير (المضاهاة الأحفورية).

ب - المضاهاة الأحفورية (Biocorrelation)

هي عملية مضاهاة أو توافق بين الطبقات في أماكن مختلفة لتحديد أعمارها النسبية بالاعتماد على الأحافير التي تحتويها هذه الطبقات، وكل طبقة أو مجموعة من الطبقات تميّز بـأصنوفة معينة من الأحافير تفيد في التعرف على عمرها وترتيبها بين الطبقات الأخرى. وذلك لأن كل فترة زمنية من التاريخ الجيولوجي تميزت بانتشار أنواع معينة من الكائنات الحية، وبقايا هذه الكائنات أو آثارها في الصخور تدلنا على فترة زمنية واحدة تكونت في أثناءها تلك الصخور كما عرفنا في مبدأ تعاقب الحياة.



الشكل (٢١) المضاهاة الأحفورية بين مقطعين المسافة بينهما بعيدة

فإذا وجدت هذه الأحافير في طبقات صخرية في منطقتين متبعدين، فهذا يدلنا على أن هذه الطبقات تكونت في أثناء فترة زمنية واحدة، رغم وجود اختلافات شديدة في صفات الصخور الفيزيائية وتركيبها المعدني المكونة لهذه الطبقات كما تلاحظ بالشكل (٢١).

لكن هل تعد الأحافير كلها مفيدة لإتمام عملية المضاهاة بين الطبقات في الأماكن المتبدعة؟ لقد اتضح من الدراسات أن ثمة أنواعاً من الأحافير يمكن الاعتماد عليها أكثر من غيرها في عملية المضاهاة، وتعرف بالأحافير المرشدة أو الدليلة (Index Fossils).

فما هي الأحافير المرشدة؟


الأحافورة المرشدة هي ذات الأمد الزمني القصير (أي ذات العمر الجيولوجي القصير) وبذلك يسهل تحديد الزمن بدقة، وذات الانتشار الجغرافي الواسع، أي إنها كانت واسعة الانتشار جغرافياً وبذلك تسهل عمليات الترابط بين مناطق أو قارات متبدعة. ومن الأمثلة عليها في الشكل (٢٢) : أحافورة الترايلوبيت من نوع متعددة القطع التي ترشدنا إلى عصر الكمبري، وأحفورة جرابتوليت التي ترشدنا إلى العصرين الأولوديفيسي والسيلورى من الحقبة القديمة، وأحفورة الأمونيت التي ترشدنا إلى الحقبة المتوسطة.




الشكل (٢٢)

٤ - مبدأ الاحتواء :


الجسم الصخري الذي يحتوي على قطع من جسم آخر يعتبر أحدث من الجسم الذي أخذت منه هذه القطع، والشكل (٢٢) يعطينا مثالاً على ذلك فالصخر (ب) أحدث من الصخر (أ)، لأن جزءاً من (أ) محظوظ داخل (ب).



الشكل (٢٣) جسم صخري يحتوى
قطع من جسم آخر



الشكل (٢٤) القاطع أحدث من المقطوع



الشكل (٢٥) القاطع أحدث من المقطوع

٥- مبدأ القاطع والمقطوع :

(القاطع أحدث من المقطوع)

إن الجسم الصخري الناري أو المعلم الجيولوجي، مثل القاطع أو الصدع الذي يقطع جسماً أو معلماً آخر، هو أحدث من المقطوع وأقدم من الذي لا يقطعه. انظر الشكل (٢٣) تلاحظ أن الصخر (ج) اندفع خلال الصخر (ب) وكلاهما قطع الصخر (أ).

ما أقدم الصخور هنا؟ ماذا يسمى الصخر (ج)؟

وفي الشكل (٢٥) تلاحظ تعاقباً صخرياً (أ ، ب ، ج) تعرض لحركات تكتونية أدت إلى قطعه بالصدع (س)، ثم تعرض التعاقب لعملية التعرية، ومن ثم تربست الطبقات (د ، ه) في وضع أفقي فوقه.

- رتب الأحداث الجيولوجية من الأقدم إلى الأحدث؟

النشاط (١)

- نفذ النشاط الخاص باستخدام مبادئ التاريخ النسبي في قراءة التاريخ الجيولوجي لمنطقة ما في كتاب الأنشطة.


ثانياً- التاريخ المطلق للصخور بواسطة النشاط الإشعاعي :

يستخدم النشاط الإشعاعي في إعطاء أعمار محددة للمعادن والصخور، وهو ما يشار إليه بالأعمار المطلقة (Absolute Ages) فقد لاحظ العالم هنري بكرل في العام ١٨٩٦م، أن بعض المعادن في الصخور تحتوي على عناصر ذات نشاط إشعاعي

فما هو النشاط الإشعاعي؟ وكيف يمكن حساب أعمار الصخور؟
النشاط الإشعاعي هو انحلال تلقائي لنوءة العنصر الكيميائي عن طريق انبثاث

الطاقة وجسيمات(الفا، بيتا، جاما)، الأمر الذي يؤدي إلى نقص في الكتلة، فتحول النواة إلى نواة عنصر آخر أكثر استقراراً، ويكون معدل هذا الانحلال ثابتاً لا يتغير، ولا يتأثر بالظروف الفيزيائية والكيميائية للبيئة الحبيطة بنواة العنصر المشع، وهذا ما يجعل هذه الظاهرة على قدر من الأهمية لاستعمالها في تطبيقات تحديد أعمار المعادن والصخور. وقد وجد أن الزمن الذي يستغرقه انحلال نصف ذرات العنصر المشع ثابت، ويسمى عمر النصف (Half - Life) (أو نصف الحياة).

فمثلاً عمر النصف للراديوم ٢٢٤ هو ١٦٢٠ سنة تقريباً. فإذا وجد جرام واحد من الراديوم في عينة صخر، يبقى منه نصف جرام بعد ١٦٢٠ سنة، وربع جرام بعد ٣٢٠ سنة أخرى، وثمن جرام بعد ٤٨٠ سنة ... إلخ.



الشكل (٢٦) منحنى الانحلال الإشعاعي لخمس فترات من عمر النصف

انظر الشكل (٢٦) الذي يوضح طبيعة معدل الانحلال الإشعاعي بيانيًّا، تلاحظ أن الانحلال لا يكون خطياً بل رأسياً، ويلاحظ تناقص كمية العنصر المشع في كل فترة عمر النصف إلى نصف كميته السابقة. ($\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}$) فإذا كانت (م) عدد ذرات العنصر المشع الأصلية و(م') عدد ذرات العنصر المشع المتبقية بعدد

(ن) من فترات عمر النصف، فإن عملية الانحلال الإشعاعي يعبر عنها رياضياً على النحو الآتي :

$m' = m \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ، بمعنى أنه بعد انتهاء عمر النصف الأول يتحلل نصف النظير المشع، وبعد فترة عمر النصف الثاني يكون نصف الباقي، أي ربع النظير المشع قد تبقى، أما بعد أربع فترات عمر النصف يكون قد تبقى $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$ من النظير المشع أي $\left(\frac{1}{16}\right)$ منه قد تحول إلى النظير المستقر.

- الساعات النووية:

يطلق على العناصر المشعة التي تستعمل لقياس أعمار الصخور اسم الساعات النووية، وقد أمكن استخدامها في تحديد العمر المطلق للصخور بجميع أنواعها بشكل دقيق للغاية، وذلك في حالة تحقيق شرطين هامين هما:

- ١- أن يتم الانحلال بمعدل ثابت.
 - ٢- أن لا تفقد ولا تكتسب العناصر ذات النشاط الإشعاعي نواجع الانحلال الأخرى، ويمكن قياس زمن معدن للتعرف على عمره بإجراء الآتي :
- ١- تحليل كيميائي لعينة من المعدن لتعيين كمية كل من النظير المشع والعنصر الناجع من الانحلال، مثل تعين كميتي اليورانيوم والرصاص.
 - ٢- تعين الكمية النسبية لكل من النظائر الثابتة، اذا كان هناك أكثر من نظير واحد. ويبين الجدول (١) عمر النصف لبعض النظائر المشعة التي يعتمد عليها في تحديد العمر المطلق للصخور وبعض المواد الجيولوجية.

جدول (١) النظائر المشعة لبعض العناصر المستخدمة في تاريخ الصخور

العنصر المشع الأصلي	العنصر الثابت الناجع من الانحلال الإشعاعي	عمر النصف
$^{238}_{92}\text{U}$	$^{206}_{82}\text{Pb}$ رصاص	٤٤٦٧ مليون سنة
$^{235}_{92}\text{U}$	$^{207}_{82}\text{Pb}$ رصاص	٧٠٤ مليون سنة
$^{40}_{19}\text{K}$	$^{40}_{18}\text{Ar}$ آرجون	١١٩٣ مليون سنة
$^{87}_{37}\text{Rb}$	$^{87}_{38}\text{Sr}$ سترونثيوم	٤٨٨٠٠ مليون سنة
$^{14}_{6}\text{C}$	$^{14}_{7}\text{N}$ نتروجين	٥٧٣٠ سنة

مثال محلول :

عند فحص عينة صخرية وجد أن كمية اليورانيوم ^{235}U تعادل ١٢٥ جم وكمية الرصاص ^{207}Pb تعادل $٢٠٧,٨٧٥\text{ جم}$ ، مع العلم بأن نصف العمر لليورانيوم ^{235}U يساوي ٧٠٤ مليون سنة احسب كم عمر الصخر؟

الحل : بجمع كمية العنصر المشع (اليورانيوم)، والعنصر المستقر (الرصاص) تحصل على كمية تعادل ١٠٠ جم ثم بمرور الزمن وبعد نصف العمر الأول تتحلل نصف عدد ذرات العنصر المشع وبعد نصف العمر الثاني يكون نصف الباقي أي يتبقى ربع النظير المشع وهكذا وبعد نصف العمر الخامس يتبقى (٣١٢٥ جم) من العنصر المشع وبحساب الكمية نجد أن دورات نصف العمر عددها خمس دورات فيكون عمر الصخر = $5 \times 704 = 3520$ مليون سنة.

- استعمال النشاط الإشعاعي في الصخور:

أ - أسهل الصخور استعمالاً في التاريخ الإشعاعي هي الصخور النارية التي تشكلت فيها كل البلورات المعدنية بالتبلور من الماجما في الوقت نفسه تقريباً. وإن التاريخ الإشعاعي الذي يسجله القياس الإشعاعي هو التاريخ البلوري لبؤرة الصخر ، حيث تبدأ الساعات النووية (الإشعاعية) بالبعد بعد حدوث التبلور.

ب - أما في الصخور المتحولة التي يحدث فيها تبلور جديد للمعادن بسبب عوامل التحول من حرارة وضغط ، فإن التاريخ الإشعاعي يؤرخ لعملية التحول وليس لعملية (نشأة الصخر الناري) التي قد أوقفت وبدأت من جديد بالبعد؛ حيث إنه عندما يتعرض الصخر للحرارة العالية يصبح غير مغلق إزاء كسب أو فقد كل من العنصر المشع والعنصر المستقر، فقد يهرب (يفقد) العنصر المستقر الناتج من التحلل من المعدن الأصيل، أو قد يدخله إليه (يكتسبه) ، وكذلك قد يحدث هذا بالنسبة للعنصر المشع . لهذا تبدأ الساعة الإشعاعية بالبعد من جديد لتؤرخ لحادثة التحول.

ومن الأمثلة على الانحلال الإشعاعي الذي يعاد تسجيله بدءاً من عملية التحول لنشأة الصخر قبل التحول ، انحلال البوتاسيوم إلى أرجون ؛ حيث يخرج الأرجون من الصخر لأنه غاز عند درجة حرارة أقل كثيراً من درجة الحرارة التي تبلور المعدن عليها عند نشأته .

ج - أما بالنسبة لاستعمال التاريخ الإشعاعي في الصخور الرسوبية فإنه يصعب استعمال هذا التاريخ اذا كانت صخور فتاتية ، لأن حبيبات معادنها كانت في الأصل تتبع الصخور الأصلية ، وقد جرى عليها عملية حث وتعرية وترسيب ،

وهذا لا يوقف عمل الساعات الإشعاعية، ولكن قد يؤثر في نسبة العنصر المستقر الناتج إلى العنصر المشع، لذلك فإن تقدير عمر هذه الحبيبات المعدنية يعطى عمرًا أقرب إلى عمر الصخر الأصلي الذي أخذ منه المعدن.

أما إذا كانت الصخور غير فتاتية (كيميائية) فإن التاريخ الإشعاعي يستخدم في تقدير بعض الرسوبيات مثل البوتاسيوم أو صخور كربونات الكالسيوم مثل: الحجر الجيري والشعاب المرجانية والأصداف البحرية باستخدام طريقة الكربون (١٤)، ولكن يجب أن لا يزيد عمر الصخور المراد تعين أعمارها بهذه الطريقة عن (٦٠) ألف سنة، وذلك لصغر نصف العمر للكربون المشع إذ يبلغ حوالي (٦٠) ألف سنة. وخلاصة القول إن الساعات الإشعاعية بما فيها الكربون المشع قد أعطت تقويمًا زمنياً مطلقاً لأعمار الصخور والمواد المختلفة، ودللت على أن عمر الأرض يزيد عن (٤٦٠٠ مليون سنة)، كما ساعدت على تحديد عمر كل من أقسام السجل الجيولوجي.

راجع الجدول (٢) الذي يبين السجل الجيولوجي وسلمه الزمني.

- إعطاء الأعمار النسبية أعماراً مطلقة:

كيف استخدمت النظائر المشعة لتقدير أعمار مطلقة للصخور ومن ثم تحديد عمر كل قسم من أقسام السجل الجيولوجي؟

لإعطاء فكرة عن الأسلوب الذي اتبع نورد المثالين التاليين:

- 1- في الشكل (٢٧) وجد أن عمر الصخر البركاني (أ) يساوي (٧٠) مليون سنة، والصخر البركاني (ب) (٦٠) مليون سنة.

من هذا يمكننا أن نعرف بأن صخر الكونجلوميرات عمره أقدم من (٧٠) مليون سنة، والطفل أحدث من (٦٠) مليون سنة، لأنه يقع فوق الصخر (ب) والذي عمره (٦٠) مليون سنة، في حين ينحصر عمر الحجر الرملي بين (٦٠) و (٧٠) مليون سنة لأنه يقع بين الصخرين أ ، ب.

- التقسيم الحديث للسجل الجيولوجي :

لقد اعتمد العلماء أنساً محددة في تقسيم السلم الزمني للسجل الجيولوجي متمثلة بالأحداث الجيولوجية التي كان لها تأثير شامل وواسع في القشرة الأرضية، مثل ظهور أنواع من الكائنات الحية، وانقراض أنواع معينة منها لعدم قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المستجدة، وكذلك طغيان البحر على القارات وما ينتج عنه من ترسيب للصخور وحفظ الأحافير، وانحسار البحر عن اليابسة وما ينتج عنه من تعرية الصخور وإزالة جزء من الرواسب وإعادة ترسيبها.

ويعد العصر الكمبري المفتاح في ترتيب السلم الزمني للسجل الجيولوجي، إذ يفصل بين الزمن الجيولوجي الذي كانت فيه الحياة بدائية تفتقر إلى الهياكل الصلبة، والزمن الجيولوجي الذي ظهرت فيه كائنات ذات هياكل صلبة أعطت أحافير كان لاكتشافها أول أثر مهم في التاريخ الجيولوجي. وعلى أساس هذا التغيير الكبير في قصة الحياة قبل الكمبري وبعده قسم السجل الجيولوجي إلى قسمين كبيرين، سمي كل منهما دهراً أو أبداً (Eon) وهما:

١- دهر الحياة المعروفة (Phanerozoic Eon) (ما بعد الكمبري)، وهو يشمل التاريخ الجيولوجي بدءاً بالعصر الكمبري. وأمده الزمني حوالي (٦٠٠) مليون سنة حسب القياسات النووية.

٢- دهر الحياة الحفظية: (Cryptozoic Eon) وهو يشمل التاريخ الجيولوجي ما قبل الكمبري. وأمده الزمني أكثر من ٤٠٠٠ مليون سنة، حسب القياسات النووية. ومن ثم قسم دهر الحياة المعروفة، إلى أقسام زمنية أصغر سمي الواحد منها حقبة (Period)، والحقبة إلى أقسام زمنية أصغر، سمي الواحد منها عصرًا (Era).

والعصر إلى أقسام زمنية أصغر، سمي الواحد منها حيناً (Epoch).

وقسم الحين إلى أقسام زمنية أصغر، سمي الواحد منها أواناً أو عمرًا (Age). انظر الجدول (٢) الذي يوضح أقسام السجل الجيولوجي وسلمه الزمني وأجب عن الآتي:

- إلى كم حقبة قسم دهر الحياة المعروفة؟ سمعها؟ وما أمد كل حقبة؟

- إلى كم عصرًا قسمت حقبة الحياة القديمة؟ سمعها؟

- إلى كم عصرًا قسمت حقبة الحياة المتوسطة؟ سمعها؟

- إلى كم عصرًا قسمت حقبة الحياة الحديثة؟ سمعها؟

- إلى كم حيناً قسم عصر الثلاثي؟ وما هي؟

- إلى كم حقبة قسم دهر الحياة الحفظية أو ما قبل الكمبري؟ وكم أمد من تاريخ الأرض؟

جدول (٢) أقسام المسجل الجيولوجي وسلمه الزمني وأهم أنواع الحياة

السلم الزمني (ملايين سنة)	أهم أنواع الحياة	جن (Epoch)	عصر (Period)	حقبة (Era)	دهر (Eon)
٢	عصر الإنسان	الحديث (Recent) (Pleistocene)	الرباعي (Quaternary)	حقبة الحياة الحديثة (Cenozoic Era)	
٧	عصر الماموث	البليوسين (Pliocene)	الثلاثي (Tertiary)		
٢٦	عصر الحيوانات العصرية	الميوسين (Miocene)			
٣٧	عصر آكلات العشب ومنها الجمل	اليجوسين (Oligocene)			
٥٧	عصر الفيله الأولى	ايوسين (Eocene)			
٦٥	عصر الخيول الأولى	باليوسين (Paleocene)			
١٤٤	عصر الديناصور الأخير		الكريتاسي (Cretaceous)	حقبة الحياة المتوسطة (Mesozoic Era)	
٢٠٨	عصر الديناصور المتوسط		الجوارسي (Jurassic)		
٢٤٥	عصر الديناصور الأول		التریاسي (Triassic)		
٢٨٦	عصر الزواحف الأولى		البرمي (Permian)		
٣٦٠	عصر البرمائيات والمستنقعات		الكريوني (Carboniferous)	حقبة الحياة القديمة (Paleozoic Era)	
٤٠٨	عصر الأسماك		الديفوني (Devonian)		
٤٣٨	عصر العقارب المائية ونباتات اليابسة		السيلوري (Silurian)		
٥٠٥	عصر الرخويات العملاقة		الأردو فيشي (Ordovician)		
٥٧٠	عصر ثلاثة الفصوص		الكمبري (Cambrian)		
٢٥٠٠			الحقبة البدائية (Proterozoic)	دهر الحياة الحقيقة	
٤٦٠٠			الحقبة السحيقة (Archeozoic)	(Cryptozoic Eon)	

السلم الزمني للسجل الجيولوجي:

استغرق وضع السجل الجيولوجي بشكله الحديث حوالي قرنين من مجهدologists والعلماء بصورة عامة. وكان اعتمادهم في المرحلة الأولى على تحديد التاريخ النسبي للطبقات، ومن ثم تمكناً من ترتيب السلم الزمني للسجل الجيولوجي (Geologic Time Scale)، وباستخدام الساعات النووية في تحديد التاريخ المطلق للصخور والأحداث الجيولوجية على الكوكبة الأرضية. وبذلك استطاع العلماء أن ينسبوا أي حدث إلى فترته الزمنية؛ بحيث حدد عمر كل دهر وحقبة وعصر وكل حدث جيولوجي بوحدات الزمن المطلق بدلاً ملابين السنين.

نبذة عن تاريخ الأرض

١ - دهر ما قبل الكمبري (دهر الحياة الخفية): (Cryptozoic Eon)

بدأ هذا الدهر منذ نشأة الأرض، أي قبل حوالي (٤٦٠٠) مليون سنة، وانتهى بداية عصر الكمبري قبل (٥٧٠) مليون سنة، وهو أطول الدهور الجيولوجية، ودلائل الحياة فيه غير واضحة ونادرة بسبب قلة الأحافير التي عثر عليها. ويعتقد العلماء بأن الحياة بدأت في البحار قبل حوالي (٣٥٠٠) مليون سنة، وكانت الكائنات الحية بدائية النوى وهي بكثيرها خضراء مزرقة، ومنذ (١٥٠٠) مليون سنة ظهرت الكائنات حقيقية النوى وهي طحالب خضراء بسيطة كانت تقوم بعملية البناء الضوئي فادى ذلك إلى زيادة نسبة O_2 في الغلاف الجوي. وفي أواخر هذا الدهر قبل حوالي (٧٠٠) مليون سنة ظهرت كائنات حية متعددة الخلايا، لكنها تفتقر إلى هيكل صلب مثل الفطريات والديدان البسيطة، ومن المناطق التي عثر فيها على هذه الأحافير على هيئة طبقات وتحف وتحف استراليا.


أما الصخور التي تكونت في هذا الدهر فأغلبها نارية ومتحولة، وقليل من الصخور الرسوبيّة، وتتشكل أقدم المناطق في القارات وتسمى الدروع، ومن الأمثلة على هذه الدروع: الدرع العربي.

٢- حقبة الحياة القديمة : (Paleozoic Eon)

استمرت هذه الحقبة من حوالي (٥٧٠) مليون سنة إلى (٢٤٥) مليون سنة، أي نحو (٣٢٥) مليون سنة). وتميزت بوفرة الأحافير في صخورها، ويرجع ذلك إلى ظهور

كائنات حية ذات هيكل صلبة أو تفرز مواداً صلبة كالأصداف والترابيلوبيت، ومن ثم ظهرت الهياكل العظمية.

تميزت هذه الحقبة بانتشار واسع للكائنات اللافقارية. انظر (الشكل - ٢٨) فظهرت طائفة المرجان الذي استمر انتشاره من الأردو فيشي إلى البرمي بنوعيه الأنبوبي والرباعي، كذلك المفصليات وأشهرها الترابيلوبيت والتي تعد من الأحافير المرشدة للعصر الكلمبي. انظر الشكل (٢٩) الذي يوضح صورة لأحفورة ترابيلوبيت، وقد ظهرت هذه الأحافير في بداية الحقبة وانقرضت في نهايتها (في البرمي).



الشكل (٢٨) بعض أنواع اللافقاريات والقديمات

ذات الصدفة المستقيمة والترابيلوبيت والمسريجيات والقواعد والمرجان



الشكل (٢٩) أحفورة ترابيلوبيت


(Echinodermata) في العصر الكلمبي الأسفل، وانتشرت بشكل واسع جداً في العصر الكريتاسي، وما زالت تعيش إلى اليوم. أما طائفة الراسقدميات، فقد تميزت بظهور أحافير النوتيلس التي لا تزال أنواع منها تعيش حتى الآن.

- الحياة الفقارية:

ظهرت في هذه الحقبة عدد من الفقاريات البدائية، وأهمها الأسماك، وأول ما ظهر منها أسماك عديمة الفكوك التي وجدت أحافيرها في صخور العصر الأردو فيشي وانقرضت




الشكل (٣٠) أحافير سمكة الاستراكوديرم



الشكل (٣١) سمكة بلاكوديرم الصخرية



الشكل (٣٢) أحافير أسنان أسماك غضروفية



الشكل (٣٣) نباتات لازهرية (وعائية)

في الديفوني وعرفت أحافيرها باسم الأستراكوديرم كما في (الشكل - ٣٠). وفي بداية العصر الديفوني ظهرت وازدهرت الأسماك ذات الفكوك والزعانف المزدوجة (البلاكوديرم)، (الشكل - ٣١) وهي ذات حجم صغيرة تعيش في المياه العذبة.

أما الأسماك الغضروفية التي ميزت أحافير العصر الكربوني والبرمي، فقد تحفرت أسنانها كما في الشكل (٣٢). وفي أواخر هذه الحقبة ظهرت البرمائيات، أما الزواحف فظهرت في نهاية هذه الحقبة في أواخر العصر الكربوني وبداية البرمي .

- الحياة النباتية:

في بداية الحقبة اقتصرت الحياة النباتية على الأعشاب البحرية وخاصة الطحالب ذات الهياكل الكلسية مما ساعد على الاحتفاظ بها كأحافير ، وفي العصر الديفوني بدأ ظهور السرخسيات (نباتات لازهرية) وانتشرت في العصر الكربوني في بيئة المستنقعات وكانت غابات كثيفة من الأشجار الضخمة. انظر (الشكل - ٣٣) والتي نتج عن تراكمها ودفنهما الفحم الحجري .

٣- حقبة الحياة المتوسطة (Mesozoic Era)


استمرت هذه الحقبة حوالي (١٨٠ مليون سنة) وقسمت إلى ثلاثة عصور رئيسية، وتميزت بالكائنات الحية الأكثر رقىً، والأكثر تنوعاً، ظهرت أنواع جديدة من الرأسقدميات (الأمونيات) - (والشكل - ٣٤) يوضح أحافير أمونيت - وقد انقرضت في نهاية الكريتاسي (الطباسيري) وتعتبر من الأحافير المرشدة.




ومن اللافقاريات ظهرت أنواع جديدة من الجوفمعويات (المرجان السادسسي) والتي سادت في الترياسي واستمرت حتى الوقت الحاضر.

إضافة إلى الحباريات ذات المصرايع التي سادت في الكريتاسي وتكون عنها الصخور الطباسيرية، والقواقع (الحلزونيات) والجلد شوكيات مثل قنافذ البحر والتي انتشرت في الكريتاسي.

أما الحياة الفقارية: فقد تغيرت بظهور الزواحف، ومنها **الشكل (٣٤) أحافير أمونيت** الزواحف العملاقة (الديناصورات) التي سادت في الجوارسي والكريتاسي وهي أنواع متعددة التي منها في البر آكلة العشب (بيرونتوصور)، وآكلة اللحوم (تيرانوصور)، وفي البحر (أكتيوصور)، وفي الجو التنين الطائر (تيروداكتيل). انظر الشكل (٣٥).



واختفت الزواحف العملاقة قرب نهاية الحقبة، لكثره الزلزال والبراكين، تاركة المجال لأنواع الصغيرة الحجم من الزواحف التي انتشرت في منتصف هذه الحقبة وأهمها: السلاحف والسمالي والتماسيح والأفاعي والتي بقيت أنواع منها حتى الآن.



الشكل (٣٦) أحافير أركيوبتركس

أما الطيور فقد عثر على أحافير الطائر ذي الأسنان (أركيوبتركس) وذلك في العصر الجوارسي الأسفل، ويعود من أوائل الطيور التي ظهرت وكان لها أسنان في منقاره، انقرضت في العصر الكريتاسي الأعلى، ويوضح الشكل (٣٦) أحافورة لهذا الطائر. وفي نهاية هذه الحقبة ازداد عدد الثدييات في جميع البيئات.

الحياة النباتية:


تضاءلت النباتات اللازهرية في أوائل الترياسي؛ حيث ظهرت النباتات عاريات البذور كالصنوبر والأرز والتي كونت غابات كثيفة، كذلك ظهرت النباتات مغطاة البذور وخاصة ذوات الفلقة الواحدة، كالغاب والنخيل، في أواخر الكريتاسي.

٤- حقبة الحياة الحديثة (Cenozoic):

تمثل هذه الحقبة الفترة الزمنية التي تمت منذ حوالي (٦٥) مليون سنة حتى الوقت الحالي . وقد تم تقسيمها إلى عصرين : الثلاثي والرباعي ، وتعتبر حقبة سيادة الثدييات ، وقد بدأت بانحسار البحار واتساع رقعة القارات، وفي بدايتها كان المناخ حاراً جداً ثم أخذ في البرودة حتى صار في أواخرها جليداً في أوروبا وأمريكا الشمالية. انقرضت كثير من الأنواع المميزة لحقبة الحياة الوسطى وظهرت أنواع جديدة كثيرة الشبه بالأنواع المعاصرة، وكذلك سادت النباتات الزهرية مغطاة البذور (Angiosperms) وكانت غابات ذوات الفلقتين مثل أشجار الحور والزيتون والكافور إلى جانب النخيل.

جيولوجية الجمهورية اليمنية


تقع الجمهورية اليمنية في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية والتي تكون جزءاً من الدرع العربي - النبوي الذي يقع على جانبي أخدود البحر الأحمر، ومن جنوب الأردن حتى اليمن. (شكل ٣٧).



الشكل (٣٧) خريطة تبين امتداد الدرع العربي

ويتكون الدرع العربي من صخور القاعدة النارية والمت حوله، وترتكز عليه وحدات من الصخور الرسوبيّة يتراوح عمرها ما بين الأردوفيشي والحديث، إلا أن أكثرها انتشاراً وتمثيلاً هي رواسب العصر الجوارسي ورواسب العصر الكريتاسي (الطباسي) ورواسب العصر الثلاثي والرباعي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقيّة.

انظر الخريطة الجيولوجية للجمهورية اليمنية، الموضحة بالشكل (٣٨)، ولا حظ أعمار الصخور التي تشير إليها الألوان المختلفة، فماذا ترى؟



الشكل (٣٨) الخريطة الجيولوجية للجمهورية اليمنية

ترى صخور دهر الحياة الخفية (ما قبل الكلمبي) التي تكون صخور القاعدة (الأساس) النارية والمحولة، والتي ترسبت فوقها جميع أنواع الصخور الرسوبيّة التابعة لما بعد الكلمبي من عصور دهر الحياة المعروفة. وتتكون تلك الصخور من نوعيات نارية ومحولة مثل الجرانيت والديوريات والشست والنایس والبجماتيت وغيرها من الصخور البلورية، ولهذه الصخور قيمة اقتصادية كبيرة وذلك لاحتوائها على العديد من المعادن الفلزية مثل: النيكل والنحاس والحديد والذهب والفضة والتيتانيوم والقصدير والتنجستين والعناصر المشعة.

وتتركز هذه الصخور في شمال غرب اليمن في منطقة صعدة، وفي جنوب الوسط في منطقة «البيضاء ، ولودر» وفي جنوب شرق اليمن في المكلا.

وترى أيضاً صخور دهر الحياة المعروفة ذات الأعمار المختلفة، وهي الصخور الرسوبيّة الفتاتية المتماسكة أو غير المتماسكة الحديثة (رمال وحصى) أو المترسبة كيميائياً، والتي تغطي المساحة المتبقية من الجمهورية اليمنية تغطية كاملة، وتناثر بعض من أجزائها والصخور البركانية الحديثة على شكل بقع فوق صخور القاعدة (صخور الدرع العربي) فتغطي أجزاء كبيرة منه.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن تفاصيل التاريخ الجيولوجي لليمن لا زال يحتاج إلى الكثير من الدراسات العلمية والأبحاث المدققة حتى تكتمل الصورة.

وفيما يلي توضيح لأهم ملامح التاريخ التربسي والجيولوجي للجمهورية اليمنية لحقب الحياة لدهر ما بعد الكلمبي (دهر الحياة المعروفة).

- أولاً: حقبة الحياة القديمة: (Paleozoic Era)

١ - سادت اليمن في هذه الحقبة الظروف القارية والمناخ البارد خلال عصر البرمي، وربما الجليدي، خاصة في المرتفعات وذلك لوجود جلاميد جليدية تحويها الرواسب، وأدت عمليات التعرية إلى:

أ) شبه تسوية لصخور ما قبل الكلمبي النارية والمحولة كالجرانيت والجابروليت والنایس والشست وغيرها مكونة منطقة شبه سهلة.

ب) تكون رواسب قارية خلال عصر الكلمبي، والتي ربما أزيلت فيما بعد عند استواء سطح الأرض تماماً، ولقد ارتفع سطح الأرض بالمنطقة الجنوبية والشرقية أثناء عصر الأردوفيشي ليصبح بمثابة صخور مصدرية قامت بتفتتتها ونقلها وترسيبها في المناطق الشمالية أنهار ذات رواسب قارية إلى الشمال من صعدة، وشمال وشرق منطقة الجوف.

وتتركز هذه الرواسب مباشرة على صخور القاعدة النارية والمتحولة، وتعتبر أقدم الرواسب، وتتكون من الحجر الرملي الأبيض المكون من حبيبات جيدة الاستدارة من الكوارتز الحتوي على عدسات رقيقة من الكونجلوميرات، كما تحتوي على عقد حديدية وشوائب طينية.

وقد أمكن تحديد عمرها بالأردوفيشي – البرمي بمضاهاتها بمشيلاتها في السعودية حيث إنها لا تحتوي على حفريات.

٢ - قرب نهاية هذه الحقبة في أواخر عصر البرمي تكون الجليد على قمم الجبال، وعند ذوبانه نقلت بعض الرواسب الجليدية إلى بحيرات عميقة، فترسبت صخور الطفل الوريقية الداكنة اللون والتي تحتوي على جلاميد جليدية ومواد عضوية وأكاسيد حديدية بالإضافة إلى معادن طينية، وتتركز صخور الطفل هذه في مناطق محدودة للغاية في غرب صعدة ومنطقة كحلان.
وتتوارد الصخور الترسيبية من العصر الكلمبي إلى العصر البرمي تحت الطبقة السطحية للمناطق الشرقية من اليمن.

- ثانياً : حقبة الحياة المتوسطة (Mesozoic Era) :

تميزت بداية هذه الحقبة (الجوراسي المبكر) بمناخ دافئ وهبوط في سطح الأرض في شمال اليمن ف تكونت أحواض ترسيبية ثانوية، ترسبت فيها راوبس قارية رملية حصوية حمراء اللون إلى شاطئية، بالإضافة إلى راوبس طينية خضراء ورمادية اللون بها بعض الحفريات النباتية.

و مع بداية العصر الجوراسي الأوسط غمر البحر معظم الأرض اليمنية وغمرت تماماً في العصر الجوراسي المتأخر، فترسبت صخور جيرية ودولوميتية بحرية غنية بالحفريات كالرخويات والمرجان والرخويات (الفورا منيفرا) والجلد شوكيات، بالإضافة إلى الطفل والحجر الرملي، وبيئة هذه الرواسب بحرية غير عميقه (رصيف قاري).

وفي أواخر العصر الجوراسي بدأ تقهقر (انحسار) البحر ونشأ عن ذلك تكون عدد من البحيرات (Lagoons) الشبه معزولة عن الشاطئ برواسبه الجبسية والملحية المميزة : كالملح والجبس في صافر (مارب) وفي رملة السبعين (شبوبة)، والجبس كما في الغراس (صنعاء).

وفي العصر الكريتاسي (الطباسيري) واصل البحر انحساره وتحولت اليمن مرة ثانية إلى بيئة قارية، وأدت العمليات النحثية إلى تفتيت خامات الأحواض التي ارتفعت في الجنوب والشرق وإعادة ترسيبها في كل أنحاء اليمن تقربياً، باستثناء منطقة الدرع العربي، على هيئة (صخور رملية خشنة الحبيبات)، رواسب رملية حصوية صفراء مبرقشة، ورملية طينية حمراء أو مختلفة الألوان، ورملية بيضاء بها مواد طينية، وتظهر على السطح في بعض المناطق في شمال وشرق اليمن وعلى جانبي بعض الوديان الرئيسية في غرب اليمن كوادي سردد وتراكيب الظهور (Horsts)، وتوجد مختبئ تحت الصخور البركانية لحقبة الحياة الحديثة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من اليمن.

- ثالثاً : حقبة الحياة الحديثة (Cenozoic Era)

١ - العصر الثلاثي (Tertiary Period) (٦٥ - ٧ مليون سنة) مع بداية عصر الثلاثي، في حين الباليوسين غمر البحر اليمن باستثناء المناطق المرتفعة في شمال اليمن مُرسباً رواسب رملية شاطئية طينية ذات انتشار محدود للغاية تحتوي على طفل وحفريات بحرية من حين الباليوسين، وفي حين الأيوسين انحصر البحر، وتكونت أحواض منعزلة بعضها عن بعض وترسب الجبس والملح كما في الصليف والمهرة، وقبل نهاية الأيوسين عاد البحر وغمر المنطقة مرة ثانية.

كما نشطت حركات القشرة الأرضية في حين الأيوسين وتعرض غرب شبه الجزيرة وشرق إفريقيا لحركة أرضية رافعة نشأ عنها تقوس إقليمي لقشرتها الأرضية بلغ أقصى مداه خلال حين الأوليجوسين ومصحوباً بما يلي :

أ - ثورات بركانية غير متصلة (بركانيات اليمن الثلاثية) نتج عنها صخور نارية بركانية كالبازلت والإنديزيت والتراكيت .. إلخ، مكونة مع ما تلاها من طفوح بركانية الميوسين بما يعرف بمجموعة (تراب) البركانية التي تتكون من صخور بركانية كالبازلت، والإنديزيت، والتراكيت، والنفف أو الطف (Tuff) والإجنبيريت والزجاج البركاني وغيرها، على هيئة طبقات متراصة فوق بعضها البعض مما يجعل البعض يعتقد بأنها صخور رسوبية لأول وهلة وليس صخور بركانية، ويقطعنها الكثير من القواطع والسدود والكتل

الجرانيتية والمنبقة من الفوائل والصدوع، ويبلغ سمك طبقات الصخور النارية والبركانية أكثر من ١٥٠٠ متر.

ب - عمليات تعرية .

ج - تكون رواسب مياه عذبة (أنهار - بحيرات) تحتوي على حفريات، وكذلك تربة اللاتريت بين طبقات الصخور البركانية. وهذا يؤكّد أن الصخور البركانية قد تكونت في فترات غير متصلة تخللتها فترات هدوء مطيرة تكونت أثناءها مثل هذه الرواسب، وقد استخدمت الحفريات الموجودة بهذه الرواسب في تحديد عمر الصخور البركانية بالأوليجوسين - الميوسين.

تلا حركة التقوس (Arching) هذه، وما صاحبها من عمليات، تصدع الدرع العربي النبوي بصدوع عادلة موازية لشاطئ البحر الأحمر وخليج عدن، والتي أحالت المنطقة إلى كتل صدعية عديدة على شكل تراكيب الأغوار (Grabens) والظهور (Horsts)، وصدوع ذات زحمة مضربية عمودية على اتجاه الصدوع العادلة، ونشأ عن كلا

النوعين (انفلاق) خسفي لوادي البحر الأحمر الأخدودي

(Red sea Rift valley) وخليج عدن في حين الميوسين المبكر والأوسط. وصاحب ذلك نشاطات بركانية متتجدة مكونة لصخور قشرة أرضية محيطة حديثة على شكل حافة بحرية. ونتيجة لأنفاق وانتشار الحمم البركانية على طول محور الوادي الخسيف للبحر الأحمر وخليج عدن، تباعد اللوح العربي (Arabian Plate) في اتجاه الشمال الشرقي، عن اللوح النبوي (Nubian Plate) والذي تباعد في اتجاه الجنوب الغربي. وتميزت فترة بداية منشأ البحر الأحمر بتكون رواسب ملحية وجبسية كتلة التي تنتشر في منطقة الصليف، ويصل سمك طبقات الملح إلى أكثر من ١٠٠٠ متر .

٢- عصر الرباعي (Quaternary Period) : (منذ ٢ مليون سنة إلى اليوم). تميز هذا العصر بنشاط بركاني، وتكونت الصخور البركانية الحديثة التي تتميز بأشكالها المخروطية وفوهاتها البركانية الواضحة على العكس من صخور العصر الثلاثي، وذلك في بعض أنحاء اليمن والتي ما زال البعض يتتساعد منه الأبخنة الغنية ببخار الماء والكبريت الذي يترسب على سطح الصخور على هيئة بلورات صفراء كما في الليسي بذمار، وهذا يجعلها تستخدم كحمامات (مثل حمام علي، وحمام دمت .. وغيرها).

أما الرواسب فقد كانت مساحات واسعة من السهل نتيجة تعرية المناطق المرتفعة وردم المنخفضات بالرسوبيات القارية (رمل وحصى) والتي تتمثل في الرمل المنتشر على هيئة كثبان رملية بالمناطق الصحراوية الشمالية الشرقية والشرقية، والمناطق الساحلية، ورواسب شاطئية وطينية، ورواسب الوديان من الحصى والرمال والطين التي يتغير تركيبها المعdeni لكل وادٍ بتغير الصخور التي يتخللها الوادي، وتعتبر رواسب الأودية الخزان الجوفي الأساسي لل المياه في غالبية مناطق اليمن.

تقويم الوحدة

أولاً: وضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:

١- أي تعاقب رسوبي أفقى لم يتعرض لقوى تكتونية:

- أ- تكون كل طبقة أقدم من التي أسفلها وأحدث من التي تعلوها.
- ب- تكون أعلى طبقة في التعاقب أقدمها عمراً.
- ج- كل طبقة أحدث من التي أسفلها وأقدم من التي تعلوها.
- د- كل الطبقات لها العمر نفسه.

٢- اعتمد العلماء مبادئ التاريخ النسبي كأساس لوضع التقويم الجيولوجي:

- أ- قبل اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي.
- ب- بعد اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي.
- ج- في القرن السابع عشر.
- د- (ب، ج) معاً.

٣- كان أول ظهور واسع للأحافير:

- أ- قبل حوالي (٣٠٠٠) مليون سنة.
- ب- قبل حوالي (٢٥٠٠) مليون سنة.
- ج- منذ حوالي (٥٧٠) مليون نسمة.
- د- منذ حوالي (١٥٠٠) مليون سنة.

٤- يتم تحفظ الخشب بطريقة:

- أ- الإحلال.
- ب- التمعدن.
- ج- التفحّم.
- د- (أ، ب) معاً.

٥- يقدر العلماء عمر الأرض منذ نشأتها إلى عصرنا الحاضر بـ:

- أ- (٦٤٠٠٠) مليون سنة.
- ب- (٤٦٠٠) مليون سنة.
- ج- (٦٤٠٠) مليون سنة.
- د- (٤٦٠٠) مليون سنة.

٦- أحافورة الترايلوبيت من الأحافير المرشدة إلى العصر:

- أ- الatrias. ب- السيلوري. ج- الكمبري. د- الجوراسي.

٧- ساد المرجان السادس في العصر:

- أ- الatrias. ب- الكمبري. ج- البرمي. د- السيلوري.

٨- ينقسم العصر الرباعي إلى الحينين:

- ب - البليستوسين والحديث .
- أ - البليوسين والإيوسين .
- ج - البليستوسين والبليوسين .
- د - البليستوسين والإيوسين .

٩- تقسم حقبة الحياة المتوسطة إلى العصور:

- أ - الترياسي ، والجوراسي ، والكريتاسي .
- ب - الترياسي ، والبليوسين ، والجوراسي .
- ج - الجوراسي ، والترياسي ، والبرمي .
- د - الكريتاسي ، والجوراسي ، والبرمي .

١٠- ظهرت الأسماك عديمة الفكوك في حقبة:

- أ- الحياة الحديثة . ب- ما قبل الكلمبي . ج- الحياة القديمة . د- الحياة المتوسطة .

ثانياً: علل لما يأتى:

- ١- تكون التتابع الطبيعي في الصخور الرسوبيّة .
- ٢- ندرة وجود أحافير من الكائنات التي كانت تعيش على اليابسة .
- ٣- عدم وجود أحافير في الطبقات الرسوبيّة شديدة المسامية .
- ٤- عدم وجود أحفورة الترايلوبيت ضمن صخور الجوراسي .
- ٥- يعد عصر الكلمبي حجر الأساس في تقسيم سلم الزمن الجيولوجي .

ثالثاً: أجب عن الأسئلة التالية:

١- وضح المقصود بكل من:

- الطبقة . - سطح عدم التوافق . - الأحافير . - المضاهاة .
- السجل الجيولوجي . - الأحفورة المرشدة . - عمر النصف .

٢- وضح الشروط الالازمة لتكون الأحافير؟

٣- ما الفرق بين كل من:

- أ - التوافق وعدم التوافق في الطبقات . ب - التصخر بالإحلال والتمعدن .

ج - المضاهاة الصخرية والمضاهاة الأحفورية . د - القالب والنماذج .

٤- في أي حقبة ظهرت كل من الآتي ثم رتبها حسب زمن ظهورها من الأقدم إلى الأحدث.

- الديناصورات . - الأركيوبتركس . - الترايلوبيت . - الجرابتوبيت .

- النباتات الزهرية . - الثدييات . - الأسماك . - الكائنات الحية بدائية النوى .

٥- بعد كم سنة يتحلل ١ كجم من الكربون (١٤) ليعطي ٧٥٠ جرام من النيتروجين

(١٤) إذا علمت أن فترة نصف العمر للكربون (١٤) تساوي ٥٧٣٠ سنة؟


رابعاً: علام نستدل من المشاهدات الجيولوجية الآتية:

- ١- وجود سطح غير مستو بين مجموعتين من الطبقات؟
- ٢- وجود أحافير الأمونيت في طبقة صخرية؟
- ٣- وجود أحافير الترايلوبيت في طبقة صخرية؟
- ٤- وجود طبقات سمكية متعرجة؟
- ٥- وجود طبقات رقيقة متعرجة؟

خامساً:

الشكل التالي يمثل مقطعاً لتعاقب صخري رسوبى اخترقته ماجما بردت وتبليورت لتكون جسمًا نارياً جوفياً.

- ادرس الشكل وأجب عن الأسئلة التي تليه:



- ١- ما الصخران: الأقدم والأحدث في هذا المقطع؟
- ٢- أيهما أحدث: سطح عدم التوافق (ص) أم الصدع (س)؟
- ٣- أيهما أقدم: الطبقة (٥) أم الصدع (س)؟
- ٤- رتب الصخور والمعالم الجيولوجية من الأقدم إلى الأحدث.

المصطلحات

– المنخريات، فرامينفرا – المتنقبات .(Foramirufera)	– العمر المطلق (Absolute Dating)
– السلم الزمني الجيولوجي .(Geologic Time Scale)	– عمر أو (أوان) (Age)
– جرابتوليت (من الحبليات البدائية) .(Graptolite)	– الدرع العربي (Arabian Shield)
– مغطاة البذور (Angiosperms)	– طائر الأركيوبتركس (Archaeopteryx)
– عاريات البذور (Gymnosperms)	– حقبة الحياة السحيقة (Archeozoic Ena)
– نصف الحياة /نصف العمر .(Half- Life)	– السمكة المدرعة (Armoured Fish)
– حصان الباليوسين (Hyracotherium)	– التطبق (Bedding)
– الأحفير المرشدة (Index Fossils)	– طبقات (Beds)
– طبع (Imprint)	– عضديات الأرجل، مسرحيات (Brachiopods)
– نظير (Isotope)	– عصر الكلموري (Cambrian)
– عصر الجوارسي (Jurassic)	– تفحّم (Carboniferous)
– قانون تتبع الأحفير .(Law of Faunal and Floral Succession)	– حقبة الحياة الحديثة (Cenozoic Era)
– قانون تتبع الطبقات .(Law of Superposition)	– المرجانيات (Corals)
– الثدييات (Mammals)	– مضاهاة (Correlation)
– طبقات دليلة (مرشدة) .(Guide Beds)	– براز الحيوانات (Coprolites)
– حقبة الحياة المتوسطة (Mesozoic Era)	– عصر الكريتاسي (Cretaceous)
– حين الميوسین (Miocene Epoch)	– دهر الحياة المستترة أو الخافية
– الرخويات (Molluses)	– عصر الديفوني (Devonian)
– النوموليت (أصدافها مثل العدس) .(Nummulites)	– حين الإيوسین (Eocene Epoch)
– القنفديات (شوكيات الجلد) .(Echinoids)	– دهر أو أيد (Eon)
– حين الأوليجوسين (Oligocene Epoch)	– القنفديات (شوكيات الجلد)
– عصر الأردوفيشي (Ordovician)	– حين (Epoch)
– حقبة الحياة القديمة (Paleozoic Era)	– حقبة (Era)
	– أحافير حيوانية (Faunal Fossils)
	– أحافير نباتية (Floral Fossils)

- محاريات .(Palecypods)
- عصر .(Period)
- عصر البرمي .(Permian)
- حين البليوسين .(Paleocene)
- شجر متحجر .(Petrifiedwood)
- دهر الحياة المعروفة .(Phanerozoic Eon)
- حين البليوستوسين .(Pleistocene)
- حين البليوسين .(Pliocene)
- دهر ما قبل الكمبري .(Precambrian)
- حقبة الحياة البدائية .(Proterozoic Era)
- عصر الرابعيعي .(Quaternary)
- نشاط إشعاعي .(Radioactivity)
- انحلال إشعاعي .(Radioactivity Decay)
- الحديث .(Recent)
- العمر النسبي .(Relative Dating)
- وحدات صخرية .(Rock Units)
- وحدات صخرية زمنية .(Rock- Time Units)
- عصر السيلوري .(Silurian)
- علم الطبقات .(Stratigraphy)
- عصر الثلاثي .(Tertiary)
- عصر الترياسي .(Triassic)
- تراليوبيت / ثلاثة الفصوص .(Trilobites)
- التيرانوصور (من الديناصورات) .(Tyrannosaur)
- عدم التوافق .(Unconformity)

